

Hortus Alsaticus

Franz Balthasar von Lindern

HORTUS ALSATICUS

PLANTAS IN ALSATIA NOBILI, INPRIMIS CIRCA ARGENTINAM SPONTE PROVENIENTES, MENSTRUO, QUO SINGULÆ FLORENT, ORDINE DESIGNANS,

ANNEXO CHARACTERE, LOCO NATALI, AC FLORUM COLORE, ADDITIS ALIQUIBUS ICONIBUS, ÆRI AD VIVUM INCISIS, UT ET ALIIS AD BOTANICES DOCTRINAM RITE ADDISCENDAM PERTINENTIBUS, IN USUM BOTANOPHILORUM EXCURSIONES FACIENTIUM CONSCRIPTUS

A

FRANC. BALTHASARE
von Lindern,
MEDICINÆ DOCTORE ET PRACTICO.

ARGENTORATI,
Impensis JOANNIS BECKII, Bibliopol.
M D CC XLVII.

Cuilibet Medico-Practico rectissime confirmante Galeno incumbit, ut omnium Plantarum, quæ in usu sunt & in usum cedere possunt, exactam habeat notitiam, arma enim ejus sunt optima, quibus morbos, per Dei Gratiam, deducere potest etiam gravissimos; ideoque Scientia Botanica Medicinam facienti summe necessaria minimeque spernenda est.

PRÆFATIO.

Lectori Botanophilo Salutem!

PRodit nova facie Lector benigne! botanicus laboris mei fœtus, alio insignitus titulo, multo auctior atque correctior. Diu quidem anceps hæsi, an dignus sit, qui prælo committatur, cum præclarum illud Opus posthumum botanicum, sub nomine Historiæ plantarum Alsaticarum Viri beatæ memoriæ Marci Mappi, haud ita pridem, à Fautore, Collega atque Cognato meo Dn. Joh. Christiano Ehrmann, Viro tam solida eruditione, quam felici ægrorum cura conspicuo, e cineribus quasi

erutum orbique erudito communicatum fuerit.

Verum enim vero cum nullus labor ita ex omni parte perfectus esse soleat, quin aliquid addi possit, idem quoque de dicto hoc opere valet; multæ enim supersunt plantæ, quæ visum Tanti Viri subterfugerunt, mihi autem excursiones botanicas à prima juventute ad hunc usque diem in deliciis habitas instituenti occurrerunt. Cum itaque jam dudum apud me constitutum habuerim, novam Tournefortii mei Alsatici editionem adornandi, hunc laborem à me suscipiendum eo minus inutilem fore arbitratus sum, cum hoc ipso pulchram defectum laudati illius operis supplendi nactus sim occasionem. Alsatia autem nostra suavissima, cum nusquam steriles montes &

incul-

incultos agros, ſed fertiliſſimos undique campos habeat, atque amœniſſimos hortos ab ipſâ natura excultos repræſentet, ideo Horti Alſatici titulum huic opuſculo præſigere libuit.

Cœterum facillimam rei herbariæ addiſcendæ methodum elegi, cuncta ſedulo declinando, quæ vel minimam memoriæ torturam inferre poſſent.

In fronte ſtatim hujus libelli prima hujus doctrinæ Elementa conſpicies, quibus expoſitis, ipſa ſequitur plantarum enumeratio.

Ad facilitandum autem illarum collectionem, non tantum juxta menſes, quibus ſingulæ florent, ordine alphabetico eas recenſui, ſed & notas earum characteriſticas ac locum natalem appoſui, non neglecta perennitatis, vocumque gallicarum ac germanicarum mentione

 atque

atque retento ſimul, quantum pro ſcopo meo licuit, ſyſtemate Tournefortiano. In fine quoque vocabulorum plerorumque botanicorum derivationes addere placuit.

Nec omiſi conſulere in hac mea plantarum indagatione Botanicorum Proceres, Bauhinos, Tabernæmontanum, Dalechampium, Cluſium, Lobelium, Rayum, Scheuchzerum, Zwingerum, Ruppium, Garidellum, Dillenium & fulgidiſſimum noſtræ ætatis Sidus Hallerum aliosque, quorum vel ſola nomina botanices Studioſo Reverentiam & Laudem inſinuant.

Accipe itaque Lector benevole! hunc meum qualemcunque laborem, eo quo Tibi à me offertur animo, mihique inpoſterum fave.

BO-

BOTANOLOGIÆ FUNDAMENTA GENERALIORA, PLANTÆ DIVISIONEM EXHIBENTIA.

Cap. I.

I.

Planta quævis dividitur, in Herbam Fruticem, Suffruticem, vel demum etiam in Arborem.

2. Herba Planta eſt perennis, folioſa non lignoſa, cujus caulis ſingulis annis perit, vel areſcit, novo deinde renaſcente ut Gramen.

3. Frutex, Planta eſt gemmipara, ad arboris magnitudinem non accedens, Caudice multiplici & ramoſa, quæ ſucciſa ſemper ſuppullulet, ut Roſa, Rubus vulgaris & Idæus.

4. Suffrutex Planta, humilior eſt Frutice, ſurculoſa & lignoſa, non gemmipara, ut Lavendula, Salvia.

5. Arbor Planta eſt perennis, omnium maxima, atque altiſſima, trunco ſimplici, craſſo, duro, cortice lævi aut aſpero, ſimulque ramoſa, ut Quercus, Betula, Fraxinus, & eſt vel

Julifera, ut Caſtanea & Corylus.
Pomifera, ut Malum, Cydonia, &c.
Conifera, ut Abies & Pinus.
Baccifera ut Cornus & Sorbus Aucuparia.

Prunifera, ut Perſica & Prunus
Siliquoſa, ut Cytiſus & Colutea Verſicaria
Item Tamarindus.

6. Planta quævis, etiam ratione Durabilitatis, eſt vel Annua, vel Perennis, vel Sempervirens.

7. Planta annua eſt, quæ annuatim decreſcit, diſparet & emoritur, quæque etiam ſemine proprio iterum reſurgit terræ comiſſo, ut Phaſeolus, Raphanus &c.

8. Planta Perennis autem; quæ omnem frigoris ſævitiam eludit, neque morte depaſcitur, ut Erica & Buxus.

9. Planta ſempervirens eſt, quæ folia nunquam deponit, ut Sabina & Buxus, aut ſi deponat, iterum alia producit, ut Ficus & Vitis Canadenſis.

10. Porro etiam quævis Planta differt 1.) quoad Locum, in quo provenit, alia enim eſt Campeſtris, alia Sylveſtris, alia Montana, alia in Convallibus exſurgit, alia eſt Paludoſa, alia in & ſub aquis naſcitur, alia Maritima alia in Nemoribus & Dumetis, alia in Pratis, alia aliis in locis viget. & ſic porro.
2. Alia quoad Qualitatem, alia enim eſt ſucci expers, alia ſucculenta, liquorem varium tam quoad ſaporem vel colorem fundens.
3. Ratione partium conſtitutivarum, quoad Radicem, Caulem & Fructus, quæ vero Caule caret dicitur Acaulos.

11. Radix, Plantæ præcipua pars eſt ima terra infixa, qua Nutrimentum, pro Augmento & Con-

Conſervatione cauli, Foliis, cœteriſque partibus affertur.

12. Folium plantæ pars eſt, ad ejus Ornamentum conſtitutum, conſtans ex petiolo aut eo carens atque coſtæ adhærens.

13. Petiolus, plantæ pars eſt, eſtque vel brevis vel longus, folium ſuſtinens & cauli connectens.

14. Caulis herbárum virga eſt, é radicibus immediate aſſurgens, variæ figuræ, quæ floribus foliisque ut plurimum donari ſolet; in Arboribus dicitur Caudex, in Frumentis Culmus eſtque vel ſimplex vel ramoſus.

15. Quodlibet Folium, conſideratur vel 1. quoad ejus Magnitudinem, aliud enim Magnum, aliud amplum, aliud parvum aliud minimum eſt. 2. vel ratione Formæ, dum rotundum, ſubrotundum, ovatum, lunatum, umbilicatum, planum, latum, anguſtum, longum acutum, aculeatum, lanceolatum, criſpum, rugoſum, verrucoſum, ſagittatum, undulatum, crenatum, ſerratum, denticulatum, auriculatum, ſtellatum, digitatum, angulatum ſeu ſinuatum, pennatum, pinnatum, fiſtuloſum, læve atque hirſutum & lanuginoſum eſt, & ſic porro. 3. ratione Coloris, pleraque folia viridia ſunt, quandoque alius coloris, quandoque etiam ſplendentia. 4. ratione odoris, aliud ſuaveolentem aliud fœtidum & nauſeoſum, aliud nullum de ſe ſpirat odorem 5. ratione ſubſtantiæ, dum eſt vel pingue, tenue aut carnoſum vel craſſum, ſiccum aut ſucculentum,

lentum, vel fundens ſuccum viroſum, lacteum, luteum &c. 6. Variat etiam ratione Situs, aliud exſurgit alternatim, aliud conjugatim, aliud verticillatim vel ſtellatim & cruciatim, aliud eſt inperforatum aliud foraminulis prædi-tum &c.

16. Fructus cujuslibet plantæ Fœtus eſt, vel pars plantæ ut plurimum annua, flori co-hærens eique ſuccedens.

Cap. II.

Florum ſtructuram demonſtrans.

I.

Flos eſt, pars plantæ extima, tenuior, fructui prævia, ejusque ſtamina in ſuo meditullio fovens, vel colore ſuo, vel odore, vel utrisque ſimul, inſigne ejusdem ornamentum exi-ſtens.

2. Partes autem Floris, ſunt 1. Petala ſeu Florum folia, quoad numerum inter ſe di-ſcrepantia vid. Cap. 3. Stamina ſeu Capilla-menta tenuia, floris medium tenentia, cum & ſine apicibus, quæ vero apicibus carent Ca-pillamenta proprie dicuntur. 3. Apices ſunt Summitates & Cacuminula, ſtaminibus incum-bentia, 4. Piſtillum ſeu Stylus, qui media pars floris eſt, ex umbilico aut centro inter ſtami-na exſurgens, & naſcenti Fructui adhærens

5. Ca-

5. Calix seu Perianthemum, posterior floris pars est, Florem & Fructum vel involvens vel sustinens, vel utrumque præstat, sed non in omnibus observatur, differt sola figura & situ, variam repræsentans figuram vel nudus est vel foliolis obsitus &c. 6. Ovarium quod Theca seu Capsula est, semina includens, est multiformis vel uni-bi-tri-aut multicapsularis. &c.

Qui hisce gaudet partibus, ille Flos dici solet Perfectus, qui vero Petalo vel Stylo aut Staminibus caret, dicitur Imperfectus. ut in Corylo &c.

3. Porro Flores etiam considerantur ratione Situs. & Fructus, alii proveniunt longa serie, in summis ramulis, alii nascuntur verticillatim aut spicatim vel in Aristam, alii umbellatim aut racematim vel fasciculatim vel etiam in Pyramidem assurgunt &c.

4. Fructus ratione, alius enim est Capsulatus alius angiospermos, id est semine nudo ut in Ialapa, Cerinthe, alius angulosus, echinatus, umbilicatus, cellulosus, siliquosus, leguminosus articulosus, glaber vel lanuginosus &c.

Cap. III.

Florum Differentias Fundamentales continens.

Flos omnis est vel

- a Petalos,
  - c Simplex.
    - g Monopetalos.
      - o Campaniformis.
        - bb Patens.
        - cc Tubulosus.
        - dd Globosus.
      - p Infundibuliformis.
        - ee Proprie sic dictus.
        - ff Hypocrateriformis.
      - q Rotatus.
      - r Personatus.
      - s Labiatus.
      - t Anomalus.
    - h Dipetalos,
    - i Tripetalos.
    - k Polypetalos.
      - u Cruciformis.
      - x Rosaceus.
      - q Caryophyllæus.
      - z Liliaceus.
      - aa Papilionaceus.
  - d Compositus,
    - l. Flosculosus.
    - m Semiflosculosus.
    - n Radiatus.
- b Apetalos.
  - e Stamineus.
  - f Amentaceus.

Cap. IV.

Clavem Literarum designatarum explicans.

à Flos est, qui præter Stamina vel Capillamenta etiam habet Petala, vel majora vel minora, æqualia aut inæqualia ut in Ranunculo & Phaseolo.

b. Qui Petalis caret, & totus vel ex staminibus seu Capillamentis tantum constat, ut in Sparganio & Equiseto.

c. In quo nec Flosculi nec Semiflosculi adsunt, ut in Ceraso aut Pruno.

d. Qui componitur ex flosculis aut semiflosculis, ut in Cyano, aut ex Flosculis tantum, ut in Dente leonis, vel ex utrisque ut Doronicum.

e. Qui præter Stamina seu Capillamenta stylum ambientia, nil habet, unde nomen trahere potest ut in Equiseto & Ilice.

f. Seu Iulus, qui ex staminibus tantum, aut apicibus vel foliolis quibusdam componitur ut in Corylo & Nuce juglande.

g. Qui unico vel pluribus petalis donatur, & totus seu integer ab ovario decedit, ut in Digitali, Volvulo, Nicotiana.

h. Qui duobus saltem petalis gaudet ut in Circæa, Stellaria & Hederula palustr. Tabern.

i. Qui ex tribus petalis est confectus, ut in Plantagine aquatica & Ranæ morsu, Cucubalo.

k. Qui constat ex multis petalis planis ut in Quinque folio, Alsine, vel superimpositis qui postmodum multiplex seu plenus audit, ut in Leu-

Leucojo & Caltha ſeu Calendula hortenſi.
l. Qui ex plurimis floſculis ſeu petalis fiſtuloſis eſt compoſitus, ut in Iacea, Carduo &c.
m. Cujus petala inferna tantum parte fiſtuloſa, ſunt, media vero & ſuperna parte plana conſpiciuntur, & denſe in orbem poſita ſunt, ut in Scorzonera, Chondrilla.
n. Qui ex duabus partibus eſt confectus, Diſco nempe floſculoſo & Circumferentia, quæ etiam Corona audire ſolet ſemifloſculoſa, ut in Bellide Iacobæa &c.
o. Qui maxime Campanæ formam obtinet, ut in Campanula, Gallio.
p. Cujus in ferior pars tubulata, ſuperior vero in Conum inverſum infundibuli inſtar diducta eſt, ut in Auricula Urſi, Symphyto, Cynogloſſo.
q. Ubi petala circa diſcum, rotæ in modum annexa ſunt, ut in Bellide, Chamæmelo.
r. Qui Faciem æmulam cujusdam perſonæ habet, vel roſtrum animalis, rictu & labiis repræſentat, ut in Antirrhino, Linaria &c.
s. Cujus pars inferior labio unico tantum, ut in Scordio, Bugula, Chamædri, ut plurimum autem gemino vel trifido Barba nonnullis dicta ſciſſa eſt, in ſuperiore autem Galea vel integra, ut in Lamio Cardiaca vel diviſa ut in Serpillo atque Meliſſa comprehenditur.
t. Qui ſub nomine ſingulari comprehendi nequit, ut Ariſtolochia, Scrophularia &c.
u. Qui gaudet quatuor petalis cruciatim diſpoſitis, ſimulque calicem pari numero petalorum habet, ut Cruciata, Braſſica

x. Cu

x. Cujus petala quaternum numerum ſuperant ut in Salicaria, Roſa, Pyro.

y Cujus petala ex ipſo calice tanquam é tubulo emergunt, uti eſt Linum, Lychnis, Caryophyllus &c.

z Qui ex 6 petalis, quandoque tribus conſtat, aut in 6 partes ad Lilii formam accedens ſecatur, ut in Aſphodelo, Colchico, Hyacintho.

áá Qui ſuis petalis, Papilioni alis expanſis non inſimilis eſt, aut qui conſtat ex petalis diſſimilibus & cujus ſuperior pars Vexillum, inferior Carinam, duo lateralia Alas repræſentant, ut in Lathyro Piſo &c.

bb Qui velut in Pelvim extenditur, ut in Bryonia, Gentiana.

cc Qui angnſtus & oblongus eſt, ut in Caprifolio, Xyloſtio.

dd Cujus os anguſtius eſt Ventre, ut in Myrtillo Uva urſi.

ee Cujus Tubus ejus in Diſcum non in conum explicatur, ut in Primula Veris, Androſace &c.

Cap. V.

Terminos Technicos in Deſcriptione uſuales deſiguans.

Acaulos, Planta eſt, quæ nullo gaudet Stylo ut in Carlina acaulos.

Acinus, ſemina vel granula baccis incluſa ſignificat, ut in Alkekengi, Solano.

Alæ, petala ſunt lateralia, ſlorum papilionaceorum, inter vexillum & carinam poſita.

Alatus caulis eſt, qui circa caulem, ab ima parte ad ſupremam, longitudinalia habet folia, ut in Lathyro, Bidente Americano.

Ari-

Arista, Acus est exilis & longa, é glumis seu folliculis grani constans, ut in frumento.

Bulbus, Radicem denotat, suis membranis vel tunicis in orbem positis, vel etiam squammatim incumbentibus coagmentatam.

Calcar, floris pars est, quæ in ejus posteriore parte caudam habet vel brevem aut prælongam ut, in Elatine, Pinguicula & Orchidibus quibusdam & Delphinio.

Capitulum, quando flores in suprema styli parte in orbem vel in globum rotundum glomerantur, ut in AllioCepa, Globularia &c.

Capreolus seu Clavicula; filamenta sunt tenuia in planta, circinnum in modum intorta, quibus stipibus vicinis annectuntur, ut planta se in altum erigere possit, ut in lathyro, Bryonia.

Carina, Petalum est papilionaceorum florum inferius, navem concavitate sua repræsentans, ut in Faba, Piso Asphodelo.

Cilium est quando Calicis margo squamosus villis obsitus est, ut in Iaceis quibusdam.

Corymbus est Fasciculus plurimorum flosculorum globosus vel semi globosus, ut in Opulo, Hedera.

Culmus, Caulis est Frumentorum & Graminum geniculatus.

Geniculum est Articulus seu Nodus, ut in Graminibus, in Lychnide sylvestri. Cicutaria fœtida.

Gluma, est congeries granorum in folliculo, ut in Frumento.

Julus est, Fasciculus flosculorum apetalorum vermiformis, ab arboribus dependens ut in Corylo.

Panicula, est congeries ramosa, florum numerosum, in spicam longam digesta, ut in gramine miliaceo & hordeaceo

Pappus est Lanugo seminibus quibusdam inhærens, ut in Hieracio Carduo &c.

Spica est Conus & oblongus florum erectus ut in Plantagine, Bistorta.

Umbilicus, media pars est seu Floris Centrum.

HOR-

HORTI ALSATICI
PLANTARUM FLORENTIUM
MENSIS
JANUARIUS ET FEBRUARIUS.

Helleborus niger, amplioribus foliis Tournef. Instit. R. H. *Flore rosaceo ex albo leviter rubente, folio latiori digitato, radice fibrosa nigra, amara & acri, fructu multicapsulari* Christ oder schwartze Nießwurtzel, mit breiten tief eingeschnittenen Blättern. Ic. Tabernæmont hist. Plantar. sub. titulo, Veratri nigri Stiriac. pag. 1099. Gallis. *Ellebore noir à feuilles larges*, hin und wieder in Gärten. *perenn.*

Helleborus niger angustioribus foliis. T. Ic. Clus. hist. rar. plant. pag. 274. *Sub nomine Ellebori nigri legitimi.* rechte schwartze Nießwurtzel, mit schmahlen eingeschnittenen Blättern. *Gallis, Ellebore noir, à Feuilles étroites.* ibid. *perenn.*

MENSIS.
FEBRUARIUS ET MARTIUS.

Alyssum vulgare polygoni folio, caule nudo. T. *Sive Bursa pastoris minima, oblongis siliquis*

verna loculo oblongo IB. 937. *Quæ Alsine V. minima* Tabern. Hist. pag. 1087.

Plantula hæc, ex omnibus campestribus, statim ineunte vere, flosculis suis copiosissimis, jucundo aspectu, margines dealbat, unde etiam à nostratibus appellantur die Frühlings Blümlein, aliàs Gänse Blümlein oder Nägelkraut. *annua.*

Corylus sylvestris T. seu *vulgaris flosculis amentaceis, foliis Alni æmulis latioribus serratis; fructu rotundo albo minore.* gemeine wilde oder Wald Haselstaude Lobel. icón pag. 192. Gall. *Noisetiere sauvage,* in Wäldern und in denen Hecken. *perenn.*

Corylus sylvestris, latiore folio, virgis rectioribus & minus ramosis Dillen. Catalog. plant. Giss. Haselstaude, mit breiten Blättern und stracken Schossen oder Gerten, in denen Waldungen Oßwald und Ganßau. *perenn.*

Corylus sativa, fructu albo minore. T. Garten Haselstaude Ic. Clus hist. 11. *Noisetiere domestique, perenn.* non differt à Sylvestri vulgari, nisi cultura mitiori.

Corylus sativa fructu oblongo rubente T. Blut Haselnuß Staude, mit ablanger Frucht. Ic. Zwinger Theatr. Botan. *Noisetier Franche* hin und wieder auf dem Land auf denen Höfen und in Gärten, *perenn.*

Corylus sativa, fructu oblongo albicante T. Haselnuß Staude mit weiser langer Frucht. Ibid. *perenn.*

Corylus

Corylus sativa fructu rotundo maximo T. *seu Avellana Lugdunensis major. Camerar. Hort.* Römisch oder Italiænische Haselnuß Staude, mit der grösten Frucht, in Gärten der Stadt und des Landes *Avellanier Italien. perenn.*

Cornus hortensis Mas T. sive *domestica fructu rubro, oblongo ossiculis fœto, flore rosaceo luteo, foliis virgæ sanguineæ similibus.* zahmer Welsch-Kirsch-Baum *Ic. Tabern. hist. plant. pag.* 1459. *Coronnillier Mâle ou Cornier domestique* aller Orten in Gärten. *perenn.*

Cornus hortensis Mas, fructu ceræ colore T. Welsch-Kirsch-Baum mit gelber Frucht. ibid. *perenn.*

Cornus hortensis Mas, fructu albo T. Welsch-Kirsch-Baum mit weiser Frucht. ibid. *perenn.*

Cornus sylvestris Mas, T. *sive spontanea* wilder Welsch-Kirsch Baum, hin und wieder in Wäldern und Büschen, in dem Jllkircher und Oßwalder Wald. Ic. Clus hist. 13. *Cornier sauvage perenn.*

Helleborus niger fœtidus T. *flore rosaceo herbaceo, radice tenui nigra, foliis angustioribus profunde incisis & serratis,* sive *Helleborus niger sylvestris adulterinus hyeme etiam virens IB.* 3. *app.* 880. Est *Helleboraster maximus* Hort. Eyst. *flore & semine prægnans Lobel. Ic. pag.* 679. *& Garidel. hist. plant. Tab.* 48. groß Läuse Kraut, groß stinckende Nießwurtzel. *Ellebore puant ou batard. perenn.* am Weg wenn man von Sultz auf Molsheim gehet, nahe an der Capell.

Narcisso-leucojum vulgare T. *unico flore simplici liliaceo, rarius bino pendulo, foliis longis splendentibus fructu turbinato tripartito* sive Leucojum bulbos. hexaphyllum. *Ic.* 1. *Tabern. hist.* 1005. & *Bauh.* 2. 590. Hornungs oder Mertzen Blum potius grosse weise Schnee-Glöcklein, in schattichten Hohen-Gebürgen, und bey uns in den Gärten. *perenn.*

Narcisso-leucojum minus trifolium T. *tribus petalis albis minoribus cingentibus, terna majora herbacei in limbo coloris, foliis angustioribus longis glaucis, fructu ovato* sive Leucojum bulbosum præcox minus *Clus. pan. pag.* 181. kleine Schnee-Tröpfflein *Ic. Clus. hist. pag.* 169. est Narcissus VI. Matthiol. hin und wieder in Gärten.

MENSIS
MARTIUS ET APRILIS.

Acer montanum candidum T. *foliis inferne candicantibus latifoliis angulatis, pediculis rubentibus annexis, floribus rosaceis ex viridi flavescentibus, fructu alato gemello multi capsulari* sive Acer major, multis falso Platanus *IB.* 1. 168. sive Acer latifolium Clus. Ic. pag. 9. Ahorn-Baum mit tief eingeschnittenen Blättern *Erable de montagne, ou Sycomore* auf dem Hochgebürg Hochfelden und St. Ottilienberg *perenn.*

Alnus rotundifolia glutinosa viridis T. sive Alnus vulgaris *IB.* 1. 151. *floribus amentaceis fru-*

fructu squamoso. Erlen oder Eisenbaum, *quia ejus lignum in aquis ferri instar durum fit & diu durat.* *Ic. Tabern. hist.* 1395. *Aunée.* wächst aller Orten, an dem Rande des Wassers, an der grünen Wart. *perenn.*

Alnus folio incano T. *foliis acuminatis longioribus, subtus incanis superne vero hirsutis* sive *Alnus incana & hirsuta IB.* 1. 154. roth Erlen, in dem Granwört, neben den Gartners Feldern. *perenn.*

Alnus Alpina minor. T. *foliis Ulmi* kleiner Berg Erlen-Baum, in denen Bergen gegen Hochfeld. *perenn.*

Bellis sylvestris minor T. *sive spontanea IB.* 311. *flore prorsus albo radiato, foliis laciniatis, radice tenui.* Kleine Maßlieben oder Zitter-Rößlein, mit gantz weisen Blumen, *Paquerette ou petite Margueritte* hin und wieder auf denen Wiesen. Ic. Tabern. hist. 708. *perenn.*

Bellis sylvestris minor flore mixto T. Ic. in H. Eyst. gesprenckte Zitter-Rößlein. *perenn.* *Paquerette tachetée.*

Brassica campestris perfoliata T. sive *Perfoliata siliquosa IB.* 2. 835. *flore albo cruciformi, foliis pallide viridibus, corniculis longis quadrangulis, radice longa fibrosa alba, fructu siliquoso bicapsulari* durchwachsender Feld-Kohl, mit Steck-Ruben Blättern. *Ic. Clus. hist. pag.* CXXVII. *est Perfoliata napifolia. Tabern. hist.* 1140. in denen Frucht und Kraut Aeckern. *ann.*

Brassica campestris perfoliata, flore purpureo T. sive *Perfoliata siliquosa purpurea Clus. IB. 2. 836.* Wilder Kohl mit Steckruben Blättern und röthlichten Blumen, in denen Feldern bey Oßwald.

Bursa pastoris major, folio sinuato T. sive Bursa pastoris *IB. 2. 936. capsula brevi cordata, flosculis albis cruciformibus, radice alba tenui fibrosa* groß Täschel-Kraut, mit gekerbten Blättern, neben denen Wegen und auf gebautem Grund. *Ic. Tabern. hist. 512. & Lobel. Ic. pag. 221. Tabouret ou Burse à Berger. ann.*

Bursa pastoris major folio non sinuato T. groß Täschel-Kraut mit ungekerbten Blättern. *ibid. ann.*

Bursa pastoris media T. sive minor *Tabernæm. hist. 512. petite burse à berger* klein Täschel-Kraut, auf sandigem und dürren Boden, an denen Zäunen und Wegen. *ann.*

Buxus arborescens foliis pictis, per limbum aureis T. *floribus apetalis luteis,* gemahlter Buchs, Zaun Buchs. *Buis peinte Ic. Munting. hist. plant.* in Gärten. *perenn.*

Buxus arborescens T. *foliis oblongis atro rubentibus & splendentibus.* Steigender Buchs, oder Buchs-Baum. *Ic. 1. Tabern. hist. 1164.* in unterschiedlichen Gärten und Bauren-Höfen. *perenn.*

Buxus foliis rotundioribus T. sive *Chamæbuxus. Tab. hist. 1464. Ic. 2.* gemeiner Schnitt oder Länder Buchs. *Buis, perenn.*

Chrysosplenium, foliis amplioribus auriculatis

latis T. sive *Saxifraga aurea Dod. IB. 3. 707. floribus apetalis stamineis hirsutis, radice filamentosa. fructu sicco globoso.* Gulden Miltz-Kraut. Ic. Tabern. hist. 1124. & Hort. Eyst. fig. 5. *Herbe St. Christofle* an feuchten Rånden rinnender Båchlein auf dem Gebürg hinter Ottrott, bey der Segmühl, *perenn.*

Chrysosplenium, foliis pediculis, longis insidentibus T. gulden Miltz-Kraut, mit langen stielechten Blåttern, an fliesenden Quell-Wåsserlein, hinter Haßlach. *perenn.*

Chrysosplenium foliis minoribus subrotundis T. gulden Miltz-Kraut, mit kleinen rundlechten Blåttern, beym Brunnen, auf dem Berg der heiligen Ottiliæ. *perenn.*

Cupressus meta in fastigium convoluta, quæ fœmina Plin. T. *perpetua fronde virens, floribus amentaceis, foliis sabinæ æmulis atra virentibus fructu squamoso.* Cypressen, in denen Lust-Gårten, *le Ciprés femelle Ic. Tab. hist.* 1353. *perenn.*

Cupressus ramos extra se spargens, quæ Màs, Plin. T. *Ic. Mathiol. epitom pag.* 52. *le Ciprés masle.* ibid. *perenn.*

Equisetum arvense, longioribus setis T. sive *Equisetum minus terrestre IB. 3. 730. floribus apetalis stamineis, Presle ou queue de cheval.* Katzen-Wadel oder Kannen-Kraut, in denen Gersten und Haber-Feldern. *Ic. Tab. hist.* 568. *perenn.*

Equisetum palustr. majus T. *Setis longissimis. Ic. Tab. hist.* 569. groß Wasser Schacht-Halm, Handwercks-Kraut, in sumpfichten Wassern

und Gräben, auserhalb der Stadt. *perenn.*

Fumaria bulbosa radice cava major, flore rubro dilutiore T. sive *Fumaria bulbosa radice cava, flore purpurascente IB.* 3. 204. *polypetalo papilionacea foliis pallide viridibus, fructu membranaceo unicapsulari Ic. Tab. hist.* 38. *& in Rivin.* Hohlwurtzel mit purpur rothen Blumen. *Ic. Tabern. hist.* 38. in denen Hecken bey Still / hinter Sultz und auf Bergen hinter Barr. *Racine creuse. perenn.*

Fumaria bulbosa, radice cava major flore niveo T. Hohlwurtzel mit weissen Blumen Ic. IB. 3. 204. *perenn. ibid.*

Fumaria bulbosa, non cava major T. *flore purpureo, qua Aristolochia vulgaris purpurea. Hort. Eyst.* Erdrauch, mit gantzen Wurtzeln, in Bergichten Büschen, in dem Wald zu Gambsheim. *perenn.*

Fumaria bulbosa radice non cava minor T. kleiner Erdrauch, mit gantzen Wurtzeln, in dem Obern-Elsaß, in denen Reben, bey Türckheim. *perenn.*

Herba Paris. T. & IB. 3.613. sive Solanum quadrifolium bacciferum *repens, bacca nigra, flore herbaceo cruciformi, radice tenui multifida, fructu molli globoso.* Ein oder Wolfsbeer, *Raisin de renard Ic. Tab. hist.* 1095. in büschechten Hecken und Wäldern, in dem Pusch, bey der Eckbolsheimer Zügel-Hütte. *perenn.*

Iuncus memorosus latifolius major T. *foliis fructu unicapsulari hirsutis*, sive *Gramen sylvaticum pilosum Tab. hist.* 537. Ic. 4. groß Haricht Wald Graß,

Graß, in Wäldern und Büschen auf dem St. Ottilien Berg. *perenn.*

Lichen crustæ modo arboribus adnascens, colore flavescente, seu flavus Ray hist. 116. gelbes Baummoß, in dem Ruprechtsauer Wald, auch an alten Dielen der Garten-Wände.

Lichen crustæ modo arboribus adnascens pullus T. schwartz braun Baummoß in denen Waldungen an jungen Eichbäumen.

Lichen crustæ modo saxis adnascens, verrucosus cinereus T. Wartzen förmig Steinmoß im Cronenthal zu Waßlenheim.

Moschatellina, foliis fumariæ bulbosæ T. *odoratis, flore monopetalo rotato & multifido herbaceo, radicula oblonga alba fibrosa repente, fructu molli* sive Fumaria bulbosa minima *Tab. hist. Ic. XI. 94.* Petite musquée in feuchten Büschen, in denen Hecken bey Oswald. *perenn.*

Ornithogalum bifolium germanicum T. *seu vernum dumetorum flore cœruleo liliaceo, radice bulbosa subdulci, fructu subrotundo.* blaue Hecken Stern-Blümlein, Bauren hyacinthen *Ic. Tab. hist.* 1015. in dem Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Ornithogalum bifolium germanicum, flore exalbido T. Bauren hyacinthen, mit weissen Blumen, rarius occurrit in denen Feldern bey Arbogast. *perenn.*

Ornithogalum bifolium germanicum flore carneo T. auf denen Wiesen beym Mauer-Hof. *perenn.*

Ornithogalum luteum T. seu majus & *IB.*

grosse Feld-Zwiebel, mit gelben Blumen. *Ic. 1. Tab. hist. pag.* 1020. *Oignon sauvage*, auf Aeckern, an der grünen Warth, bey dem Kupfer Hammer, in Herrn Horrers Garten, zu Niederhaußbergen, auf den Aeckern und in den den Reben. *perenn.*

Ornithogalum bulbosum luteum minus T. sive pannonicum, luteo flore Clus. hist. *pag.* 189. kleine Feld-Zwiebel, mit gelben Blumen, auf denen Feldern unter der Frucht, vor dem weisen Thurn, auf denen Aeckern zu Lingelsheim. *perenn.*

Ornithogalum angustifolium bulbiferum T. bey Haußbergen in den Reben häufig, wie auch auf den Aeckern zu Lingelsheim *perenn.*

Petasites major & vulgaris T. *flore flosculoso albo, folio subrotundo magno, subtus incano, radice longa crassa amara. fructu papposo.* Pestilentz Wurtzel, grosser Huflattich Ic. Tab. hist. 1316. *Petasite. perenn.*

Populus alba, majoribus foliis T. sive *Populus alba IB.* 1. 160. *vitigineis foliis, inferne albicantibus ac lanuginosis, floribus amentaceis fructu membranaceo papposo.* Aspen oder weiser Pappelbaum *Peuplier blanc Ic. Tab. hist.* 1392. in denen Hecken und Zaunen, an denen Flüssen in denen Waldungen. *perenn.*

Populus nigra T. & *IB.* 1. 155. seu officinarum, *foliis hederaceis serratis hyeme deciduis, fructu racemoso* Schwartzer Pappelbaum *Ic. Tabern. hist. pag.* 1392. & *Mathiol. Peuplier noir,* an

an den Wasser gestaden, bey der Spithal-Mühl, ingleichen in dem Jllkircher und Hansauer Wald. *perenn.*

Populus tremula T. seu Lybica *IB.* 1. 163. & *Matthiol. folio rotundo angulosoque punctatim albis notis consperso, tenuique pediculo appenso, continuo fere sese movente* Aspen oder Zitterbaum *Ic. Tab. hist.* 1392. *Niespe ou Tremble* in dem Eckbolsheimer und Bruumbter Wald. *perenn.*

Primula veris, odorato flore simplici T. & *IB.* 3. 495. *hypocrateriformi & multi fido luteo, folio rugoso, radice tenui candicante, fructu oblongo* Wiesen Himmel-Schlüssel, mit wohlriechenden Blumen. *Primevere Ic. Tab. hist.* 699. auf der Gallen Matt. *perenn.*

Primula veris, pallido flore elatior. T. sive *Primula veris* cauliflora flore pallido vix odoro *IB.* 3. 496. *foliis latioribus & in acumine rotundioribus, radice crassiore fibrosa, floribus subluteis inodoris.* Wald Himmel-Schlüssel, mit bleich gelben Blumen, ohne Geruch. *Primevere sauvage IB.* 4. *Tab. hist.* 700. & *Clus hist.* 301. in dem Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Pulmonaria Italorum, ad Buglossum accedens T. & *IB.* 3595. *flore simplici monopetalo infundibuliformi ex rubro coeruleo, radice fibrosa, est Pulmonaria* maculoso folio *Clus. hist.* CLXVIII. & *Tab. hist. pag.* 748. *Pulmonaire maculeé ou marbrée* Hirschmangold oder Lungen-Kraut mit gefleckten Blättern in denen ausgehauenen Höltzern, zu Hangenbietheim und Holtzheim. *perenn.*

Pul-

Pulmonaria folio non maculoso T. Hirsch-mangold ohne Flecken *Clus. hist. CLX. Pulmonaire sans marque* zu Truttenhaussen häuffig. *perenn.*

Pulmonaria angustifolia, flore cœruleo, folio maculoso. T. schmahl blättricht Lungen kraut mit Flecken. *Ic. 1. Tab. hist. 948. & Clus hist. CLXIX.* in dunckelen Waldungen bey Hohen Landsperg *perenn.*

Pulmonaria foliis Echii T. *Ic. Lobel. 586.* sive Pulmonaria Plin. angustifol. Tab. Lungenkraut mit spitzigen Blättern, im Höltzlein zu Höltzheim. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici cœruleo T. sive Trifolium hepaticum flore cœruleo *IB. 2389. radice nigra fibrosa*, officinis Hepatica nobilis *fructu globoso* Edel Leber-Kraut, mit blauen Blumen. *Belle hepatique. Ic. Tab. hist. 911. & Garidel. hist. plantar. 415. perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici violaceo. T. Edel Leber-Kraut, mit viol blauen Blumen *ibid. perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici rubro T. Edel Leber-Kraut, mit rothen Blumen auf dem Gebürg hinter Barr. Ic. 2. Tab. hist. 94. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus flore simplici sub purpureo, petalis cordatis profunde divisis, apicibus albis *Mapp. hist. plant.* bleich rothes Leber-Kraut mit weisen Zünglein auf dem Gebürg hinter hohen Andlau. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus flore simplici

ci albo T. Edel Leber-Kraut, mit weisen Blumen, auf dem alten Berg zu Dorlisheim. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus flore simplici magno albo T. Edel Leber-Kraut, mit grossen weissen Blumen, auf dem Gebürg zu Hochfeld. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici violaceo minore, apicibus albis *Mapp. hist. plant. alsat.* 259. Edel Leber-Kraut mit weissen Zünglein, auf dem Gebürg zu Barr, wird unter den gemeinen Blauen öfters gefunden, non est lusus naturæ in hort. translata, semper eodem charactere viget. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici albo, apicibus rubris T. Edel Leber-Kraut mit weissen Blumen und rothen Zünglein *ibid. perenn.*

Ranunculus gramineo folio, flore caudato, seminibus in capitulum congestis spicatis T. sive Myusuros *IB.* 512. Mäuse Schwantz *queue de souris Ic. Tab. hist. pag.* 552. *perenn.* auf denen Aeckern oberhalb dem Wirths-Häusel, zwischen Lingelsheim und Ensisheim, neben denen Wasser Gräblein und weiters hinauf gegen Ensisheim an denen Gräblein der Frucht. *perenn.*

Tussilago vulgaris T. & *IB.* 3. 563. *fructu papposo flore luteo radiato Ic. Tab. hist.* 1-316. *Pied de cheval.* Roßhub, Huflattich, auf feuchten Aeckern bey Illkirch und zu Brischwickersheim *perenn.*

Viola martia purpurea, flore simplici odo-

ro

ro T. *fructu trigono. Viollette de Mars* Ic. 1. *Tab.hist.* 608. *polypetalo flore simplici odoro anomalo, radice fibrosa repente* Wohlriechende Mertzen Violen, in grasichten Orten und an denen Ränden der Zäunen. *perenn.*

Viola martia alba §. *Ic.* 2. *Tab. hist.* 680. Weisse Mertzen Violen, in denen Hecken, in dem Illkircher Wald. *perenn.*

Viola martia sylvestris inodora T. *foliis mucronatis oblongis & strictioribus, flore coeruleo.* Ic. 5. *Tab. hist. pag.* 681. Hunds Violen, Wald Violen, mit grossen ablang runden Blättern und blaß blauen Blumen ohne Geruch *Violette de bois.* auf der Metzgerau und sonst vielen andern Orten. *perenn.*

Viscum baccis albis T. *flore monopetalo quadri partito viridi, bacca glutinosa foliis, oblongis conjugatis angustis.* Vogelberen, aus welchen der Vogelleim præparirt wird, wächst fast an allen Bäumen, offt auch auf den Eichbäumen. Mispel *Tab. hist. plant. pag.* 1376.

Ulmus campestris & Theophrasti T. sive Ulmus *IB.* 1. 139. *folio lato scabro, leviter serrato, atque oblongo, floribus monopetalis campaniformibus* Rustbaum, Rusten Orme *Ic. Tab. hist.* 1394. in Wäldern und auf allen Wällen der Stadt. *perenn.*

Ulmus folio latissimo scabro T. sive Ulmus altera latifol. Lob. p. 2. p. 189. Berg Rusten oder Steinlinden mit beyderseits rauhem Laub auf dem Hochfelder Gebürg und Waldungen zu Oberbron, in denen Hecken der Land-Strasse nach dem Mauer-Hof unterhalb. *perenn.*

Ul-

Ulmus minor folio angusto scabro & *Ray. p.* 1426. T. Rusten mit einem harten schmahlen Blatt, an denen Aeckern neben dem Illfluß gegen Ostwald. *perenn.*

Ulmus folio glabro T. & *Ray, p.* 1426. Weißrusten mit beyderseits glatten Blättern ibidem und in dem Illkircher Wald.

MENSIS.

APRILIS ET MAJUS.

Acer campestre & minus, T. sive Acer vulgare, minori folio *IB.* 1. 166. *foliis minoribus lævibus laciniatis seu angulosis, floribus rosaceis ex viridi flavescentibus, fructu gemino alato Ic.* 2. *Tab. hist.* 1386. Maßholder *petit Erable* in denen Hecken und Püschen aller Orten. *perenn.*

Agaricus lichenis facie variegatus T. qui *à loco natali apud nos Fungus salignus venenosus audit, Clusio in hist. est III. genus perniciosorum fungorum CCLXXII.* Felber Schwamm nostratibus, Weiden Schwamm, an denen alten Weiden-Bäumen, in dem Früh-Jahr.

Alsine verna glabra, floribus umbellatis albis T. rosaceis, *fructu unicapsulari,* sive *caryophyllus arvensis umbelliferus IB.* 3. 361. Holosteum Caryophylæum arvense *Ic.* 2. *Tab. hist.* 543. weiße Acker Nägelein, auf denen Ackern, hin und wieder, bey Schiltigheim, in der Ruprechtsau.

Alsine media T. *seu vulgaris flore albo rosaceo, foliis ex adverso binis, radice alba fibrosa,* gemeiner

ner Hünerdarm oder Vogel-Kraut. *Ic.* 3. *Tab. hist.* 1087. *Morgeline. annua.*

Alsine pratensis gramineo folio ampliore T. *flore albo simplici rosaceo* sive Gramen Fuchs. vel Leucanthemum *IB.* 3. 361. est Gramen floridum majus *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 542. Weiß Nägelein Graß, aller Orten in Wäldern, häuffig in dem Eckboldsheimer Wald. *ann.*

Alsine pratensis gramineo folio angustiore T. s. Gramen floridum minus. *Ic.* 2. *Tab. hist.* 542. Klein Blumen Graß auf der Metzgerau, auf denen Wiesen über der Hohenwart zwischen denen Wassern. *ann.*

Alsine pusilla pulchro flore tenuissimo, nostras, seu Saxifraga caryophylloides pusilla, flore albo pulchello *Ray hist.* 1033. *radice alba repente* in graßichten Orten, beym Eckbolsheimer Ziegel-Ofen. *ann.*

Alsine spergulæ facie minima, seminibus marginatis T. *flore albo* gar kleiner Spurey, auf dürren sandigen Aeckern in der Ruprechtsau und zu Hördt. *ann.*

Eadem *seminibus nudis* T. an kleinen Hügeln bey Gemar, in dem Graß.

Alyssum fruticosum T. sive Thlaspi capsulis sublongis, incanum *IB.* 2. 919. an sandigen Zäunen zwischen Hagenau und Weissenbarg. *perenn.*

Alyssum Veronicæ folio T. sive Bursa pastoris major, loculo oblongo, flosculis albis, cruciformibus, radice tenui alba filamentosa, *fructu unicapsulari C.B. prodr. pag.* 50. & *Zwinger. Theatr.*

Theatr. botan. Täschel-Kraut, mit Ehrenpreiß Blättern, auf denen sandigen Feldern zu Bischweyler, zu Oberbron, an denen Rändern der Reben. *ann.*

Amygdalus sativa T. *fructu majore dulci, foliis persico similibus, flore simplici rosaceo suave rubente Ic. Tab. hist.* 1410. süsser Mandelbaum, *Amandier doux*; hin und wieder vor der Stadt, in Gärten und Weinbergen. *perenn.*

Amygdalus dulcis, putamine molliore. T. süsser Mandelbaum, mit Früchten weicher Schalen, Beiß-Mandeln *perenn. in horto medico.*

Amygdalus amara T. Mandelbaum mit bitterer Frucht, *Amandier amere.* ibid. *perenn.*

Amygdalus Indica Nana H. R. P. *Ic. Munting. histor. plant.* 34. Niedriger Mandelbaum ibid. *perenn.* in hybernac.

Asarum vulgare T. & *IB.* 3. 548. *flore apetalo subrufo, folio subrotundo, pingui, atro, virente, fructu anguloso multicapsulari Ic. Tab. hist.* 1129. Haselwurtzel, *Nard sauvage*, in schattichten Hölzern, bey Blobsheim und im Schwindelsheimer Wald.

Asarum americanum majus *Hort. Reg. Par.* seu *Asarum Cornut. Canadense.* 24. *foliis vulgari latioribus & dilute virentibus, radice repente,* Grosse Americanische Haselwurtz, per me satum luxuriose viget auf dem Haulenberg.

Boletus esculentus in metam fastigiatus T. est I. gener. fungor. escul. spec. IV. *Clus. histor.* CCLXIII. Spitz Morcheln, roth gelbe Maulbeer Morchel.

Boletus phalloides T. sive XXIII. generis perniciosor. fungor. 5. species *Clus. hist. CCLXXXVI.* est Fungus penis imaginem referens, CBP. in feuchten Wäldern, und sumpfichten Wiesen, Gicht Schwamm, auf Matten und Waldungen bey Linßweyler. *ann.*

Calamintha humilior, folio rotundiore T. *flore simplici, purpureo, monopetalo, labiato, officinis Hedera terrestris & IB. 3. app. 855. radice repente fibrosa,* Gundelreb oder Gundermann *Ic. 2. Tab. hist.* 1280. *& in* Rivin. *Lierre terrestre,* allerwegen an denen Hecken und Zäunen. *perenn.*

Calamintha humilior, folio rotundiore minor & elegantior T. *Ic. Vaillant. Tab. VI. fig. 5. & 6.* kleine Gundelreb. ibid.

Cardamine IV. Dalechamp. Lugd. 659. vel Nasturtium aquaticum minus CBP. sive Sisymbrium cardamine hirsutum minus flore albo IB. 2. 888. *cruciformi fructu siliquoso,* gar kleiner Wasser Kresse, in schattichten feuchten Wäldern.

Caryophyllata vulgaris T. *flore parvo, luteo, rosaceo, IB. 2. 398. foliis pinnatis, radice tenui, subrufa, bene spirante, fructu globoso* Benedicten oder Mertzwurtzel *Ic. 1. Tab. hist. 326. & Lobel. Ic. 693. Benoitte,* aller Orten in denen Hägen und Zäunen. *perenn.*

Caryophyllata vulgaris, majore flore T. Benedicten Wurtzel, mit grossen gelben Blumen, *Ic. Fuchs. hist. 385.* auf denen Wiesen, bey Andlau häufi. *perenn.*

Caryophyllata aquatica, flore nutante T.

rubro

rubro striato IB. 2.398. *purpuro pallescente, striato, rosaceo, radice longa & densa, sed minus fibrosa purpurascente amariuscula, Ic.* 2. *Tab. hist.* 326. *Benoite aquatique,* Wasser Benedicten Kraut, mit hangenden Blumen, auf feuchten Wiesen des kleinen Hochfelds gegen Lothringen *perenn.*

Cerasus major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente T. sive Cerasus sylvestris fructu nigro *IB.* 1. 220. *flore simplici albo rosaceo, Merisier,* schwartze süsse wilde Kirschen, in der Ruprechtsau *unde fructus apud nos audiunt* Ruprechtsauer Kirschen, in dem Illkircher und Ganßauer Wald. *perenn.*

Cerasus fructu albo dulci T. weisse süsse Kirschen, auf Brach-Ackern bey Illkirch, auch häuffig auf dem Gebürg hinter Barr. *perenn.*

Cerasus fructu parvo rubro amaricante, Mapp. hist. sive Cerasus sylvestris fructu rubro *IB.* 220. wilde rothe Wald-Kirschen, in dem Ganßauer Wald. *perenn.*

Cerasus fructu acido serotino, succi sanguinei T. Amarellen Baum *Ic.* 4. *Tab. hist.* 1399. an denen Wegen vor dem Spithal-Thor, und in denen Gärten.

Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli nigro minore, T. sive *Padus IB.* 1. 228. Elsen Beeren Baum, schwartze Vogelkirschbaum, *Bois de Lucie XI. II. Tab. hist. plant.* 1401. *perenn.*

Cerasus pumila fructu rubro minore, sive Chamæcerasus fructu rubro *Tab. hist. Ic.* 12, 1401.

1401. kleiner wilder Kirschbaum, Erd Weixelbaum, auf dem Hochfelder Gebürg. *perenn.*

Cerasus sylvestris amara Mahaleb putata *IB.* 1. 227. & *Tab. hist.* 1402. *Grenouillier* Steinkirschen, Dintenbeeren, bey Rheinau an dem Rhein. *perenn.*

Cerasus major fructu magno cordato T. sive *Cerasa Pliniana Tab. hist. Ic.* 1399. Hertzkirschen, *Bigarotier* in Gärten. *perenn.*

Cyperoides nigro luteum vernum majus, T. sive Graminis nigro lutei verni varietas major *IB.* 2. 494. *floribus apetalis in spicam congestis*, frühblühendes schwartz gelbes cypern Graß, hin und wieder auf feuchten Wiesen. *perenn.*

Cyperoides sylvarum spica varia, Garidel *caule triquetro fructu triangulo Scheuchzer. Agrost. pag.* 448. *Tab. X. Fig.* 14. in abgehauenen Höltzern in dem Brumbter Wald. *perenn.*

Cyperoides nigro luteum vernum minus T. früh blühend kleines cypern Graß, mit schwartz gelber Aehre *Ic. IB. 2. pag.* 494. auf dürren Wiesen, gegen Oßwald. *perenn.*

Cyperoides spicis variis nemorense T. Nelcken Graß in Büschen und Wäldern in dem Illkircher Wald *Ic. CB. prodr*, 2, *pag.* 9. *perenn.*

Cyperoides foliis caryophyllæis, spicis è rarioribus & tumidioribus vesicis compositis T. auf tiefen und feuchten Wiesen, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Dens leonis folio latiore T. sive Hedypnois, vel Dens Leonis *Fuchs. IB.* 2. 1035. *flore luteo*

com-

composito semi flosculoso, vulgo Taraxacum officinarum, Löwen Zahn, Pfaffenröhrlein, Seichblumen, *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 481. *Pisenlit*, auf allen grasichten Böden und Rändern *perenn.*

Dens leonis amplissimo folio *T. obtuso* breitblättrichter, vornen zu stumpfer Löwen Zahn, *ibid. perenn.*

Fagus T. Oxya græcorum *IB.* 1. 117. roth Buchen, *floribus amentaceis glomeratim positis Ic. Tab. hist. pag.* 1388. in denen Wäldern um die Statt. auf dem Gebürg zu Oberbron. *perenn.*

Fragaria sterilis T. *seu non fragifera, flore simplici albo rosaceo, foliis hirsutis.* vel non vesca *IB.* 2. 395. falsch Erdbeer Kraut *Ic. Lob.* 395. häufig in dem Eckbolzheimer Wald. *perenn.*

Fraxinus humilior, sive altera Theophrasti minore & tenuiore folio T. *IB.* 1. 177. Stein oder Bachesche, auf dem Hochgebürg Rappolstein. *perenn.*

Fraxinus excelsior T. sive vulgatior *IB.* 1. 174. *floribus subluteo purpureis apetalis, foliis pinnatis ac crenatis, semine acri linguam exprimente, Ic. Tab. hist.* 1428. *Fréne* an der Landstrasse gegen Illkirch, in dem Illkircher Wald. *perenn.*

Fungus pileolo rotundiori *Mouceron* dictus T. seu esculentus *IB.* 3. 823. Dorn Schwamm in dem Ganßauer und Illkircher Wald.

Fungus orbicularis exalbidus pratensis Haller, quod III. genus clus. hist. Fungor. esculent. CCLXIV. Mayschwamm, Weißling, zu Oßwald.

Geranium Cicutæ folio inodorum, T. Storchenschnabel, mit Schierlings Blättern, neben dem Weg, gegen der Aubruck, und sonst auf Aeckern, in der Ruprechtsau, est Geranium inodorum H. Eyst.

Gramen spicatum, glumis variis, T. sive Gramen versicolor *IB*.2.466. auf denen bergichten trockenen Orten, zu Rappolstein *perenn.*

Hesperis sepiaria allium redolens T. sive Alliaria Math. *IB*. 2. 883. *flore albo simplici cruciformi, folio lato serrato radice longiuscula* Ic. Tab. hist. pag. 1144. Hecken Knoblauchkraut, an allen Zäunen *ann.*

Juncus villosus capitulis psyllii T. sive Gramen cyperinum pilosum *Tab. hist. Ic.* 2. *pag.* 532. est Gramen exile hirsutum cyperoides *Lob. IB*. 2. 493. haricht cypern Graß hinter Baar auf dem Gebürg. *perenn.*

Lamium alba linea notatum T. *flore albo. simplici monopetalo labiato, folio oblongo, radice fibrosa* Ic. 1. *Tab. hist. pag.* 923. & *Garidel hist. plant. Tab.* 58. todte oder taube Neßel, mit bezeichneten Blättern, oder weisen Strichen. *Ortie mort. à raies blanches.* auf dem Spital-Wall, und andern Orten mehr. *perenn.*

Lamium alba linea notatum, flore purpureo simplici, taube Neßeln, mit gestriften weisen Blättern, und rothen Blumen. *perenn. ibid.*

Lamium foliis caulem ambientibus majus flore rubro, grosse Acker Neßel, mit rothen Blumen *Ic. Tab. hist.* XII. 1090. & *in Rivin. non est varietas*

rietas mente Mapp. auf allen Aeckern. *ann.*

Lamium folio caulem amplectente minus T. sive *Galeopsis iners minor IB.* 3. *app.* 853. Galeopsis folio caulem ambiente *Rivin Ic.* 1. kleine todte Ackerneßel, mit rothen Blumen *ibid.* *ann.*

Utrumque quandoque invenitur floribus albis, sed rarius.

Lamium folio oblongo, flore rubro T. sive Galeopsis iners flore purpurascente majore, folio non maculato *IB.* 3. 321. taube Neßel mit langlichten Blättern und rothen Blumen *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 903. aller Orten auf denen Wällen und an denen Zäunen. *perenn.*

Lamium vulgare album T. sive Lamium folio oblongo non maculato non fœtido, flore albo, est Galeopsis iners floribus albis *IB.* 3. 322. *Ortie blanche morte* todte weiße Neßel, Weiber-Neßel *quia floribus uti solent ad compescend. fluorem album* est Lamium verum Plin. *ibid. perenn.*

Lamium purpureum fœtidum folio subrotundo seu Galeopsis Dioscor. T. Galeopsis sive Urticà iners folio & flore minore *IB.* 3. 321. vel Galeopsis minor Rivin. rothe stinckende taube Neßel, mit rundlechten Blättern, an denen Zäunen aller Orten. *ann.*

Lamium purpureum fœtidum, folio subrotundo minus, H.L.B. *Ic. in Rivin.* auf denen Aeckeren bey Schiltigheim und Oßwald. *ann.*

Leucojum luteum vulgare T. *flore simplici cruciformi sive* Keiri officinar. *Violette jaune* gelbe

gemeine Nägelblum, Ic. Clus. hist. 299. hin und wieder in Gärten,

Leucojum hesperidis folio T. sive Turrita major Plateau, *Clus hist.* CXXVI. Turritis 2. *Clus.* & *IB.* 2. 836. zu Oßwald in den Ostwinckel häufig.

Leucojum vernum perenne album majus T. quod Draba II. Clus. hist. CXXV. *sive* Hesperis alpina, aut muralis minor, repens *IB.* 2. 880. *foliis incisis, imis per terram sparsis hirsutis & asperis, è principio radicis angustis, ad extremum autem sensim sensimque latioribus, flosculis cruciformib. pallide cæruleo albicantibus, siliquis longis, radice alba lignosa,* est Hesperis saxatilis Tournef. alsat. ubi *Ic. pag.* 130. kleine weise Stein-Leucojen, auf dem Berg der heiligen Ottiliæ.

Linaria hederaceo folio glabro T. seu Cymbalaria vulgaris, *flosculis purpurascentibus, monopetalis, labiatis, radice tenui, Ic. Rivin.* & *IB.* 3. 685. *Linaire de Muraille,* an denen alten Mauren der Stattgräben. *perenn.*

Mercurialis testiculata montana T. *sive* Cynocrambe Mas, vel mercurialis, *IB.* 2. 979. *repens floribus apetalis viridibus trilobatis, radice alba Ic. Tab. hist.* 942. *Mercuriale sauvage de montagne ou Chou de Chien, per me sata copiose provenit* auf dem Haulenberg, Bingelkraut Männlein, auf dem Hochgebürg hinter Haßlach, gegen Nierderb. *perenn.*

Mercurialis montana spicata T. repens vel *Cynocrambe fœmina florib. amentaceis fructu bicapsulari* IB. 2. 979.

2. 979. & *Tab. hist. pag.* 942. Wald oder Berg-Bingelkraut Weibl. in dem Barrer Wald-Weg, bey der ersten Ertzgrub. *perenn.*

Morus fructu nigro T. *flore subluteo amentaceo conglomerato Ic. Tab. hist. pag.* 1390. *Meurier noir* Maulbeerbaum, mit schwartzer Frucht, auf dem Schießreiner Wacken.

Morus fructu albo T. Maulbeerbaum, mit weisser Frucht. *Meurier blanc Ic. Tab. hist. pag.* 391. *ibid. copiose.*

Myosotis arvensis subhirsuta, flore majore, T. sive Auricula muris, parvo flore albo IB. 3.360. *rosaceo albo, fructu unicapsulari*, sive Holosteum Caryophylæum *Tab. hist. Ic.* 1. *pag.* 543. & *Vaillant Ic.* 4. *Tab.* XXX. weiß Nägelein Graß, weise Acker Negelein, *Oreil de souris.* zu Oßwald an denen Aeckeren, in der Contrescarpe am Steinstrasser Thor *perenn.*

Myosotis arvensis hirsuta parvo flore T. sive Myosotis arvensis folio subrotundo hirsuto, flore parvo albo rosaceo, quæ Auricula muris quorundam flore parvo, *vasculo tenui longo IB.* 3. 359. & Vaill *Ic.* 3. *Tab.* XX. kleine Acker Negelein, mit ablang runden harichten Blättern, gegen der Hohenwart und Schnackenloch über, am Weg, wie auch an denen Wegen, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Myosotis hirsuta altera viscosa T. *flosculis albis, rosaceis* glebichter Acker Hüner-Darm *Ic.* 1. *Vaillant Tab.* XXX. an denen Wegen gegen Eckbolsheim, und auf Ackern in der Ruprechtsau.

Myosotis hirsuta minor T. *flore albo.* kleiner harichter Hüner-Darm, *Ic. 2. Vaill. Tab.* XXX. auf dürren Wiesen auf der Gansau.

Napus sativa T. *flore simplici luteo cruciformi, radice rapacea alba, fructu siliquoso* Saat oder Steckruben. *Ic. Matth. comment.* 398. *Naveau* auf denen Aeckern *ann.*

Napus sylvestris T. *flore luteo radice crassa & longa, acri amaricante* sive Napus seu Bunias sylvestris flore luteo. *Lob. Ic.* 200. & *Matthiol. Epitom.* 220. wilde Steckruben *cujus semina à nostratibus appellantur.* Rebssaamen, *Navet sauvage,* auf denen Aeckern um die Statt. *ann.*

Nasturtium petræum, foliis bursæ pastoris T. *glabris, flore simplici cruciformi albo, capsulis latis, radice tenui fibrosa, Ic. Tab. hist.* 842. sive Pastoria bursa minima *Lobel. Icon.* 221. vel Bursa pastoris parva, folio glabro spisso *Ic. IB.* 2. 937. Stein oder Bergkresse, *Cresson de Montagne.* zwischen denen Fugen alter Schlösser, häufig auf dem alten Bergschloß, zu Rappolstein.

Omphalodes pumila verna symphyti fol. T. *flore monopetalo caerul. rotato* sive *Symphyt.* pumilum repens, vel Borrago minima herbarior. *IB.* 3. 597. in Gärten und auf dem Haulenberg.

Orchis trifolia major T. sive Triorchis trifolia *Ic. VII. Tab. hist.* 1059. *Couillon de Renard,* Bergknaben-Kraut, mit 3. Wurtzeln, auf dem Gebürg im Steinthal. *perenn.*

Orobus sylvaticus vernus T. *flore purpureo simplici papilionaceo, siliquis erectis, foliis latioribus pinnatis,*

natis, radice longa fibrosa fructu tereti siliquoso, frühzeitige Wald-Erbsen, est Orobus Rivin & *Clus hist. Ic.* 1. *pag.* CCXXX. *sub nomine* Orobi Pannon, im Oberneheimer Wald, bey der Gänßburger Melckerey, in dem Barrer Wald. *perenn.*

Oxys flore albo T. sive *Trifolium acidum, flore alb. IB.* 2. 387. *flore albo monopetalo campaniformi multifido, radice oblonga fibrosa, fructu oblongo*, Sauerklee, mit weisen Blumen, Buchampfer, *Alleluja á fleur blanche* Ic. 1. Tab. hist. 910. in dem Oberehenheimer und Barrer Wald.

Oxys flore purpurascente T. sive Trifolium acidum flore purpurascente *IB.* 2, 387. *Alleluja à fleur purpurine*, Sauer Klee, mit röthlichten Blumen. *ibid.*

Persica molli carne & vulgaris viridis & alba T. *floribus rosaceis incarnatis, foliis oblongis serratis & amaris, fructu molli, officulo fœto* gemeiner Pfersich-Baum, *Pecher de montaigne Ic.* 1. *Tab. hist.* 1408. aller Orten in Gärten, und in denen Weinbergen *perenn.*

Persica succo quasi sanguineo T. sive *Persica rubra extus lanuginosa. Tab. hist. Ic.* 1408. Blut oder roth Pfersichbaum *ibid. perenn.*

Persica dura carne buxea T. gemeiner Feld Pfersichbaum, mit kleiner harten und gelben Frucht. in denen Weinbergen.

Pervinca vulgaris angustifolia, flore cœruleo T. sive Clematis Daphnoidis, minori flore cœruleo simplici IB. 2. 130. *monopetalo infundibuliformi, fructu siliquoso.* Sinngrün Todten-Blu-

Blumen *Ic. Tab. hist. pag.* 1270. *Pervenche à fleur bleue*, an dem Hag hinter St. Gallen, bey St. Helena, an denen Zäunen. *perenn.*

Pervinca vulgaris angustifolia flore albo T. & *IB.* 2. 130. Sinngrün, mit weissen Blumen, *Pervenche à fleur blanche* in dem Foren Wäldlein gegen Ensisheim. *perenn.*

Polygaloides Haller. *humilis, foliis imis subrotundis, superioribus perangustis linea designatis, flore oblongo flavescente papilionaceo, colluteæ simili, macula ochroleuca insignito, siliquis cordatis, bursa pastoriæ æmulis* sive Chamæbuxus flore coluteæ CB. est Pseudo chamæbuxus *H. Eyst.* vel Anonymos Clus hist. 105. kleiner wilder Buchs, auf dem Hochfelder und Wassenburger Gebürg.

Prunus sylvestris T. & IB. 1. 193. seu Acacia germanica officinar. *flore simplici albo rosaceo odoro, fructu ex cæruleo nigricante, Ic. Tab. hist.* 1405. *Prunier sauvage.* Schlehen Hecken, oder Schlehendorn, fast aller Orten in denen Hecken und Zäunen.

Prunus sylvestris præcox altior. HRPar. Pruna avenaria Haber Schlehenbaum *Ic. Tab. hist.* 1403. beym Mauerhof, in denen Hecken Ruprechtsauer Wald, an dem Rhein *perenn.*

Pulsatilla folio crassiore & majore flore T. *purpureo simplici rosaceo; radice oblonga fibrosa subdulci Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 8. sive Pulsatilla purpurea cœrulea *IB.* 3. 409. *Coquelourde, à fleur bleue*, blaue Kuchen Schellen nostratibus Oster-

blum.

blum, auf der Heyde zu Oßwald häufig. *perenn.*
Pulsatilla flore rubro obtuso, fructu multicapsulari T. sive Pulsatilla rubra *IB.* 3. 410. & *Lob. Ic.* 282. Kuchen Schelle, mit rothen Blumen *Coquelourde, à fleur purpurine.* auf der Gansau, bey dem Krümmerich, auf den Wiesen bey Marlenheim.

Quinquefolium majus repens T. sive Quinquefolium vulgare rapens *IB.* 2. 397. *floribus rosaceis auro æmulis, radice subrufa oblonga repente fructu globoso. Ic. 4. Tab. hist. pag.* 351. *Quintefeuille.* gemein 5. Finger Kraut, auf der Metzgerau, in der Ruprechtsau, an denen Wegen, und anderen sonnenreichen Orten und Reinen der Weinberge. *perenn.*

Quinquefolium majus album alterum T. sive 1. *majus albo flore clus. hist. CV.* weiß wild 5. Finger Kraut, est Pentaphyllum flore albo *IB.* 2. 598. & *H. Eyst.* auf dem Wassenburger Gebürg, bey Oberbronn, auf Bergmatten bey Lichtenberg *perenn.*

Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum T. flavo colore 1. species *Clus hist. CVI.* seu Pentaphyllum minus, molli lanugine pubescens, flore luteo *IE.* 2. 598. auf dem Gebürg, hinter Rappolsweiler *perenn.*

Quinquefolium minus repens luteum T. est *Quinquefolium minus Tab. hist. Ic. XIII. pag.* 354. seu Pentaphyllum parvum hirsutum IB. 2. 398. klein harricht 5. Finger Kraut, hin und wieder an denen Strassen und Hügeln *perenn.*

Ranun-

Ranunculus phragmites albus vernus T. *flore simplici rosaceo, radice russa repente*, wilder weisser Wald oder Hecken Hahnen-Fuß, *Ic. Tab. hist.* 8. *pag.* 109. *Grenouillete blanc, de bois* in dem Eckbolsheimer Wald.

Ranunculus phragmites purpureus vernus T. rother Wald oder Hecken Hahen Fuß, *Renuncle de bois à fleur purpurine*, zu Oßwald im Ostwinckel. *Ic. Tab. hist.* IX, *pag.* 109. *perenn.*

Ranunculus phragmites luteus, *flore minore modo simplici, modo gemello.* gelber Wald Hahnen Fuß, *Renoncle de bois, à fleur jaune.* bey Oßwald sehr häufig, und auf dem Gebürg St. Ottiliæ. *perenn.*

Ranunculus nemorosus folio rotundo T. *fructu globoso vel Sylvaticus, foliis inferioribus rotundis, superioribus floribus proximis valde angustis, laciniis dissectis luteis.* est Ranunculus rotundifolius vernus sylvaticus *IB.* 3. *app.* 857. Süeser Wald Hahnen-Fuß, *Renoncle de bois à feuilles rondes Ic.* II. *Tab. hist. pag.* 117. *perenn.*

Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli, flore phœniceo T. *fructu globoso* seu Flos Adonis Matthiol. Eptim. 647. & *Tab. hist. Ic.* 1. *pag.* 72. hoch rothe Feld- oder Acker-Rößlein, in denen Feldern unter der Frucht *ann.*

Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli flore citrino T. qui Adonis flore luteo *Tab. hist. Ic.* 2. 72. gelbe Feld-Rößlein, in denen Frucht Feldern bey Niederhaußbergen, wie auch zwischen Lingolsheim und Ensisheim. *ann.*

Ranun-

Ranunculus pratensis erectus acris T. *non repens, flore luteo simplici IB.* 3. 416. *folio napello simili, radice alba fibrosa Ic.* II. *Tab. hist. pag.* 107. est Ranunculus pratensis surrectis cauliculis *Lob. Ic.* 665. *Renoncule piquant des prez.* brennender Wiesen Hahnen Fuß. *perenn.*

Ranunculus pratensis acris erectus & maculatus, T. radice alba non repente brennender Hahnen-Fuß mit gefleckten Blättern. prioris est varietas. *perenn.*

Salix latifolia rotunda T. sive Salix. caprea rotundifolia *Tab. hist. Ic.* III. 1452. *foliis inferne hirsutis* IB. 1. 215. *floribus luteis amentaceis suaveolentibus* Palm oder weiß Weyden. *Marceau.* in denen Hecken gegen Oßwald, neben dem Canal am Eckbolsheimer wald. *perenn.*

Salix vulgaris alba arborescens T. sive *Salix maxima fragilis hirsuta* IB. 1. 212. *floribus luteis spicatis in pappum abeuntibus, foliis superne virentibus, inferne candicantibus utrinque hirsutis, vix serratis, cortice cinereo. Saule.* est Salix Dioscorid *Lob. Ic.* 136. Pfahl oder weise Baum Weide, an denen Wassern und an denen feuchten Orten. *perenn.*

Salix vulgaris nigricans folio non serrato T. seu Phœnicea Lugd. 277. *quæ rubra & minus fragilis, folio longo angusto, subtus nonnihil candicante* IB. 1. 215. rothe Baum, oder Seilweide, Korbmacher Weide Ic. IB. 1. 215. & *Lugd.* 277. *perenn.* an dem Canal an der Breusch, und anderen Orten mehr.

Salix vulgaris rubens T. *foliis longis & angu-*

stis

stis quæ Salix Amerina Lugd. 714. rothe Kiefer oder Baumweide, oberhalb der grünen Warth, am meisten in denen Baumgärten Ozier. *perenn.*

Salix aurita & non aurita, folio amygdalino utrinque virente T. quæ latifolia sylvestris *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1452. & *fragilis*, mürbe Bruchweide, Roßweide, fast an allen Wasserbächen *perenn.*

Salix oblongo incano acuto folio T. *foliis angustis & longissimis crispis, subtus albicantibus IB.* 1. 212. Spitzweide, mit langen krausen Blättern, an dem Canal, copiose, an der Ill, gegen den Wasser über. *perenn.*

Salix humilis capitulo squamoso T. quæ *fragilis, folio minore angusto, utrinque glabro sub cœruleo,* est Salix tenuior, folio minore I. B. 1. 213. *seu Salix helice* Theophrasti *Lugd.* 277. kleine Sumpf- oder Rhein-Weide, an dem Rhein, vor dem Spithal-Thor, unten in der Tiefe *perenn.*

Salix latifolia repens T. Erd oder Kriechende Weide *Ic. V. Tab. hist. p.* 1453. in tiefen Gruben, neben dem Canal. *perenn.*

Salix fragilis T. seu spontanea, *Julis brevibus, folio angusto, prona parte incano, superius atrovirente, cortice albo.* Bruch oder Glaßweide, in sumpfichten Orten, und oberhalb der grünen Warth. *Perenn.*

Salix pumila, foliis utrinque canticanbus & lanuginosis T. kleine weiß oder Bruchweide, aller Orten auf feuchten Wiesen bey Oßwald, in der Ruprechtsau in den XV. Wört. *perenn.*

Salix

Salix folio ex rotunditate acuminato T. sive Aquatica seu Caprea latifolia *Tab. hist. pag.* 1452. Kätzelweide, Holweide, mit rundlechten und etwas zugespitzten Blättern; in feuchten Gräben, an dem Illfluß, gegen Arbogast, ist die erste die ausbricht, wovon die jungen Knaben die Frühlings-Pfeiffen zubereiten. *perenn.*

Salix sativa lutea, folio crenato T. *flore amentaceo, seu Viminea angustifolia sylvestris, cortice luteo, est* Salix vulgatissima. gelbe Band Weide *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1452. an dem Eckbolsheimer Canal, und auf allen Band-Plätzen. *perenn.*

Salix folio longo, angustissimoque, utrinque albido T. sive Elæagnus Dalechamp. *Lugd.* 278. Weide, mit den schmählesten und längsten beyderseits weisen Blättern, in der Wantzenau auf denen Rheinwörten.

Sambucus racemosa rubra T. seu *acinis rubris IB.* 1551. *fructu globoso floribus ex albido flavescent. monopetal. rotatis multifidis* sive Montana racemosa *Lob. hist.* 163. & *Tab. hist. Ic.* 3. 1440. *Sureau de Cerf.* Wilder edler Hirschholder, auf denen Bergen, in feuchten dunckelen Orten, auf dem St. Ottilien Gebürg. *perenn.*

Saxifraga alba rotundifol. T. sive Saxifraga alba radice granulosa *IB.* 3. 706. *flore albo rosaceo foliis parvis subrotundis pinguibus, radice granulosa fructu subrotundo bicapsulari Ic.* 1. *Tab. hist.* 1222. Saxifrage, weiser Steinbrech, auf der Wiese, beym Eckbolsheimer Ziegelofen. *perenn.*

Saxifraga verna annua humilior T. sive Tri-

lites tectorum, flore albo *IB.* 3. 762. *simplici rosaceo, folio rutaceo, radice fibrosa.* Frosche Datzen, Hänplein Kraut, kleiner weiser Steinbrech *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1088. auf allen unsauber gehaltenen Dächern, auf alten Mauren. *ann.*

Sinapi album, siliqua hirsuta; semine albo & rufo, *flore cruciformi fructu siliquoso* T. *Ic. IB.* 2 856. *Moutarde* gelber Senf, Garten Senf, auf den Dörfern, hin und wieder auf den Aeckern, mit weisen Körnern. *ann.*

Sinapi rapifolio T. quod *Sativum seu vulgare, siliqua latiuscula glabra, semine ruffo. IB.* 2. 855. gemeiner wilder brauner Senf, mit braunen Körnern, neben denen Aeckeren, hinder Gunders Hofen. *ann.*

Sorbus sativa T. *flore rosaceo albo racemoso, fructu carnoso oblongo,* Eschen Rößlein Baum *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1426. *Sorbier,* in dem Gebürg und Waldungen zu Osthofen, wie auch zu Niederbronn. *peren.*

Taxus T. & *IB.* 1. 241. *floribus amentaceis luteis, foliis abieti similibus pinnatis, fructu rubro glutinoso, molli pulposo Ic. Matth.* 414. & *Epitome* 540. Ivenbaum, Taxbaum, If. in dem Niedecker-Thal am Bach, und sonst in hohen schattichten Waldungen: *perenn.*

Thlaspi arvense perfoliatum majus T. sive *Bursa* pastoria, foliis perfoliatæ *IB.* 2. 938. *flosculis albis cruciformibus* est *Thlaspi oleraceum Tab. hist. Ic.* 9. 851. Bauren Senf, mit durch Wachs-Blättern, auf steinichten Aeckern und in Weinbergen. *ann.*

Thlaspi

Thlaspi perfoliatum minus T. kleiner Bauren Senf, mit durchwachs Blättern *Ic.* 19. *Tab. hist.* 854. est Thlaspi III. pumilum, Clus. hist. CXXXI. *ann.*

Thymelæa alpina linifolio humilior, flore monopetalo purpureo *infundibuliformi* odoratissimo T. *fructu ovato*, sehr wohl riechender Kellerhals, auf dem Hochgebürg Hochfelden. *Ic. Matthiol. sub nomine Cneorum, pag.* 42. *perenn.*

Thymelæa laurifolio deciduo, sive Laureola fæmina, *fructu ovato* T. sive Mezereum Germanicum *IB.* 1. 566. Seidelbast, Kellerhalß, auf der Gansau, und in dessen Wald, wie auch im Wald zu Illkirch *Mezereon. perenn.*

Thymelæa laurifolio semper virens, seu Laureola major T. sive Laureola semper virens flore luteolo *IB.* 1. 564. *Laureole & Tab. hist.* 1488. Seidelbast oder Kellerhalß, mit immer zu grünenden Blättern, in dem Ganßauer Wald. sed rarissime.

Tithymalus cyparissias T. sive Tithymalus cupressinus sive humipinus *Lob. Ic.* 356. est Esula officinarum, *flosculis luteis monopetalis campaniformib. globosis divisis, radice longa fibrosa, fructu multicapsulari* Wolfs oder Teuffels-Milch, *Ic. Tab. hist.* 990. quæ Esula Rivini, *Titimale,* auf ungebauten Oertern, auf der Metzgerau und in der Ruprechsau *perenn.*

Tithymalus cyparissias capitulo rubente T. *Ic.* 12. *Tab. hist.* 990. Wolfs-Milch, mit rothen Käplein, auf dem Gebürg bey Ottrot. *perenn.*

Tithymalus cyparissias foliis punctis croceis notatus *CBp.* seu *Esula degener Rivin* Wolfs-Milch mit punctirten Blättern, zwischen denen andern Gattungen. *perenn.*

Turritis vulgaris ramosa T. *florib. cruciformibus, fructu siliquoso bicapsulari* sive Bursa pastoria seu Pilosella siliquosa *IB.* 2. 870. Wilder Stein oder Bergkresse vid. Tab nostr. I. *perenn.*

Turritis hirsuta montana flore albo Rupp. Flor. Ienens. 62 quæ Erysimo similis hirsuta alba CB. Prodr. *ubi Icon pag.* 942. kleiner Berg-Kresse, auf steinichten Feldern / unten an dem Hochgebürg Hochfelden.

Turritis, foliis inferioribus cichoraceis, cœteris perfoliatæ T. *floribus ex albo pallescentibus cruciformibus, fructu siliquoso,* seu Sinapi album Lugd. 1168. Thurnsenf oder Köhl, in dem Ost-winckel, an denen Hecken häufig. *perenn.*

Valeriana palustris major T. *foliis latioribus laciniatis, floribus monopetalis, infundibuli formibus albicantibus divisis, radice crassa subflava, odoris gravis, fructu oblongo.* groser wilder Wasser-Baldrian oder Katzenwurtz *Valeriane sauvage Ic. in Rivin.* in feuchten Orten, auf der Gallen-matt, in allen Gräben ausserhalb der Statt. *perenn.*

Valeriana sylvestris major T. *sive magna aquatica IB.* 3. *par* 2. 210. groser wilder Baldrian, gemeine Katzen-Wurtzel, in der Ruprechtsau, und beym Mauerhof. *perenn.*

Valeriana palustris minor T. *seu* Minor pratensis

p. 36.

Tab. I.

Turritis vulgaris ramosa. T.



J. Striedbeck sculp.

lites tectorum, flore albo *IB.* 3. 762. *simplici rosaceo, folio rutaceo, radice fibrosa.* Frosche Datzen, Händlein Kraut, kleiner weiser Steinbrech *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1088. auf allen unsauber gehaltenen Dächern, auf alten Mauren. *ann.*

Sinapi album, siliqua hirsuta; semine albo & rufo, *flore cruciformi fructu siliquoso* T. *Ic. IB.* 2 856. *Moutarde* gelber Senf, Garten Senf, auf den Dörfern, hin und wieder auf den Aeckern, mit weisen Körnern. *ann.*

Sinapi rapifolio T. quod *Sativum seu vulgare, siliqua latiuscula glabra, semine ruffo. IB.* 2. 855. gemeiner wilder brauner Senf, mit braunen Körnern, neben denen Aeckeren, hinder Gunders Hofen. *ann.*

Sorbus sativa T. *flore rosaceo albo racemoso, fructu carnoso oblongo,* Eschen Rößlein Baum *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1426. *Sorbier,* in dem Gebürg und Waldungen zu Osthofen, wie auch zu Niederbronn. *peren.*

Taxus T. & *IB.* 1. 241., *floribus amentaceis luteis, foliis abieti similibus pinnatis, fructu rubro glutinoso, molli pulposo Ic. Matth.* 414. & *Epitome* 540. Ivenbaum, Taxbaum, If. in dem Niedecker-Thal am Bach, und sonst in hohen schattichten Waldungen: *perenn.*

Thlaspi arvense perfoliatum majus T. sive *Bursa* pastoria, foliis perfoliatæ *IB.* 2. 938. *flosculis albis cruciformibus* est *Thlaspi oleraceum Tab. hist. Ic.* 9. 851. Bauren Senf, mit durch Wachs-Blättern, auf steinichten Aeckern und in Weinbergen. *ann.*

Thlaspi

Thlaspi perfoliatum minus T. kleiner Bauren Senf, mit durchwachs Blättern *Ic.* 19. *Tab. hist.* 854. est Thlaspi III. pumilum, Clus. hist. CXXXI. *ann.*

Thymelæa alpina linifolio humilior, flore monopetalo purpureo *infundibuliformi* odoratissimo T. *fructu ovato*, sehr wohl riechender Kellerhals, auf dem Hochgebürg Hochfelden. *Ic. Matthiol. sub nomine Cneorum, pag.* 42. *perenn.*

Thymelæa laurifolio deciduo, sive Laureola fæmina, *fructu ovato* T. sive Mezereum Germanicum *IB.* 1. 566. Seidelbast, Kellerhalß, auf der Gansau, und in dessen Wald, wie auch im Wald zu Jllkirch *Mezereon. perenn.*

Thymelæa laurifolio semper virens, seu Laureola major T. sive Laureola semper virens flore luteolo *IB.* 1. 564. *Laureole* & *Tab. hist.* 1488. Seidelbast oder Kellerhalß, mit immer zu grünenden Blättern, in dem Ganßauer Wald. sed rarissime.

Tithymalus cyparissias T. sive Tithymalus cupressinus sive humipinus *Lob. Ic.* 356. est Esula officinarum, *flosculis luteis monopetalis campaniformib. globosis divisis, radice longa fibrosa, fructu multicapsulari* Wolfs oder Teuffels-Milch, *Ic. Tab. hist.* 990. quæ Esula Rivini, *Titimale*, auf ungebauten Oertern, auf der Metzgerau und in der Ruprechsau *perenn.*

Tithymalus cyparissias capitulo rubente T. *Ic.* 12. *Tab. hist.* 990. Wolfs-Milch, mit rothen Käplein, auf dem Gebürg bey Ottrot. *perenn.*

Tithymalus cyparissias foliis punctis croceis notatus CBp. seu *Esula degener Rivin* Wolfs-Milch mit punctirten Blättern, zwischen denen andern Gattungen. *perenn.*

Turritis vulgaris ramosa T. *florib. cruciformibus, fructu siliquoso bicapsulari* sive Bursa pastoria seu Pilosella siliquosa *IB.* 2. 870. Wilder Stein oder Bergkresse vid. Tab nostr. I. *perenn.*

Turritis hirsuta montana flore albo Rupp. Flor. Ienens. 62 quæ Erysimo similis hirsuta alba CB. Prodr. *ubi Icon pag.* 942. kleiner Bergkresse, auf steinichten Feldern / unten an dem Hochgebürg Hochfelden.

Turritis, foliis inferioribus cichoraceis, cœteris perfoliatæ T. *floribus ex albo pallescentibus cruciformibus, fructu siliquoso*, seu Sinapi album Lugd. 1168. Thurnsenf oder Köhl, in dem Ostwinckel, an denen Hecken häufig. *perenn.*

Valeriana palustris major T. *foliis latioribus laciniatis, floribus monopetalis, infundibuli formibus albicantibus divisis, radice crassa subflava, odoris gravis, fructu oblongo.* groser wilder Wasser-Baldrian oder Katzenwurtz *Valeriane sauvage Ic. in Rivin.* in feuchten Orten, auf der Gallenmatt, in allen Gräben ausserhalb der Statt. *perenn.*

Valeriana sylvestris major T. *sive magna aquatica IB.* 3. *par* 2. 210. groser wilder Baldrian, gemeine Katzen-Wurtzel, in der Ruprechtsau, und beym Mauerhof. *perenn.*

Valeriana palustris minor T. *seu* Minor pratensis

p. 36. Tab. I.

Turritis vulgaris ramosa. T.



J. Striedbeck sculp.

lites tectorum, flore albo *IB.* 3. 762. *simplici rosaceo, folio rutaceo, radice fibrosa.* Frosche Datzen, Händlein Kraut, kleiner weiser Steinbrech *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1088. auf allen unsauber gehaltenen Dächern, auf alten Mauren. *ann.*

Sinapi album, siliqua hirsuta; semine albo & rufo, *flore cruciformi fructu siliquoso* T. *Ic. IB.* 2 856. *Moutarde* gelber Senf, Garten Senf, auf den Dörfern, hin und wieder auf den Aeckern, mit weisen Körnern. *ann.*

Sinapi rapifolio T. quod *Sativum seu vulgare, siliqua latiuscula glabra, semine ruffo. IB.* 2. 855. gemeiner wilder brauner Senf, mit braunen Körnern, neben denen Aeckeren, hinder Gunders Hofen. *ann.*

Sorbus sativa T. *flore rosaceo albo racemoso, fructu carnoso oblongo,* Eschen Rößlein Baum *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1426. *Sorbier,* in dem Gebürg und Waldungen zu Osthofen, wie auch zu Niederbronn. *peren.*

Taxus T. & *IB.* 1. 241., *floribus amentaceis luteis, foliis abieti similibus pinnatis, fructu rubro glutinoso, molli pulposo Ic. Matth.* 414. & *Epitome* 540. Ivenbaum, Taxbaum, If. in dem Niedecker-Thal am Bach, und sonst in hohen schattichten Waldungen: *perenn.*

Thlaspi arvense perfoliatum majus T. sive *Bursa* pastoria, foliis perfoliatæ *IB.* 2. 938. *flosculis albis cruciformibus* est *Thlaspi oleraceum Tab. hist. Ic.* 9. 851. Bauren Senf, mit durch Wachs-Blättern, auf steinichten Aeckern und in Weinbergen. *ann.*

Thlaspi

Thlaspi perfoliatum minus T. kleiner Bauren Senf, mit durchwachs Blättern *Ic.* 19. *Tab. hist.* 854. est Thlaspi III. pumilum, Clus. hist. CXXXI. *ann.*

Thymelæa alpina linifolio humilior, flore monopetalo purpureo *infundibuliformi* odoratissimo T. *fructu ovato*, sehr wohl riechender Kellerhals, auf dem Hochgebürg Hochfelden. *Ic. Matthiol. sub nomine Cneorum, pag.* 42. *perenn.*

Thymelæa laurifolio deciduo, sive Laureola fæmina, *fructu ovato* T. sive Mezereum Germanicum *IB.* 1. 566. Seidelbast, Kellerhalß, auf der Gansau, und in dessen Wald, wie auch im Wald zu Illkirch *Mezereon. perenn.*

Thymelæa laurifolio semper virens, seu Laureola major T. sive Laureola semper virens flore luteolo *IB.* 1. 564. *Laureole & Tab. hist.* 1488. Seidelbast oder Kellerhalß, mit immer zu grünenden Blättern, in dem Ganßauer Wald. sed rarissime.

Tithymalus cyparissias T. sive Tithymalus cupressinus sive humipinus *Lob. Ic.* 356. est Esula officinarum, *flosculis luteis monopetalis campaniformib. globosis divisis, radice longa fibrosa, fructu multicapsulari* Wolfs oder Teuffels-Milch, *Ic. Tab. hist.* 990. quæ Esula Rivini, *Titimale*, auf ungebauten Oertern, auf der Metzgerau und in der Ruprechsau *perenn.*

Tithymalus cyparissias capitulo rubente T. *Ic.* 12. *Tab. hist.* 990. Wolfs-Milch, mit rothen Käplein, auf dem Gebürg bey Ottrot. *perenn.*

Tithymalus cyparissias foliis punctis croceis notatus *CBp.* seu *Esula degener Rivin* Wolfs-Milch mit punctirten Blättern, zwischen denen andern Gattungen. *perenn.*

Turritis vulgaris ramosa T. *florib. cruciformibus, fructu filiquoso bicapsulari* sive Bursa pastoria seu Pilosella siliquosa *IB.* 2. 870. Wilder Stein oder Bergkresse vid. Tab nostr. I. *perenn.*

Turritis hirsuta montana flore albo Rupp. Flor. Ienens. 62 quæ Erysimo similis hirsuta alba CB. Prodr. *ubi Icon pag.* 942. kleiner Berg-Kresse, auf steinichten Feldern / unten an dem Hochgebürg Hochfelden.

Turritis, foliis inferioribus cichoraceis, cœteris perfoliatæ T. *floribus ex albo pallescentibus cruciformibus, fructu siliquoso*, seu Sinapi album Lugd. 1168. Thurnsenf oder Köhl, in dem Ost-winckel, an denen Hecken häufig. *perenn.*

Valeriana palustris major T. *foliis latioribus laciniatis, floribus monopetalis, infundibuli formibus albicantibus divisis, radice crassa subflava, odoris gravis, fructu oblongo.* groser wilder Wasser-Baldrian oder Katzenwurtz *Valeriane sauvage Ic. in Rivin.* in feuchten Orten, auf der Gallenmatt, in allen Gräben ausserhalb der Statt. *perenn.*

Valeriana sylvestris major T. *sive magna aquatica IB.* 3. *par* 2. 210. groser wilder Baldrian, gemeine Katzen-Wurtzel, in der Ruprechtsau, und beym Mauerhof. *perenn.*

Valeriana palustris minor T. *seu* Minor pratensis

tensis vel aquatica *IB. 3. part. 2. 211.* kleiner Sumpf-Baldrian, in der Ruprechtsau, häufig an denen Wassergräben / wie auch in sumpfichten Wiesen, bey Ostwald. *Ic. Tab. hist. IV. p. 455.*

Valeriana hortensis, Phu folio Olu satri Dioscorid. T. sive *Valeriana major odorata radice, IB. 3. part. 2. 209. Grande valeriane* Baldrian, zwischen Molterhausen, in dem Bitscher Gewäld, in dem Stättl. Reichshofen. *perenn.*

Valeriana sylvestris major altera, folio lucido HRP. *radice fibrosa*, Baldrian mit glänzenden Blättern, auf dem Gartners Feld, hinter der Spithal-Mühl, gegen dem Ziegel-Ofen. *perenn.*

Valeriana sylvestris minor T. *radice tenui fibrosa repente Ic. 4. Tab. hist. 455. & in Rivin*, kleiner Sumpf oder Wiesen-Baldrian, an denen Wasser-Gräben, in der Ruprechtsau, zu Ostwald, auf feuchten Matten. *perenn.*

Valeriana aquatica minor, flore minore, *Ray hist. pag. 389.* kleiner Sumpf-Baldrian, mit kleinen Blümlein *Ic. in Rivin.* auf feuchten Wiesen beym Mauerhof. *perenn.*

Valerianella arvensis præcox humilis, semine compresso T. *flore simplici albo monopetalo infundibuliformi, folio integro, fructu monospermo, quæ* Locusta herba IB. 3. 323. & Rivin. *seu Lactuca agnina Tab. hist. Mache* Lämmer-Lattich. oder Acker Salat, Rebkresse, aller Orten, auf denen Aeckern unter der Frucht. *ann.*

Valerianella arvensis præcox humilis, foliis serratis T. sive Locusta altera, foliis serratis

IB. 324. Lämmer-Lattich mit gekerbten Blättern prioris est varietas.

Valerianella semine umbilicato nudo oblongo Moris. Umb. *Mache à graine nue Ic. Garidel Tab.* 98. auf Wiesen in der Ruprechts-au. *ann.*

Valerianella arvensis serotina altior, semine turgidiori T. späther Lämmer-Lattich *Moris Umb.* auf brachliegenden Feldern, in der Ruprechtsau.

Viola arvensis bicolor T. *flore candido & luteo, simplici polypetalo anomalo, papilionacei floris æmulo, fructu trigono Ic.* 3. *Tab. hist.* 690. & *in Rivin* Acker Freysam-Kraut, mit weiß und gelben Blumen, in denen Frucht-Feldern, die brach liegen, aller Orten. *ann.*

Viola arvensis flore cœruleo & luteo T. Acker Freysam-Kraut, mit blau und gelben Blumen. *ibid. ann.*

Viola arvensis flore coeruleo & candido T. Acker Freysam-Kraut, mit blau und weisen Blumen. *ibid. ann.*

MENSIS

MAJUS ET JUNIUS.

Abies taxifolio, fructu sursum spectante T. *sive Abies fœmina IB.* 1. 235. *foliis pectinatim dispositis, utrinque virentibus, floribus amentaceis, quæ Mas. fructu squamoso, Ic. Clus. hist.* 34. Thannen-Baum, weiß Thannen-Mastbaum Holtz, *Sapin*, in hohen Waldungen, auf dem St. Ottilien Gebürg.

Abies

Abies tenuiore folio, fructu deorsum spectante, inflexo oblongo, est Picea major rubra, seu Abies mas Theophrast. *IB.* 1. 238. roth Thanne, FichtThannenbaum, *La Pece Ic. Tab. hist.* 1347. *Garidel Tab.* 1. *pag.* 54. im Brumbter und Oberehenheimer Wald. *perenn.*

Acer major, folio rotundiore minus laciniato, an Opulus Italorum *Ray hist.* 1701. *flore rosaceo, fructu foliaceo*, Ahorn-Baum, auf dem Gebürg St. Ottilien und gegen Hochfeld. *perenn.*

Acer platanoides Munting. hist. pag. 57. *foliis atrovirentibus acutis, seu aceris majoris varietas IB.* 1. 168. *Grand Erable, à feuilles de Plane, flosculis amentaceis, semine triangulari, ibid.* ingleichen auf dem Halgenstein, etliche Stund von Blinschweyler *perenn.*

Acetosa arvensis lanceolata T. sive Oxalis parva auriculata repens, *IB.* 2. 992. *foliis pinguiusculis hamatis lævibus, flosculis apetalis rubentibus*, quæ Lanceolatá minor est *Munting. hist.* 273. seu Oxalis ovina *Tab. hist.* 827. wilder kleiner Sauerampfer, mit lantzen förmigen Blättern, Schafampfer, auf dürren sandigen Erdreich, häufig am Canal, bey der Eckbolsheimer Brucken. *perenn.*

Acetosa lanceolata angustifolia repens T. quæ minima Munting. pag. 278. & *Tab. hist.* 827. *fig.* 6. kleiner Ampfer, mit schmahlen lantzen förmigen Blättlein, auf dürren trockenen Orten zu Lingelsheim, und auf der Gansau. *perenn.*

Acetosa aruensis minima, non lanceolata

quæ *Oxalis minima II. Tab. hiſt. pag.* gar kleiner Feldampfer.

Acetoſa pratenſis T. *IB.* 2. 989. ſeu Oxalis vulgaris, *folio longo, fructu capſulari triquetro, radice fibroſa ſubrubra*, gemeiner Wiesenampfer, mit langen Blättern, *Ic.* 1. *Tab. hiſt, pag.* 826. auf allen Wiesen. *perenn.*

Eadem foliis criſpis.

Acorus verus, ſeu Calamus aromaticus vulgaris, ſive Acorum *IB.* 2. 734. *floſculis luteis cruciformibus, radice geniculata acri, atque amaricante, foris ex flavo ruſeſcente, intus alba fungoſa, foliis gramineis rigidis Tab. hiſt.* 1031. Callmuß oder Ackerwurtz, bey dem Wickhäusel, copioſe auf dem Wacken, zu Illkirch in denen Höfen, in Mistpfützen, auf der Hohenwart hinten im Garten *perenn.*

Alchimilla linariæ folio, calice florum albo T. ſeu Linariæ ſimilis *IB.* 3. 461. *floſculis ſubluteis apetalis, ſtamineis fructu pentagono, radice candicante vel Anonymos linifolio Clus hiſt.* 324. & *Tab. hiſt. pag.* 1209. *eſt Linoſyris Rivin.* falſch Leinkraut, auf dürren graßichten Orten, zu Oßwald auf der Heyde. *perenn.*

Alchimilla montana minima Col. 1. 146. ſive Perchepier Anglorum quibusdam *IB.* 3. *part.* 2. 74 *foliis inferne albicantibus, floſculis stamineis herbidis*, eſt Scandix minor *Tab. hiſt. Ic.* 2. 288. klein Berg oder Acker Sinau, aller Orten, auf denen Frucht-Feldern, zu Oßwald. *ann.*

Alchimilla erecta gramineo folio, flore minore

nore T. *viridi*, sive Polygonum minus alterum *Tab. hist.* 1217. kleiner Wegtritt, mit Graßblättern, auf denen Aeckern zu Oßwald, auf der Nachtweyde, auf denen Aeckern, vor dem Cronenburger Thor. *ann.*

Allium sativum alterum sive Allioprasum caulis summo circumvoluto Walth. est Scolodoprasum II. Clus. hist. 191. Schlangen-Knoblauch, Gallis *Rcambole*, in Gärten und auf denen Gärtners Feldern. *perenn.*

Allium sativum T. vulgare IB. 2. 566. Knoblauch, gemeiner Knoblauch, in Gärten und Gärtners Feldern. *perenn.*

Allium sylvestre latifolium T. *fructu subrotundo tricapsulari, foliis binis latis splendentibus, flore albo liliaceo umbellato, radice alba fibrosa*, sive *Allium Ursinum bifolium vernum, sylvaticum IB.* 2. 565. Ic. Tab. hist. pag. 875. wilder oder Hecken Knoblauch, *Ail sauage.* in der Ruprechtsau, zwischen denen Hecken, im Illkircher Wald. *perenn.*

Alsinastrum serpillifolium, flore albo tripetalo, *serpens*, Vaillant *Ic.* 2. *Tab.* 2. in sumpfichten Orten auf der Insul am Canal. *ann.*

Alsine saxatilis *foliis longissimis ac tenuissimis, flore candido majori cruciformi*, *nob.* zwischen denen Steinen zu Aaßweiller auf dem Gebürg vid. Tab. nostr. II.

Alsine tenuifolia T. & IB. 3. 364. *pediculis florum longissimis* Vaill. sive Chamælinum *Clus hist.* 319. *floribus albis rosaceis, foliis tenuissimis, per genicula binis Ic. Vaill.* Tab. *III. fig.* 1. auf der alten Statt-

 mauer

mauer, zwischen dem Steinstrasser und Cronenburger-Thor. *ann.*

Alsine spergulæ facie minima, seminibus marginatis T. auf dürren Aeckern in der Ruprechtsau. *ann.*

Alyssum segetum foliis auriculatis T. *capsulis minoribus sive* Myagrum sativum, *floribus cruciformibus pallide virentibus, & foliis minus cinereis* est Chamælinum *Tab. hist.* 1. 1252. Wilder Leindotter auf denen Aeckern *ann.*

Alyssum incanum luteum serpillifolio majus T. sive *Thlaspi incanum campestre majus, folio polygoni, flosculis luteis cruciformibus, siciliculis tenui radice alba Ic. Tab. hist.* 4. *pag.* 850. groß Schildbesen Kraut, mit runden Blättern, auf dem Weg, an denen Rändern gegen Blobsheim. *ann.*

Alyssum perenne incanum montanum T. seu Thlaspi montanum luteum *IB.* 2. 928. *est* Thlaspi supinum luteum Lob. Ic. 220. unter den zerfallenen Felsen Stücken, gegen Niedeck in dem Hochgebürg *perenn.*

Alyssum incanum luteum minus serpillifolio T. seu minimum, *Clus hist.* CXXXIII. quod *Thlaspi chypeatum minus Tabern. hist. Ic.* 18. 853. klein Schild besen Kraut, zwischen dem Wickhäusel, und der Hohenwart, an dem Weg. *ann.*

Anagallis phœniceo flore *fructu globoso* sive *Anagallis phœnicea Mas, IB.* 3. 369. rother Gauchheil, Heil aller Welt *Ic. Tab. hist.* 1. 1092. *á nostratibus dicitur* Wutkraut, *quia morsibus venenatorum anima-*

um

um adversa, Mouron male, à fleur rouge, auf brach-liegenden Aeckern und in Gärten. *ann.*

Anagallis flore cœruleo T. sive Anagallis cœrulea fæmina *IB.* 3. 369. *simplici monopetalo multifido, foliis ex adverso binis vel ternis, nascentibus, Ic.* 2. *Tab. hist.* 1092. blauer Gauchheil, *Mourón femelle ibid.*

Anagallis paludosa minima, foliis rotundis alternatis *flosculis albis monopetalis cruciformibus* Vaill. *Tab. IV, fig.* 2. neben denen Wasser-Gruben zu Wörtheim und Lauterburg *perenn.*

Anemone sylvestris alba major T. *flore albo simplici, radice fibrosa, fructu oblongo lanuginoso* weise Wald Anemonien Ic. 1. Tab. hist. 73. & H. Eyst. fol. 13. fig. 3. Clus hist. 244. zu Oßwald häufig. *perenn.*

Anethum hortense T. *foliis fœniculaceis, floribus luteis rosaceis umbellatis suaveolentibus, radice alba fibrosa, semine plano ovato.* Dilleu, Till, *Ic. Tab. hist.* 165. *Anet.* in Gärten und Gärtners Feldern. *ann.*

Antirrhinum arvense majus T. *foliis angustioribus, flosculis monopetalis anomalis tubulatis, obsolete purpureis, radice fibrosa* sive Antirrhinum angustifolium sylvestre IB. 4464. Dorant, wild Löwenmaul, mit rothen Blumen *Mufle de veau Ic.* 4. *Tab. hist.* 1236. & *Garidel Tab.* 7. & *Rivin. ann.*

Antirrhinum arvense majus flore albo HRP. *fructu biloculari.* Dorant, mit weisen Blumen, unter der Frucht in der Ruprechtsau, sed rarissime

Aparine vulgaris T. *flosculis albis campaniformib.*

fructu

fructu testiculato, groß Klebkraut *Grateron Ic. Vaill. Tab.* 4. *fig.* 4. fast an allen Hecken und Zäunen *ann.*

Aparine semine lævi HPar. *foliis brevissimis, flore albo campaniformi quadrifido, caule quadrato* Ic. Vaill. Tab. IV. fig. 3. in denen Frucht-Aeckern, besonders zu Ehrstein *ann.*

Aparine latifolia humilior montana T. sive Matrisylva officinar. *flosc. albis campaniformibus odoratis, foliis stellatis* est Hepatica stellata *IB.* 3. 718. Waldmeister, Sternleber-Kraut, *Ic. Tab. hist.* 9. 201. in dem Holtzheimer Wald, *Muguet. perenn.*

Aparine supina pumila flore cœruleo T. *infundibuli formi, semine aculeato*, sive Rubia parvo flore cœruleo se spargens *IB.* 3. 719. klein blaues Stern-Kraut, hin und wieder auf denen Aeckern.

Aquifolium T. & *IB.* 1. 114. sive Ilex aculeata baccifera, *folio sinuato spinoso, flore monopetalo albo rotato, fructu ossiculo fœto* Stechpalmen *Houx. Ic. Tab. hist.* 1. 352. auf den Ottilen Berg, in dem Wald zu Niederhenheim, in dem Hagenauer Forst. *perenn.*

Aquifolium non spinosum *Munting Phytogr. fig.* 39. *foliis laurinis* Palmen ohne Dornen, in hohen Andlau, nahe an dem Schloß *perenn.*

Aquilegia sylvestris T. *flore simplici IB.* 35. 484. *cœruleo polypetalo pendulo, foliis lobatis, semine ovato* wilde blaue Agley, *Ancolie sauvage. Ic.* 1. *Tab. hist.* 97 in dem Ganßauer Wald und in dem Illkircher Wört. *perenn.* Aquile-

Aquilegia hortenſis, flore ſimplici, quam pleno, varii coloris. auf dem Haulen Berg, per me aſſurgentes.

Arum vulgare non maculatum T. *flore monopetalo cucullato, fructu cinnabarino acri, radice alba fibroſa acri, fructu globoſo.* gemeiner Aaron oder Zehrwurtzel, ohne Flecken. *Ic. Tab. hiſt.* 1. 123. & *in Rivin. Pied de Veau, ſans marque,* in denen Hecken gegen Illkirch. Oßwald und in der Ruprechtsau.

Arum maculatum folio ſubrotundo, maculis nigris HRP. Zehrwurtz oder Aron Wurtzel, mit ſchwartzen Flecken, an denen Hecken und Zäunen, gegen dem Mauerhof, und in dem Ostwinckel. *perenn.*

Arum maculatum maculis nigris T. gefleckte Zehrwurtz, mit ſchwartzen tupfichten und zugeſpitzten Blättern *ibid. Pied de Veau marque perenn.*

Arum paluſtre radice arundinacea, foliis cordiformibus, ſive *Dracunculus aquatilis IB.* 2. 789. *eſt Dracontium paluſtre Tab. hiſt.* rectius Ariſarum Lobel, Waſſer Aron, bey Still, neben einem groſſen Weyer, auf einer ſumpfichten Wieſe *perenn.*

Aſclepias flore albo T. ſive Hirundinaria ſeu Vincetoxicum officinar. *floſculis albis monopetalis campaniformibus, radice alba fibroſa, Dompte Venin Ic. Tab. hiſt.* 1. 105. in allen Höltzern um der Statt, auf der Hart, gegen Molßheim. *perenn.*

Bellis ſylveſtris media caule carens ſive Bellis media, *Clus hiſt. XLIV.* eſt Bellis ſylvatica *IB.* 3. 114. *Pacquerette de montaigne* wilde Wald Maßlieben,

lieben, mit kleinen Blättern, in dem Gebürg und Wiesen hinter Baar. *perenn.*

Berberis dumetorum T. sive Berberis vulgo quæ & Oxyacantha putata *IB. 1. 52. flore simplici rosaceo luteo, fructu molli cylindraceo,* saur Dorn oder Saurach, aller Orten in der Ruprechtsau, in denen Zäunen, in dem Eckbolsheimer und andern Waldungen *Epine Vinette Ic. Tab. hist. pag.* 1448. *perenn.*

Betula T. & *IB. 1. 148. flore amentaceo subluteo, folio subrotundo læte virenti, per ambitum serrato, fructu cylindraceo squamoso* Bircken-Baum *Ic. Tab. hist. 1. 398. Bouleau* in allen Wäldern, copiose auf dem Jesuiter-Hof. *perenn.*

Boletus esculentus rugosus albicans, quasi fuligine infestus T. seu Ic. 1. fungor. spec. *Clus hist. CCLXIII. Morille,* Morcheln, hin und wieder in feuchten Waldungen. *ann.*

Boletus esculentus rugosus fulvus T. 2da spec. 1. gener. escul. fungor. Clus hist. CLXIII. roth gelbe Maulbeer-Morcheln *ibid. ann.*

Brassica alba crispa T. *fructu siliquoso, folio rugoso patulo, flore simplici luteo cruciformi,* sive Brassica Sabauda, *IB.* 2. 828. krauser oder Welscher-Kohl, *Chou frisée Ic. 6. Tab. hist. pag.* 784. auf denen Gartners Feldern *ann. ibid.*

Brassica arvensis T. sive Brassica rubra minor *IB.* 2. 833. aut Brassica *Sylvestris Crambe dicta,* Schnitt-Kohl *Ic.* 15. *Tab. hist.* 787. *ibid. ann.*

Brassica capitata alba T. weiß Kraut / gemein Kraut, Kraut zum einmachen, so man nachge-

hends

hends Sauerkraut nennet *Chou Ic.* 4. *Tab. hist.* 784. *ibid. ann.*

Brassica capitata rubra T. & *IB.* 2. 831. *foliis arcte convolutis & occlusis rubris*, roth Köpfel- oder Salat-Kraut, Chou rouge *Ic.* 5. *Tab. hist.* 784. *ibid. ann.*

Brassica cauliflora T. seu *multiflora* IB. 2. 832. Blumen Kohl, *Chou Fleur. ibid.* Ic. *Tab. hist.* 9. *ibid. ann.*

Brassica fimbriata T. sive *crispa laciniosa* IB. 2. 832. *vel tophosa* Ic. 12. *Tab. hist.* 786. Wirsching oder Winter-Kohl, *Chou frisé, á feuilles fendues, perenn.*

Brassica gongylodes T. caule rapum gérens rotundum, vel Brassica caulorapa IB. 2. 829. Kohl-Ruben oder runder Ruben-Kohl *Chou rave* Ic. 1. *Tab.* 789. *ann.*

Brassica gongylodes rapo longiore Langer Ruben-Kohl. Ic. 2. *Tab. hist.* 789. *ann.*

Brassica rubra, folio crispo laciniato IB. 2. 832. krauser Kohl *Chou rouge frisée perenn. ann.*

Brassica alba seu viridis T. vel *vulgaris* IB. 2. 829. gemeiner oder Kuchen-Kohl, Ic. 1. *Tab. hist.* 783. *Chou blond ou verd. ann.*

Brassica alpina perennis T. perfoliata, Berg-Kohl, auf dem Gebürg und Waldung gegen Niedeck, ingleichen oberhalb Haßlach.

Bryonia aspera, sive alba, baccis rubris T. *globosis* sive Vitis alba IB. 2. 143. *foliis asperis floribus monopetalis campaniformibus albis, radice alba rapacea amara.* Zaun oder Scheiß-Ruben, mit rothen Beeren, aller Orten in denen Zäunen und Hecken

Bryone

Bryone ou Couleuvre Ic. *Tab. hist.* 1292. *perenn.*

Bugula T. sive *Consolida pratensis media*, IB. 3. 430. *flore monopetalo cœruleo unilabiato, semine subrotundo*, gulden Gunsel *Bugle* Ic. 1. *Tab. hist.* 945. & *in Rivin. perenn.* auf denen Wiesen.

Bugula sive Consolida media pratensis, flore purpureo T. gulden Gunsel, mit rothen Blumen, am Schnacken-Loch, an denen Zäunen. *perenn.*

Bugula sylvestris villosa, flore speciosiore cœruleo T. seu Consolida media Genevensis foliis hirsutis IB. 3. 432. gulden Gunsel, mit harichten Blättern, auf der Gansau, gegen Oßwald, in der Gegend des kleinen Brückleins. *Bugle de Geneve, perenn.*

Eadem flore suave rubente sed rarius.

Caprifolium germanicum T. sive *Periclymenum germanicum non perfoliatum* IB. 2. 104. *flore monopetalo tubuloso diviso, fructu molli*, sive Periclymenum non perfoliat. IB. 2. 104. Speck oder Zaun-Lilien, in denen Hägen in der Ruprechtsau, in dem Gansauer nnd Jllkircher Wald, Ic. 1. *Tab. hist. pag.* 1. 299. & *Rivin.*

Campanula radice esculenta, flore cœruleo T. *monopetalo* sive *Rapunculus* vulgaris campanulatus IB. 2. 793. *foliis inferioribus bellidi similibus, humi accumbentibus, superioribus angustis & glabris, radice longiuscula alba subdulci* Rapuntzel, Fürwitzlein, Ic. 1. *Tab.* 1. *hist.* 293. *perenn.*

Campanula arvensis procumbens. T. sive *Avicularia Salvii quibusdam* IB. 2. 800. *Doucette.*

Frau-

Frauen-Spiegel, in denen Frucht-Aeckern nahe bey Jllkirch. *ann.*

Caprifolium non perfoliatum, foliis ſinuoſis T. *flore monopetalo tubuloſo diviſo*, Speck-Lilien, mit eingeſchnittenen Blättern, und kleinen Durchwachs-Blättern, in dem Ganßauer Wald, in der Ruprechtsau, in denen Zäunen, gegen Jllkirch. *perenn.*

Caprifolium non, perfoliatum foliis ſinuoſis variegatis T. Speck-Lilien, mit durchwachſenden, geſprengten Blättern, in dem Eckbolsheimer und Ganſauer Wald, wie auch *in Horto medico.*

Caprifolium non perfoliatum, flore interius albo, rubro externe, Bœrhav. in dem Eckbolsheimer Wald, gegen den Ziegelofen, auf dem St. Ottilien-Berg. *perenn.*

Cardamine pratenſis, magno flore purpuraſcente T. cruciformi, ſive Naſturtium pratenſe ſylveſtre IB. 2. 889. Wieſen-Kreſſe, Gauch-Blum, mit groſſen Leibfarben Blumen, Creſſon des prez, *Ic.* I. *Tab. hiſt.* 844. auf allen feuchten Wieſen, *perenn.*

Cardamine pratenſis magno flore albo, weiſe Gauchblumen, ibid. beym Canal. *perenn.*

Cardamine pratenſis magno flore albo pleno T. & *IB.* 2. 889. gefülter weiſer Wieſen-Kreſſe, auf dem Schluten-Feld, vor dem Fiſcher-Thor, auf dem Glacis. *perenn.*

Cardamine flore majore elatior T. ſive *Naſtartium aquaticum erectum majus & amarum, folio longiore flore, ſimplici cruciformi albo, fructu ſiliquoſo*

est *Nasturtium aquaticum flore majore elatius* IB. 2. 885. Ic. Matthiol. epitom. 270. *Cresson d'eau amere*, Bitter Brunnen-Kreß, in Wasser-Gräblein, in der Ruprechtsau, in dem XV. Wört, wie auch zu Oßwald. *perenn.*

Cardamine annua exiguo flore T. *foliis pinnatis siliquis gracilibus*, sive Sisymbrii Cardamine species quædam insipida IB. 2. 886. in dem Ober-Haßlacher Wald. *ann.*

Castanea sativa T. *fructu majore dulci, echinato floribus foemineis amentaceis, in julum congestis, foliis læte virentibus ac splendentibus, acuminatis rigidis*, zahmer Castanien-Baum, *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 1385. *Chataigner. perenn.*

Castanea sylvestris T. *flore amentaceo fructu echinato, fructu dulci minore. folio multifido, Chataigner sauvage* wilder Castanien-Baum, zu Ottrott, am Gebürg, wie auch zu Oberbronn. *perenn.*

Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro T. sive *Periclymenum rectum fructu rubro IB.* 2. 106. *flore simplici monopetalo labiato*, Zäunling, Hunds-Kirschen-Staude, *Cerisier bas, est Xylosteum Rivin. Ic.* 4. *Tab. hist.* 1. 299. in denen Hägen in der Ruprechtsau, in Hecken, in dem Illkircher und Oßwalder Wald, *perenn.*

Chamæcerasus alpina, fructu gemino rubro, duobus punctis notato T. seu *Chamæcerasus Alpina Lob. Ic.* 173. *foliis integerrimis*, Berg oder Hunds-Kirschen, in dem Gebürg, hinter hohen Andlau, *perenn.*

Chamæmelum vulgare leucanthemum T. sive

five Chamæmelum vulgare amarum IB. 3. 116. *flosculis radiatis, foliis tenuiter dissectis amaricantibus*, Chamillen, Apothecker Chamillen, hin und wieder auf denen Frucht-Aeckern, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 58. *Camomille. ann.*

Chærophyllum sativum T. *flosculis albis rosaceis umbellatis*, Garten oder Kuchen-Körfel, nostratibus, Körbel-Kraut Ic. Tab. hist. pag. 283. *Cerfeuil. ann.*

Chærophyllum sylvestre perenne, cicutæ folio T. sive *Myrrhis seminibus lævibus, flosculis albis rosaceis, Cicutaire Ic.* 2. *Tab. hist.* 284. & *in Rivin.* aller Orten, in denen Zäunen, in der Ruprechtsau. *ann.*

Chelidonium majus vulgare T. sive Chelidonia IB. 3. 482. *flosculis luteis cruciformibus. radice croceo succo amaro madente, fructu unicapsulari*, groß Schöll-Kraut, an denen Zäunen und Mauren, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 101. *Grand chelidoine. perenn.*

Chelidonium majus laciniato flore, & foliis quernis T. sive Chelidonium majus laciniato flore, Clus. hist. CCIII. per me satum uberrime crescit, beym Schnackenloch. *perenn.*

Chenopodium folio triangulo T. *foliis spinachiæ similibus, floribus stamineis luteis, fructu stellato*, vulgo Bonus Henricus IB. 2. 965. wilder Feld-Spinat. *Bon Henry, ou Epinat Sauvage.* Ic. Tab. hist. 810. aller Orten, an denen Wegen. *perenn.*

Chenopodium latifolium minus ramosum, florum petiolis longissimis, ex foliorum alis

confertim nascentibus, foliis sinuatis, Buxb. Enumerat. Plantar. Hallens. cum figura pag. 69. in dürren Gräblein, in Schiltigheim.

Christophoriana vulgaris nostras racemosa & ramosa T. *flore simplici rosaceo folio elegantissime dissecto, fructu molli ovato nigro, radice nigra fibrosa*, St. Christoffels-Kraut, Herbe de St. Christoffle, *Ic. Tab. hist.* 1163. auf dem Haulen Berg, im Wald, bey Ottmarsheim, auf der Haart. *perenn.*

Cirsium singularibus capitulis parvis, T. *fructu papposo foliis non laciniatis, floribus flosculosis purpurascentibus*, sive III. montanum Clus. hist. CXLIX. vel Macrocaulon *IB.* 3. 45. auf dem Aaßweiler Gebürg. *perenn.*

Cochlearia folio cubitali T. *fructu globoso* sive *Raphanus rusticanus, flore albo simplici, radice crassa alba acri Ic. Tab. hist.* 799. Meerrettich, auf denen Gärtners Feldern, auf der Contrescarpe des Juden-Thors lincker Hand, vor dem Fischer-Thor, neben dem Schlutten-Feld. *perenn.*

Cornus fæmina T. sive Cornus sylvestris, putata virga sanguinea, IB. 1. 314. *floribus cruciformibus subalbicantibus, fructu nigro amaro & acerbo, foliis nervosis corno proximis*, Blutgerten, Cornel-Strauch *Ic. Tab. hist.* 1459. *Cornier sauvage perenn.*

Cratægus folio laciniato T. *fructu pyriformi* sive Mespilus apii folio sylvestris non spinosa, *flore rosaceo albo*, sive Sorbus torminalis *IB.* 1. 63. & *Lob. Ic.* 200. *Tom.* 2. *Tab. hist.* 3. *pag.* 1427.

wilde

wilder Eschrößl. Baum, Vogelbeeren Baum, *Alizier, perenn.* in dem Jngweiler Wald, zu Brumbt in des Jägers Garten, und *in horte medico. perenn.*

Cratægus folio subrotundo serrato, subtus incano T. sive Sorbus alpina *IB.* 1.65. quæ Aria Lugdun. 202. wilder Sperber-Baum, auf dem Gebürg und Waldungen, zu Baar, und Oberbronn, allhier auf dem St. Johannis Wall, in der Stadt unter den Linden-Bäumen. *perenn.*

Cruciata hirsuta T. *flore luteo cruciformi, foliis quaternis hirsutis,* gulden Waldmeister, Croisette *jaune Ic. IB.* 3. 717. hin und wieder in denen heckichten Wegen, *ann.*

Cucumis vulgaris sativus *fructu carnoso tereti* T. *floribus monopetalis luteis campaniformibus multifidis, foliis angulosis, fructu luteo,* Cucumern, mit gelber Frucht, Ic. 1. Tab. hist. 864. Concombre, in Gärten, und Gärtners-Feldern. *ann.*

Cucumis sativus vulgaris, maturo fructu albo T. Cucumern, mit weisser Frucht, *ibid.*

Cucumis flexuosus T. *fructu longissimo,* krumme Cucumern *Ic. Tab. hist.* 865. *ann.*

Cyanus segetum flore cœruleo T. *semine papposo* sive Cyanus IB. 3. 21. *simplici composito flosculoso, foliis integris, Bliiet,* blaue Korn-Blumen, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 428. in denen Korn-Feldern, *ann.*

Cyanus segetum, flore albo T. weise Korn-Blumen, auf Aeckern, bey Niederhaußbergen. *ann.*

Cyanus segetum disco cœruleo T. *corona candida.* weise Korn-Blumen, zu Oßwald, unter der Frucht, *ann.*

Cydonia fructu breviore & rotundiore *carnoso* T. *floribus albis rosaceis*, Apfel Quitten-Baum, hin und wieder in Gärten der Stadt, als auf dem Land, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1412. *Coigner malo*, *perenn.*

Cydonia fructu oblongo & leviore T. Birn Quitten-Baum, *Coiguer femelle Ic.* 2. *Tab. hist.* 1413. *perenn.*

Cynoglossum majus vulgare T. *floribus monopetal. infundibuliformibus, multifidis purpureis, foliis oblongis, radice longa succulenta, fructu capsulari, aspero*, Hunds-Zung, *Langue de Chien*, an denen Landstrassen häuffig, in der Ruprechtsau, neben den Zäunen, *Ic. Tab. hist.* 1113. & *IB.* 3. 598. *perenn.*

Cyperoides sylvarum tenuius spicatum, foliis mucronatis glabris, carinatis, pallide viridibus, culmo triquetro geniculato, spica crassa, ferruginea, *Parckins. Theatr.* 1171. an dem Canal, *perenn.*

Cyperoides spicis parvis, longe distantibus T. auf feuchten Wiesen, in der Ruprechtsau, und der grünen Wart. *perenn.*

Cyperoides foliis caryophyllæis, spicis oblongis e pediculis longioribus propendentibus T. auf feuchten Wiesen bey Illkirch, Cypern-Graß, mit Nägelein-Blättern und ablangen, an langen Stielen hangender Blüth. *perenn.*

Cyperoides polystachion, spicis teretibus erectis T. sive Gramen palustre majus *Lobel. Ic.* 11. *foliis angustis*, auf feuchten Wiesen, am Canal. *perenn.*

Cype-

Cyperoides latifolium, ſpica rufa, caule triangulo T. *paniculis nigris, floribus apetalis ſtamineis, foliis ſparganio ſimilibus*, groß breit blättricht Cypern-Graß, *Ic. 1. Tab. hiſt. pag.* 533. eſt Gramen Cyperoides Lob. Ic. 11. hin und wieder an denen Ufferen der Ill, *perenn.*

Cyperoides latifolium ſpica ſpadiceo viridi majus T. & *IB.* 2. 495. breit blättricht Cypern-Graß, mit braunroth grüner Aehre, in ſumpfichten Pfützen, in der Ruprechtsau, und andern Orten am Rheingieſen. *perenn.*

Cyperoides ſpica pendula breviore T. *nigra*, ſeu *Pſeudo cyperus Lob. Ic.* 76. & *IB.* 2. 496. Cypern-Graß, mit kleiner ſchwartz abhangender Blüthe, an dem Rheingieſen, am Ufer, bey der Pulvermühl. *perenn.*

Cyperoides ſpica pendula longiore & anguſtiore T. ſive Gramen Cyperoides ſpica pendula longiore & anguſtiore *CB. prod.* 6. 13. & *IB.* 2. 497. in denen meiſten Gräben, auſſer der Stadt, in dem 2ten Graben, vor dem Fiſcher-Thor. *perenn.*

Cyperoides paluſtre majus ſpica diviſa vel *gramen Cyperinum paluſtre minus Tab. hiſt. Ic.* 4. *pag.* 533. klein Waſſer Cyper-Graß, auf feuchten Wieſen, beym Schnackenloch. *perenn.*

Cyperoides polyſtachion lanuginoſum T. viel ährichtes Cypern-Graß, mit wollichten Blättern, auf feuchten Matten, zwiſchen Oßwald, und Gravenſtaden, an denen Endungen feuchter Aecker, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Cyperoides polyſtachion flavicans, ſpicis brevibus, prope ſummitatem caulis T. gelbichtes viel ährichtes Cypern-Graß, mit kleinen zu oberſt am Stengel ſitzenden Blättern, auf den feuchten Wieſen beym Mauer-Hof. *perenn.*

Cyperoides minus, ſpicis denſioribus T. ſive Gramen Caryophyllæum *Tab. hiſt.* 521. quod Gramen eſt ſpicatum foliis Vetonicæ caryophyllatæ *Lob. Ic.* 10. frühes Cypern-Graß, mit Nägel-Blättern, auf dürren graſichten Orten, bey allen Lüften. *perenn.*

Cyperoides paluſtre aculeatum capitulo breviore T. ſive *Gramen paluſtre echinatum Lob.* 15. & *IB.* 2. 497. Waſſer-Graß, mit ſtechenden Aehren, Igel-Graß, vor dem Metzger-Thor, in feuchten Orten, vor dem Glacis, wie auch in der Ruprechtsau. *perenn.*

Dens Leonis folio anguſtiore T. *foliis radiatis per terram ſparſis, ſemine papposo*, ſchmahlblättrichter Löwen Zahn, auf dürren und ſandigen Erdreich. *perenn.*

Dens Leonis minimis foliis hirſutis & aſperis T. ſive Hieracium parvum hirſutum, caule aphyllo criſpum ubi ſiccatum *IB.* 1038. auf brachliegenden Aeckern, gegen Illkirch. *perenn.*

Dens Leonis minor foliis radiatis T. *radice parva nigra* auf der Metzgerau, in der Ruprechtsau, an magern graſichten Orten. *perenn.*

Dens Leonis qui piloſella officinar. T. ſive Piloſella major repens hirſuta, *flore compoſito floſculoſo luteo*, Mauß-Oehrlein, auf trockenen graßich-

grasichten Orten, Ic. 1. *Tab. hist. pag.* 506. *Piloselle ou Oreille de Rat. perenn.*

Dens Leonis qui Pilosella, folio minus villoso T. seu *Pilosella major, folio angustiore,* minus piloso repens *IB.* 2. 1090. auf dem Ried bey Bischofsheim, auf der Metzgerau. *perenn.*

Dentaria heptaphyllos baccifera T. *flore cruciformi ex candido leviter purpurascente, siliqua corniculata,* sive Coralloides altera vel septifolia, *IB.* 2. 899. Zahn-Kraut, oder Schuppwurtz mit sieben Blättern, *Ic.* 4. *Tab. hist.* 324. & Clus. hist. CCXXII. auf dem Barrer Gebürg, in dem Dambacher-Wald, per me auf dem Haulenberg. *perenn.*

Dentaria pentaphyllos, foliis mollioribus T. sive *Dentaria VII. Clus. hist. GCXXII.* est Quinquefolia IB. 2. 900. *Ic. Tab.* 1. 323. auf dem Ottilië Berg, in dem Barrer Wald, wo man Eisen gräbt. *perenn.*

Digitalis purpurea, folio aspero T. sive *Digitalis purpurea IB.* 2. 812. grosse rothe Fingerhütlein, *Digitale rouge* Ic. 2. Tab. hist. 960. auf dem St. Ottilien Berg häuffig / *perenn.*

Digitalis flore magno candido T. *monopetalo anomalo tubulato, folio aspero, fructu rotundo acuminato, Digitale blanche,* große weise Fingerhütlein, in denen Hecken, 3. Viertel Stund hinter Blinschweyler. *perenn.*

Digitalis lutea magno flore T. *folio latiore Digitale jaune Tab. Ic.* 1. *hist.* 960. gelbe Fingerhütlein IB. 2. 813. *est Digitalis lutea,* auf dem obersten Gebürg des Falckensteins, *cum praecedente, perenn.*

Doronicum radice ſcorpii brachiata T. ſive I. *Tab. hiſt.* 715. Gembſenwurtz auf dem Haulen Berg, per me ſatum, *perenn.*

Elichryſum montanum longiore folio & flore, purpureo T. *compoſito floſculoſo ſemine papposo*, Berg Ruhr-Kraut, mit langen rothen Blumen und Blättern, *Ic.* 8. *Tab. hiſt.* 781. bey allen Lüften, auf denen Wiesen, umb Eſchau. *perenn.*

Elichryſum montanum, longiore flore & folio, albo T. Bergruhr-Kraut, mit weiſen langen Blumen und Blättern, ibid. auf der magern Wieſe, der Eckbolsheimer-Schlut, *perenn.*

Elichryſum montanum flore rotundiore ſub purpureo T. Katzen-Pfötlein, mit ſchönen runden rothen Blumen, rothe Engelblumen, *Ic.* 7. *Tab. hiſt. pag.* 781. *Pied de chat, ou Immortelle rouge*, auf der Moltzheimer Hart. *perenn.*

Elichryſum montanum flore rotundiore candido T. ſive *Gnaphalium montanum album*, *Lob. cl* 482. Katzen-Pfötlein, mit runden weiſen Blümlein, *Ic. Tab. hiſt.* 6. 781. ibid. und in dem XV. Wört an Rhein. *perenn.*

Elichryſum montan. flore rotundiore ſuave rubente T. ſive *Gnaphalium montan, ſuave rubens Lob. Ic.* 483. & *Garidel Tab.* 30. bleich rothe Katzen-Pfötlein, ibid. *perenn.*

Equiſetum ſylvaticum tenuiſſimis ſetis T. ſive Hippuris tenuiſſima, non aſpera IB. Ic. 3. 730. & *Tab. hiſt. Ic.* 6. 569. Wald Katzen-Wadel, mit zarten glatten Blättern, in feuchten ſchattichten Wäldern, auf dem Hochfelder Gebürg, *perenn.*

Euoni-

Euonymus vulgaris, granis rubentibus T. seu Euonymus multis, aliis Tetragona IB. 1. 201. *floribus albicantibus rosaceis male olentibus Ic.* T*ab. hist.* 1462. *Bonnet de Iesuit.* Hahnen-Hödlein, oder Spindelbaum, Jesuiter-Käplein, in denen Hecken u. Wäldern, zu Illkirch, und Eckbolsheim. *perenn.*

Ferrum equinum germanicum, siliquis in summitate T. seu Comosum Rivin. & Garidel Tab. 33. gelbe Steinwicken, zu Oßwald und Geistspitzen häuffig. *perenn.*

Fragaria vulgaris T. *floribus albis rosac. fructu ovato acuminato, ferens fraga rubra IB.* 2. 394. Erdbeeren Kraut, *Ic. Tab. hist.* 346. *Fraisier*, aller Orten, an denen Reinen der Zäunen, *perenn.*

Fragaria foliis hispidis T. *ex utraque parte cinereis*, Stein oder Pflaster-Beeren, zu Bußweiler in denen Reben, zu Blinschweiler, *perenn.*

Frangula T. sive Alnus nigra baccifera, *IB.* 1. 260. *flore rosaceo, fructu molli globoso.* Faulbaum, Zapfen Holtz, zu Lingelsheim, in der Ruprechtsau, unter den Hecken, *Aune noir* Ic. Tab. hist. 1461. *perenn.*

Frangula montana pumila saxatilis, folio subrotundo duro, fructu globoso molli nigro. T. zu Niederhaußbergheim, hinten zu auf kleinen bergichten Hügeln. *perenn.*

Fumaria officinarum flore purpureo T. *polypetalo anomalo papilionaceo, fructu siliquoso unicapsulari*, Tauben-Kropf, *Ic. Tab. hist.* 85. *Fume terre*, auf denen Aeckern, und in Weinbergen, *ann.*

Fumaria officinarum & Dioscorid. flore albo

bo T. Tauben-Kropf, mit weissen Blumen, in denen Reben bey Heilgenstein. *ann.*

Galeopsis vel Urtica iners, flore luteo, *fructu capsulari* T. & *IB.* 3. 323. est Lamium folio oblongo flore luteo, Ic. Rivin. *Ortie jaune*, gelbe taube Waldnessel, bey Waßlenheim, in dem Grund-Thal, zu Baar, bey der Kirchen. *perenn.*

Geranium cicutæ folio minus, & supinum flore rubro, *fructu rostrato*, sive Arvense *Tab. hist. Ic.* 3. 123. klein Acker Storchen-Schnabel, mit Schirlings-Blättern, *Bec de Grue* fast überall auf denen Aeckern, und neben den Landstrassen, *perenn.* Idem flore albo. T. klein Acker Storchen-Schnabel, mit weiser Blüth, auf denen Ackeren, bey Bennfeld. *perenn.*

Geranium Robertianum T. *flore dilute rubello striato simplici*, Stinckender Storchen-Schnabel, St. Ruprechts-Kraut, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 122. & *Rivin. Herbe Robert.* an alten verfallenen Mauren, und andern schattichten Orten *perenn.*

Geranium Robertianum viride T. est Geranium Murale *IB.* 3. 480. vel Fœtens Rivin. Stinckender Storchen-Schnabel, mit grünen Stenglen, auf alten Mauren und Dächern, in der Ruprechtsau, *perenn.*

Geranium Robertianum flore albo T. Stinckender Storchen-Schnabel, mit weisen Blumen, auf fetten Aeckern zu Illkirch, an der Landstraß gegen Fegersheim.

Geranium pimpinellæ fol. Dillen. seu Robertianum Rivin. Storchen-Schnabel mit Bibernell

bernell Blättern, auf der Hart gegen Molßheim, an der Landstrassen gegen Fegersheim. *perenn.*

Geranium Cicutæ folio moschatum T. Storchen-Schnabel, mit wohlriechenden Schirlings-Blättern, *Ic. IB.* 2. 479. auf denen Ackern, in dem Ostwinckel. *ann.*

Gladiolus minor, floribus uno versu dispositis T. *purpureis monopetalis liliaceis, radice bulbosa, fructu oblongo*, braun Schwertel, *Ic. Tab. hist.* 1024. *perenn.* auf dem Hochgebürg beym Scheerweiler Schloß. *perenn.*

Globularia vulgaris T., *fructu capsulari*, sive Globularia, bellidi similis *IB.* 3. 13. sive Bellis coerulea, caule folioso, radice fibrosa, Ic. 6. Tab. hist. 708. blaue Maßlieben, auf dem Polygon oder Schießberg, auf der Metzgerau / und zu Oßwald, *perenn.*

Gramen palustre cyperoides triquetrum, spica integra *IB.* 2. 497. Wasser Cyper-Graß, an der Breusch, bey der grünen Wart, auf dem Wacken, neben der Ill. *perenn.*

Gramen cyperoides palustre, spica divisa, CBp. an Gramen cyperoides palustre majus, spica divulsa, bey Gravenstaden, in einem feuchten Wäldlein, wie auch zu Eschau, an dem Mühlbach. *perenn.*

Gramen sylvaticum III. *Tab. hist.* 537. *spica divulsa*, klein Wald-Graß, an verschiedenen feuchten Orten, beym Jägerhof, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Gramen cyperoides palustre majus, spica com-

compacta, CBp. *caule exacte triangulari*, Wasser Cypern-Graß, an dem Ufer der Preusch und der Ill. *perenn.*

Gramen cyperoides spicatum minus, spica longa divulsa. CBp. *Ray hist.* 297. im Oßwalder Wald. *perenn.*

Gramen nemorosum, panicula rufescente molli T. sive Gramen sylvaticum vel nemorosum *Tab. hist. Ic.* 1. *pag.* 537. est, Gramen sylvaticum parvum tenuifolium rigidiusculum *IB.* 2. 509. Busch oder Wald-Graß, auf Wiesen, gegen Oßwald, bey dem Steeg im Ostwinckel.

Gramen dactylon radice repente sive officinar T. quod legitimum Clus est, CCXVII. in denen Kuchen-Gärten, in der Ruprechtsau und andern Orten. *perenn.*

Gramen dactylon angustifolium, spicis villosis T. sive Ischæmum II. *Tab. hist.* 534. est *Gramen digitatum hirsutum IB.* 2. 445. auf denen Wiesen gegen Oßwald, an der Landstrassen nach Blobsheim, auf einer dürren Wiese, an dem Rhein Ziegelofen, *perenn.*

Gramen spicatum, spica cylindracea molli & densa T. sive Alopecuroides *Lob. Ic.* 8. Kolben-Graß, auf denen Wiesen bey Oßwald, auf denen Ackern, vor dem Cronenburger-Hochgericht. *perenn.*

Gramen spicatum glumis cristatis T. Kamm-Graß, bey Mertzweyler, auf denen Wiesen, *perenn.*

Grossularia hortensis major, fructu molli T.

T. *flore simplici rosaceo subviridi, foliis amplioribus, fructu rubro*, grosse Sanct Johannis Träublein Staude, mit rother Frucht, *Grosseiller rouge*, Ic. Tab. hist. 1492. in allen Gärten, *perenn.*

Grossularia hortensis, majore fructu albicante, *molli globoso, Groseiller blanc*. T. grosse Johannis-Träublein-Staude, mit weiser Frucht, *perenn.* ibid.

Grossularia sylvestris spinosa, simplici acino T. sive Uva crispa, IB. 1. 47. wilde Stachelbeeren Staude, *Ic. Tab. hist.* 1491. *Grosseiller sauvageo*, fast in allen Hägen und Zäunen, in der Stadt, zwischen der Mauer, auf dem Graben, gegen dem Spitz-Thor zu. *perenn.*

Grossularia non spinosa, fructu nigro major T. sive Ribes nigrum vulgo dictum, folio olente & fructu, & schwartze Johannis Beeren-Staude *Ic. 2. Tab. hist.* 1492. & *IB. 2. 98. Grosselier noir.* in denen Hecken und Büschen, zu Oßwald und Illkirch im Wört. *perenn.*

Grossularia non spinosa, fructu nigro minore T. schwartze Johannis Beeren-Staude, mit kleinen schwartzen Beeren. ibid. *perenn.*

Grossularia multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra T. sive Ribes officinarum vulgaris, gemeine St. Johannis Trauben-Staude, mit rothen Beeren, *Grosseiler rouge Ic. 1. Tab. hist.* 1492. in allen Gärten. *perenn.*

Hedera arborea T. seu communis major IB. 2. 111. vel *scandens & corymbosa, floribus rosaceis, foliis triangulatis, fructu nigro Ic. 1. Tab. hist.* 1278.

1278. *Lierre*, Epheu, Mauer Epheu, mit grossen Blättern, an denen Stämmen der Bäume, an Mauren hin und wieder. *perenn.*

Hedera communis minor *IB.* 2. 113. seu *sterilis* Lobel. aut Helix Fuchs. 432. klein Epheu, unfruchtbahrer, auf Erden kriechender Epheu, mit spitzigen Blättern, *Petite lierre*, an denen Stämmen, unten der Wurtzel zu, Eich- und anderer Bäume. *perenn.*

Helianthemum vulgare, flore luteo T. *simplici rosaceo fructu globoso*, Sonnen-Gunsel, *Ic. Tab. hist.* 1474, *Elianteme*, hin und wieder auf dürren grasichten Orten, *perenn.*

Herniaria glabra T. *flore apetalo, fructu capsulari oblongo* sive Millegrana, *Lobel. Ic.* 421. *Herniole ou Turquette*, Harn-Kraut, Bruch-Kraut, in feuchten sandigen Gruben, aller Orten, vor allen Thoren der Stadt. *ann.*

Hieracium luteum glabrum, seu minus hirsutum, *IB.* 2. 1024. *flore semi flosculoso, semine papposo, est Aphaca. Lugd.* 562. gelbe Wegwart, an der Landstrasse, bey Jlkirch, bey der Lohmühl, oberhalb der Stadt, auf der Glacis, vor dem Cronenburger-Thor, neben dem Aeckern, *ann.*

Hieracium majus erectum angustifolium, caule lævi T. sive Hieracium majus Dioscoridis. *Tab. hist. Ic.* 1. *pag.* 481. groß Wiesen Habich-Kraut, mit einem glatten Stengel, im Ostwinckel auf den Wiesen, auf der Gallen-Matt, vor dem Weissenthurn-Thor. *perenn.*

Hieracium montanum umbellatum angustifolium

folium T. *multiflorum flore parvo*, Berg Habich-Kraut, mit gestirnten kleinen Blümlein, an rauhen steinichten Orten, zu Heilgenstein, *perenn.*

Hieracium montanum glabrum latifolium minus T. *Tab. hist.* 495. klein Berg Habich-Kraut, mit breiten Blättern, hinter Baar auf feuchten grasichten Orten. *perenn.*

Hippocastanum vulgare T. sive Castanea equina, *flore simplici rosaceo spicato folio multifido, fructu amaricante echinato*, Roß Castanien-Baum, *Marronier d'Inde Ic. 2. Tab. hist.* 1385. aller Orten in Alleen, in der Ruprechtsau, am Jesuiten-Garten. *perenn.*

Iris palustris lutea T. sive Acorus adulterinus IB. 2. 732. *flore monopetalo luteo liliaceo, folio ensiformi, radice tuberosa, fructu oblongo*, gelbe Sumpf-Lilien, Wasser-Schwertel, Ic. Tab. hist. 103. *Flambe bastard, ou Glajeul de marais*, in allen sumpfichten Gräben, vor denen Thoren, *perenn.*

Iris pratensis angustifolia humilior T. kleine Graß-Lilien, est Iris tenuifolia Chabræi. 243. auf feuchten Wiesen beym Mauerhof. *perenn.*

Iris pratensis angustifolia non fœtida altior T. sive Iris tenuifolia major, flore cœruleo & striato angustifolia *IB. 2. 727. Ic. 12. Tab. hist.* 1073. Graß Lilien, blauer Wiesen-Schwertel, auf denen dunckeln und feuchten Wiesen, beym Mauerhof. *Glayel de prez. perenn.*

Isatis sativa latifolia T. Isatis sive Glastum sativum. *IB. 2. 909. floribus luteis cruciformibus, ra-*

dice alba longa, minus fibrosa, fructu lingulari, Weyd, *Pastel ou Guide à feuilles larges*, *Ic. 2. Tab. hist.* 1114. auf dem Glacis, am Metzger- und Spithal-Thor. *perenn.*

Isatis sylvestris angustifolia T. Isatis sive Glastum spontaneum *IB. 2. 999.* wilde Weid, mit schmahlen Blättern, *Ic. Tab. hist.* 1114. *Pastel sauvages à feuilles etroites*. auf dem Schliessen. *perenn.*

Iuncus angustifolius villosus, floribus albis paniculatis, T. *fructu trigono* sive Gramen Luzulæ affine flore albo I*B*. 2. 492. haricht Wald-Graß, auf dem Hochgebürg Hochfeld. *perenn.*

Lathyrus arvensis repens tuberosus T. sive Chamæbalanus leguminosa *IB. 2. 324. floribus papilionaceis elegantissime purpureis suaveolentibus, radice esculenta*, Erckel-Nuß, kleine tief stehende Erdgriebling, nostrat. Sau-Mandeln, *Ic. Tab. hist.* 891. & *in Rivin. Gesse*, in denen fetten Korn-Feldern, zu Brischwickersheim, nahe an der Capell. *perenn.*

Lathyrus latifolius luteus foliis viciæ T. sive luteus sylvestris dumetorum *IB. 2. 304. radice fibrosa fructu siliquoso tereti*. gelbe Wicke, *Ic. Tab. hist.* 890. & *in Rivin.* sub nomine Lathyri arvensis, auf denen Wiesen, beym Canal.

Leucanthemum caulevillis canescente T. sive Bellis sylvestris, caule folioso hirsuto major, folio acutiore CBp. Gänse-Blumen, mit rauhen Stengeln, und spitzigen Blättern, zu Dorlisheim, am Dattel-Brunnen, auf denen Matten, beym Mauerhof und allen Lüften, *perenn.*

Li-

Lilac T. *flore cæruleo monopetalo infundibuliformi, fructu compresso lingulari*, blaue Zirincken, in Hägen, in der Ruprechtsau, in Gärten, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1459. *perenn.*

Lilium convallium album T. sive Lilium convallium vulgo *IB.* 3. 531. *flore monopetalo campaniformi, radice alba repente, fructu globoso molli*, Meyen-Blumen, *Ic. Tab. hist.* 1135. *Muguet à fleur blanche*, zu Oßwald, im Ostwinckel, *perenn.*

Lilium convallium latifolium T. Meyen-Blumen, mit grossen Blättern und Blumen, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1335. bey Rheinau, unten gegen dem neuen Dörfel, auf dem Haulenberg. *perenn.*

Lilium convallium floribus è folliculis prodeuntibus Mapp. *Ic. hist. plantar. pag.* 174. *perenn.* auf dem Wangenburger-Gebürg gegen Zabern.

Linagrostis panicula ampliore T. sive Iuncus Bombycinus *IB.* 2. 514. est Gramen tomentarium, Bettgraß, Linagrostis *Tab. hist. Ic.* 540. auf denen feuchten Wiesen bey Oßwald.

Linagrostis panicula tenuiore seu minori T. & Vaill. zu Waßlenheim bey der Papier-Mühle.

Lithospermum minus repens latifolium T. *flore purpureo infundibuliformi, semine subrotundo polito*, sive Lithospermum repens, *majus, Clus hist.* CXLIII. Stein-Hirse, auf denen Gebürgen, hinter Heilgenstein. *perenn.*

Lotus pentaphyllos flore majore luteo papilionaceo splendente, *fructu siliquoso* T. sive Loti corniculatæ major species, *IB.* 2. 355. *Ic. Ri-*

vin grosse Vogelwicke, auf dem Schießrein, an denen Gärten, und Gräben, ohnweit der Bruck, nahe der Lohmühl, *Lotier perenn.*

Lotus pratensis siliquosus luteus major & durior. T. *Clus hist.* CCXLIV. sive *Trifolium siliquos.* *Tab. hist.* 1. 904. *est Lotus tetragonolobus Rivin.* Schoten-Klee, in der Ruprechtsau, gegen der Schiffmatt, bey den Linden-Bäumen. *perenn.*

Lunaria major siliqua longiore, Boerhav. sive Viola lunaris *Ic.* 2. *Tab. hist.* 696. Mond-Veyel, oder Silberblatt auf dem Gebürg, im Niedecker-Thal, *biennio* durat.

Lunaria major siliqua rotundiore Boerh. sive Viola lunaris *Ic.* 1. *Tab. hist.* 696. Silberblatt mit runden Schoten, *ibid.*

Lychnis montana viscosa alba latifolia T. sive Polemonium petræum Gesneri *IB.* 3. 351. *florum petalis supra albis, subtus virescentibus, interdum contrahentibus caryophyllæis, sive Lychnis Sylvestris Tab. hist. pag.* 674. & *Clus. hist. IX. pag.* 291. zu Heilgenstein / in denen Holwegen, auf den St. Ottilien-Berg. *perenn.*

Lychnis pratensis flore admodum laciniato simplici T. purpureo, Flos Cuculi dictus, *Tab. hist. Ic.* 15. 677. *Girofle de prez*, rothe Gauch- oder Guguck-Blumen, auf allen Wiesen, *perenn.*

Eadem flore albo T. weisse Guguck-Blumen, auf der Glacis, vor dem Metzger-Thor, auf denen Wiesen bey der Gansau, *perenn.*

Lychnis sylvestris alba simplex T. *major hirsuta, foliis latioribus*, sive Ocimoides album multiplex,

tiplex, *IB.* 3. 342. ſive Ocimaſtrum *Tab. hiſt. Ic. pag.* 679. weiſer Wiederſtoß, auf allen Contreſcarpes, und an denen Hecken, vor dem Jllkircher Wald, wie auch an denen Landſtraſſen. *perenn.*

Lychnis ſylveſtris ſive Aquatica purpurea ſimplex T. flore rubello ſimplici T. ſive *Ocimaſtrum rubrum Tab. hiſt. Ic.* 2. 679. rother Wiederſtoß, in feuchten waldichten Orten, an Waſſer-Bächen, *Baſilic ſauvage, á fleur rouge, perenn.*

Lychnis ſylveſtris viſcoſa anguſtifolia rubra T. *foliis caryophyllaceis, Ic.* 7. *Tab. hiſt.* 670. *quæ Viſcaria Rivin.* wilde purpur rothe Marien-Rößlein, Kleb-Nelcken, in der Hart, bey Ottmersheim, *perenn.*

Eadem alba T. Pech oder Kleb-Nelcken / mit weiſen Blumen, in dem Urbis Thal, in denen Hecken. *perenn.*

Lyſimachia humifuſa, folio ſubrotundo acuminato, flore luteo T. *monopetalo rotato & multifido, fructu globoſo* ſive Nummularia ſeu Centimorbia *IB.* 3. 370. quæ *Anagallis lutea Lob. Ic.* 466. *Ic. Tab. hiſt.* 3. 1092. gelber Gauchheil, Wald Pfennig-Kraut, in dem Oberehenheimer und Barrer Wald, *Mouron, á fleur jaune, perenn.*

Malus ſylveſtris fructu valde acerbo *carnoſo globoſo*, T. *flore albo roſaceo, fructu albo.* wilder Apfel-Baum, *Pomier ſauvage, ou de bois*, in Büſchen und Wäldern, in dem Jllkircher Wald, und ſonſten an denen Straſſen hin und wieder, *perenn.*

Malus acido fructu sylvestris T. sive *Mala sylvestria rubentia Tab. hist. ic.* 21. 1420. Holtz Aepfel-Baum, mit rother Frucht, *ibid.*

Malus sylvestris fructu acido albo T. Holtz Aepfel-Baum, mit weiser Frucht, *ibid.*

Matricaria vulgaris seu sativa T. *foliis graveolentibus latioribus incisis, floribus compositis radiatis,* sive Artemisia tenuifolia *Tab. hist. ic.* 3. Mettram, in der Ruprechtsau, an denen Zäunen, der Gärten, *Matricaire, perenn.*

Medica echinata minima T. *IB.* 2. 386. sive Trifolium echinatum arvense, fructu minore echinato, est Tribulus minor rectus Dalechamp, Lugd. 513. auf sandigen steinichten Aeckern in der Ruprechtsau, *ann.*

Melissa humilis latifolia, maximo flore purpurascente T. *semine subrotundo* sive *Lamium montanum melissæ folio CBP. monopetalo labiato suave rubente, grati odoris, foliis ex opposito binis latioribus, in ambitu serratis,* est *Melissa Fuchs. Lob. Ic.* 515. Berg-Nessel, mit Melissen-Blätter, nostratibus, Grieß Kraut, Ic. Rivin. *Melisse de Montaigne. perenn.*

Menyanthes palustre T. sive *Trifolium Fibrinum majus, flore monopetalo cæruleo infundibuliformi, radice amarissima succulenta,* Ic. Tab. hist. pag. 906. Bieber oder Sumpf-Klee / in sumpfichten Gräben, bey der Lingelsheimer Nachtweyde. *Meniante, perenn.*

Menyanthes palustre angustifolium & tryphyllum T. *flore monopetalo infundi buliformi, fructu oblon-*

oblongo. T. seu Trifolium Fibrinum *Tab. hist.* schmahles Bieber-Klee, auf dem Hochgebürg Hochfeld beym Quell-Bächlein, *perenn.*

Mercurialis spicata seu fœmina, T. *flore apetalo viridi*, Bingel-Kraut, Weibl. *Mercuriale femelle*, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 941. *ann.* aller Orten in Gärten, und auf denen Kraut-Aeckern.

Mercurialis testiculata sive Mas T. *Mercuriale mâle* Bingel-Kraut, Männlein, *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 941. cum præced. *ann.*

Mespilus apii folio sylvestris spinosa T. sive *Oxyacantha vulgaris, flore simplici rosaceo albo, fructu globoso*, Weißdorn, Hagedorn, *Epin blanche Ic.* 1. *Tab. hist.* 1448. in Wäldern, Büschen, in denen Hägen und Zäunen. *perenn.*

Mespilus folio subrotundo, fructu rubro *globoso* T. sive Cotoneaster Gesner. *IB.* 1. 73. est *Chamæmespilus* Munting. *ubi icon elegans*. Zwerg-Mespeln, wilde Quitten, hinter dem Ottilien-Berg, *perenn.*

Mespilus folio rotundiore subtus incano, fructu nigro subdulci T. *flosculis albis rosaceis*, sive Vitis Idæa. III. Clus. hist. 62. *Amelunchier*, Fliegen-Beer, im Gebürg, zu Barr und Oberbronn. *Ic. Tab. hist.* 1488. *perenn.*

Mespilus germanica folio laurino non serrato T. sive *Mespilus vulgaris IB.* 1. 69 Nespelbaum, in Gärten, und in denen Weinbergen, *Neflier Ic. Tab. hist.* 1447. *perenn.*

Mespilus sylvestris foliis trifidis splendentibus, *Vaillant. floribus rosaceis fœtidis*, Weißdorn,

mit 3. eingeschnittenen Blättern, so gläntzen, und weisen übelriechenden Blumen, in der Ruprechtsau, an denen Hägen, und an dem Eckbolsheimer Wald, gegen dem Caual. *perenn.*

Millefolium vulgare album T. sive *Stratiotes pennatum* terrestre *IB.* 3. 136. *foliis pinnatis, flosculis albis compositis, radiatis & umbellatis, semine tenui,* Schafgarbe, Garben Kraut, mit weisen Blumen, *Ic.* 8. *Tab. hist. pag.* 372. *Mille feuille, perenn.*

Millefolium purpureum majus T. Garben-Kraut, mit rothen Blumen. *perenn.*

Myagrum monospermum latifolium T. est Myagrum monospermum *IB.* 2. 894. *flore cruciformi, fructu unicapsulari,* quod hortense *Hort. Eyst.* zu Jllkirch, neben den Ackern. *ann.*

Myosotis hirsuta altera viscosa T. kleblichter Acker Hünerdarm, Ic. Vaill. Fig. 1. Tab. XXX. auf denen Ackern, in der Ruprechtsau, an dem Weg gegen Eckbolsheim. *perenn.*

Myrrhis palustris latifolia alba T. *flore rosaceo, fructu gibbo striato,* quæ Myrrhis palustris Rivin, & Cicutaria alba Lugd. 789. Wasser Myrrhen Körfel, mit weisen Blumen, in der Ruprechtsau, in Wassergräben, bey der Lohmühl, oberhalb der Stadt, *perenn.*

Myrrhis palustris latifolia rubra T. sive Cicutaria latifolia hirsuta IB. 3. part. 2. 182. Cicutaria rubra *Lugd.* 789. breitblättrichter Myrrhen-Körfel, mit rothen Blumen, auf den Wällen, Cronenburger und Juden-Thors, *perenn.*

Myrrhis tuberosa nodosa, Conyophyllon Mor.


p. 73.
Tab III.
Nissolia T.
J. Striedbeck. sculp.

Mor. Umb. 67. ſive Myrrhis cicutaria, Tab. hiſt. Ic. 292. eſt Myrrhis fœtens Rivin. ſtinckender Myrrhen-Körfel, nach Lingelsheim, an der Landſtraß häufig, auf dem Haulenberg. *ann.*

Nidus avis T. ſive Orchis abortiva fuſca *caule & flore majore fuſco, polypetalo anomalo Ic. IB.* 2. 782. *Nid d'oiſeau*, Vogel-Neſt, Magendrehen, in ſchattichtem Gebürge, auf dem Ottilien-Berg, unter den Bäumen.

Niſſolia vulgaris T. ſive Lathyrus anguſtifolius erectus, folio ſingulari, ſine capreolis Dn. Niſſole HR Monſp. fructu ſiliquoſo, eſt Catanance leguminoſa IB. 2. 309. wilde Acker-Wicke, in denen Gerſten-Feldern, bey Ehrſtein. vid. Tab. noſtr. III.

Nux juglans ſive Regia vulgaris T. *floribus amentaceis, exjulo pendentibus, fructu ovato*, Welſcher Nußbaum, *Ic. Tab. hiſt.* 1382. *perenn.*

Ophris bifolia T. *flore herbaceo polypetalo anomalo, radice fibroſa repente*, ſive Bifolium majus, *IB.* 3. 533. Zweyblatt, zu Oſwald, in der Ruprechtsau, und zu Lingelsheim, in denen Hecken. *Double feuille, perenn.*

Opulus T. ſive Sambucus aquatica IB. 1. 152. *flore ſimplici albo monopetalo rotato umbellato, bacca molli Ic. 4. Tab. hiſt.* 1440. Schwelgen-Baum, Obier, in feuchten Wäldern, und auf dem Haulen Berg.

Orchis bifolia latiſſima CBp. *foliis binis ſplendentibus IB.* 2. 772. groſſe Fuchshoden, mit ſehr breiten Blättern, zu Jllkirch, *perenn.*

Orchis bifolia altera T. sive testiculus, vulpinus IV. hermaphroditicus, flore albo calcari longissimo, radice gemina longa. *Ic.* 5. *Tab. hist.* 1054. Orchis hermaphroditica, bifolia IB. 2. 772. est Testiculus vulpinus Hort Eyst. Weiß Knaben Kraut, mit langen Spörlein, *Couillon de Renard*, in dem Ruprechtsauer Wald. *perenn.*

Orchis morio, foliis sessilibus maculatis T. sive *Cynosorchis maculata Tab. hist. Ic.* 5. 1048. *flore purpureo violaceo, testiculo duplici*, est Cynosorchis delphinia maculosis foliis, flore purpureo violaceo IB. 2. 760. Knaben-Kraut, mit purpurfarbenen Blumen, auf denen feuchten Wiesen, in der Ruprechtsau, auf den Matten, gegen Haßlach und Rideck. *perenn.*

Orchis foliis sessilibus non maculatis T. sive *Orchis V. Clus hist.* 268. vel Orchis major tota purpurea, non maculata IB. 2. 760. est Cynosorchis fœmina HE. Ragwurtz Weiblein, mit purpurfarben Blumen, auf der Gansau, und in der Ruprechtsau, auf trockenen Wiesen. *perenn.*

Orchis morio mas foliis maculatis Vaill. 150. *sessilibus flore magno roseo, bulbo gemino*, Knaben-Kraut, mit bleichrothen Blumen, und gefleckten Blättern, am Wald, auf der Eckbolsheimer Wiese, *perenn.*

Orchis morio fœmina T. & Vaill. 150. *tota purpurea foliis non maculatis Ic.* 7. *Tab. hist.* 1048. *ibid.*

Orchis fucum referens colore rubiginoso T. & Vaill. 146. Tab. XXX. *flore hirsuto, foliolis superioribus*

perioribus viridibus, *calcari non gaudente*, *bulbo gemino Ic.* 3. *Tab. hist.* 1053. & *Buxbaum Cent. III. Tab. XXXVIII.* sive Testiculus sphægodes hirsuto flore *IB.* 2. 767. braune Hummel-Blum, braun Knaben-Wurtzel, auf dürren Orten, zu Oßwald und Lingelsheim. *perenn.*

Orchis fucum referens, floribus variegatis T. Himmel-Blumen, mit bunten Blumen, auf den Paßberg zu Buchsweyler. *perenn.*

Orchis fucum referens flore subvirente T. quæ Melitias *IB.* 2. 767. & *Tab. hist. Ic.* 5. *pag.* 1056. sive Testiculus vulpinus sphægodes *Lob. Ic.* 179. Fuchshödlein, mit gelb grünen Mücklein, auf dem Haulenberg, *perenn.*

Orchis fucum referens major, foliolis superioribus candidis & purpurascentibus T. cum aviculis testiculata, sive Orchis fuciflora, galea & alis purpurascentibus IB. 2. 766. Knaben-Kraut, oder rothe Hummel-Blum, zu Lingelsheim und Hangenbietheim, *Triple Couillon de chien Ic.* 6. *Tab. hist.* 1051. *perenn.*

Orchis Araneam referens, petalis superioribus magnis, intense purpureis, rostello longiori aviculam mentiente, apice lutea, in extremitate petali inferioris Mapp. *Ic. Vaill. fig.* 10. 11. & 13. *Tab. XXX.* est Orchis Melitias seu Apis cadaverculum exprimens Lob. 180. & Vaill. 152. auf dem Paßberg zu Buchsweyler.

Orchis palmata pratensis latifolia, longis calcaribus, folio non maculato T. sive Palmata non maculata *IB.* 2. 774. *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1059. & H.

& H. Eyst. schmahl blättricht Knaben-Kraut, mit langen Sporen, auf feuchten Wiesen, bey Lingelsheim, *perenn.*

Orchis palmata pratensis angustifolia minor T. sive Palma Christi 3. Hort. Eyst. *flore purpureo odoratissimo, longo calcari prædito rubello*, wohlriechend Händlein Wurtz, mit schmahlen Blättern, und röthlichten Blumen / auf der Lingelsheimer Nachweyde. Ic. 3. Tab. hist. 1060. *perenn.*

Orchis palmata pratensis angustifolia major. T. *floribus dilute purpureis vel Palma Christi tertia HE.* auf der Lingelsheimer Nachtweyde, auf dergichten Wiesen bey Barr. *perenn.*

Eadem flore albo ibid.

Orchis palmata minor calcaribus oblongis T. quæ Palmata angustifolia non maculosa Rivin sive *Palmata rubella* IB. 2. 278. est Palma Christi fæmina Tab. *floribus inodoris rubellis*, klein Händlein Wurtz, mit langen röthlichten bespornten Blumen, zu Mundelsheim, in dem Wald zu Illkirch, zu Hangenbietheim, *perenn.*

Eadem flore albo, sed rarius.

Orchis palmata montana maculata, *flore variegato, foliis pallide viridibus angustioribus, floribus rubris punctatis*, quæ Orchis Palmata alba *IB.* 2. 775. auf dem hohen Andlauer Gebürg, *perenn.*

Orchis palmata Batrachites T. seu *Myodes Lob. Ic.* 193. & Vaill. Tab. XXXI. num. 6. *flore galeato viridi* Händlein Wurtz, mit grünen Helm-

Helm-Kappen, auf dem Haulenberg, zu Oßwald und Lingelsheim, *perenn.*

Orchis palmata palustris latifolia T. sive Serapias palustris latifolia, flore atro sub purpurascente *IB. 2.775. folio maculato, qua Palma Christi 3. Tab. hist. pag.* 1061. breit blättricht Händlein Wurtz, mit bleich röthlichten Blumen, zu Lingelsheim auf der Nachtweyde, beym Bächlein, bey den 7. Fußfällen, und in der Ruprechtsau. *perenn.*

Orchis palmata palustris altera T. *foliis latioribus maculatis, floribus violaceis* Ic. Tab. hist. 9. 1061. sive Palmata serapias palustris, leptophylla, violacea maculata & non maculata *IB.* 2. 776. Wasser Händlein Wurtz, mit punctirten Blättern, auf feuchten Wiesen, zu Oßwald und Ruprechtsau, *perenn.*

Orchis palmata palustris maculata T. sive Palmata palustris Nephelodes IB. 2. 777. quæ Palma Christi palustris 1. Tab. hist. p. 1061. Wasser Händlein Wurtz, mit gefleckten Blättern, *Ic. Tab. hist. 7. pag.* 1061. zu Lingelsheim, und auf andern feuchten Wiesen, *perenn.*

Orchis palmata palustris tota rubra T. sive Palmata floribus impense rubris IB. 2. 777. *foliis & floribus non maculatis rubris*, quæ Palma Christi 2. est *Tab. hist.* 1061. Wasser Händlein Wurtz, mit gantz rothen Blumen, zu Oßwald, *perenn.*

Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans Mas T. & Vaill. 147. *testiculata* Stendel

Wurtz,

Wurtz, wo die Blum einen nackenden Menschen præsentirt, in der Ruprechtsau, auf den Matten, und in dem XV. Wört auf grasichten Boden. *perenn.*

Orchis flore Simiam referens T. sive Cynosorchis latifolia, hiante cucullo minor Tab. hist. Ic. 2. 147. testiculata, sive Orchis Cercopithecum exprimens lusitanica altera Breyn. Cent. 101. p. 42. gemein Knaben-Kraut, optima icon in Inst. RH. Tournef. Tom. 2. Tab. 247. & Vaill. Tab. XXXI. N. 25. fast aller Orten bey Oßwald, und auf dem Haulenberg. *perenn.*

Orchis papilionem referens foliis maculatis T. *testiculata* seu Orchis ornithophora, folio maculoso *IB.* 2. 759. *Lobel. Ic.* 183. Fuchshödlein, zu Lingelsheim, uud auf dem Gebürg, zu Rappolsweyler, *perenn.*

Orchis barbata odore hirci, breviore latioreque folio T. *calcari donata*, sive Orchis barbata fœtida *Tab. hist.* 1. 1055. & *IB.* 2. 756. *Couillon de bouc*, grosse Bocksbödlein, stinckende Geilwurtz, mit breiten Blättern, auf dem Paßberg, zu Buchsweyler häufig, zu Hangenbietheim, in der Ruprechtsau, beym Jägerhof, in denen Hecken. *perenn.*

Orchis odore hirci minor T. sive Triorchis, minor flore fuliginoso *IB.* 2. 764. *Ic. Tab. hist.* 3. 1053. & *Lob. Ic.* 177. *testiculata cum calcari, potius Cimicum odore, flore obsolete purpureo*, stinckend Wantzen Knaben-Kraut, bey Lingelsheim häufig, auf einer fetten und feuchten Wiesen, lincker Hand beum Krengel. *perenn.* Or-

Orchis latifolia hiante cucullo major T. *testiculata* sive Cynosorchis major trifolia, galea & alis fere cinereis *IB. 2. 757.* est Satyrium triphyllum Tab. hist. 1056. groß Knaben-Kraut, mit Aschen farbigen Blumen, zu Lingelsheim, Oßwald, und anderen Orten mehr. *perenn.*

Orchis latifolia hiante cucullo altera T. sive Cynosorchis prior Dod. pempt. 234. & *IB. 2.* 758. Berg Knaben Wurtz, auf dem Haulenberg, und in der Ruprechtsau. *perenn.*

Orchis latifolia spica compacta T. *purpurea testiculata* vel Cynosorchis III. Dodon. Lobelio major alter IB. 2. 762. sive Cynosorchis major IV. *Tab. hist.* 1047. Knaben-Kraut, mit dichter schön rothen Flor, nostratibus, Blutwurtz, in der Ruprechtsau, in denen Hecken. *perenn.*

Orchis militaris major T. *testiculata, galea fusca & floribus eleganter punctatis, seu Orchis strateumatica major IB. 2. pag.* 758. sive Orchis latifolia altera Clus hist. 267. quæ Orchis latifolia est H.Eyst. Tab. 195. *Grand Couillon de Chien Ic. Tab. hist. 5. pag.* 1050. sub nomine Testiculus V. militaris, groß Knaben-Kraut, mit braun schwartzem Helm, und schönen punctirten Blumen, in dem Ganßauer Wald häuffig, ist unter allen die gröste und schönste.

Orchis militaris minor T. *floribus parvis albis multis punctis purpureis notata testiculata*, *Ic. Tab. hist. 7. pag.* 1051. sive Orchis strateumatica minor *IB. 2. 19.* 758. & Vaill. Tab. XXXI. fig. 29.

Eyst. breit blättricht Knaben-Kraut, mit langen Sporen, auf feuchten Wiesen, zu Oßwald und Lingelsheim', *perenn.*

Variat colore carneo, lacteo, suave rubente, lituris purpureis.

Orchis militaris pratensis humilior T. testiculata flore guttato sanguineo. sive Orchis pannonica *Clus hist.* 268. est *Orchis minima Rivin*, klein punctirtes Knaben-Kraut, bey Oßwald auf denen Wiesen.

Orchis militaris montana spica rubente, conglomerata T. *testiculata Ic.* 8. *Tab. hist. pag.* 1051. roth Knaben-Kraut, mit gedrungenem Strauß, in dem Illkircher Wald. *perenn.*

Eadem flore albo. in dem Ruprechtsauer Wald.

Orchis minor palmata, radice repente, Camerar. ubi opt. icon seu *Orchis repens* H. Eyst. seu Helleborine sylvatica, radice repente Ray. falsch Stendel-Wurtz, in dunckeln und schattichten Orten, unter den Bäumen, in dem Barrer und Oberehenheimer Wald, *perenn.*

Orchis palmata montana maculata T. sive Palmata alba *IB.* 2. 775. vel. Palma Christi maculata, *Tab. hist. Ic.* 6. 1060. Berghändlein-Wurtz, mit weissen Blumen, und gefleckten Blättern, auf Berg-Wiesen, hinter Barr. *perenn.*

Orchis palmata pratensis maculata T. *calcaribus longis, flore purpurascente*, sive Palmata speciosiore thyrso, folio maculato *IB.* 2. 774. *Ic.* 5. *Tab. hist. pag.* 1060. Händlein-Wurtz, mit gefleckten Blättern, und rothen Blumen, *Satyrion Royal,*

Royal, auf feuchten Wiesen zu Oßwald, und in der Ruprechtsau, *perenn.*

Orchis palmata pratensis maculata flore albo T. *longis cacaribus*, sive Palma Christi erecta flore candido H. Eyst. debet esse picta, cum maculis, Händlein-Wurtz, mit gefleckten Blättern, und weisen Blumen bey Oßwald. *perenn.*

Orchis palmata pratensis latifolia maculata flore variegato T. sive Palma Christi erecta, flore variegato, Hort. Eyst. Händlein-Wurtz, mit gefleckten Blättern, und bunten Blumen, auf der Nachtweyd zu Lingelsheim, *perenn.*

Orchis bifolia minor calcari oblongo CBP. sive Orchis alba, calcari longo IB 2. 771. Stendel-Wurtzel, mit weisen lang besporten wohlriechenden Blumen, zn Heilgenstein, zu Hangenbietheim. *perenn.*

Papaver erraticum majus T. sive Papaver erraticum rubrum campestre *IB.* 3. 395. *flore puniceo rosaceo, fructu ovato coronato*, rothe Korn oder Klapper-Rosen, Feld Mag-Saamen, *Coquelicoc Ic.* 1. *Tab. hist.* 966. in denen Saam- und Korn-Feldern. *ann.*

Papaver erraticum minus T. kleiner wilder Mohn, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 966. auf steinichten und dürren Korn-Aeckern, *ann.*

Parietaria vulgaris seu officinar. T. & *IB.* 2. 976. *flore herbaceo apetalo, folio hirsuto, semine oblongo*, Glaß-Kraut, Tag und Nacht-Kraut, *Parietaire Ic. Tab. hist.* 939. an schattichten Orten und zerfallenen Mauren.

Pastinaca latifolia sativa T. *flore luteo rosaceo umbellato, radice alba.* Pastenen oder Pestnägel. *Panais ou Pastenade Ic.* 1. *Tab. hist.* 198. in denen Gartners-Feldern, *ann.*

Pastinaca sylvestris latifolia T. seu *Pastinaca germanica sylvestris IB.* 3. *part.* 2. 149. *floribus luteis rosaceis foliis latioribus dissectis semine ovato*, sive Branca Leonina *Tab. hist. Ic.* 2. 198. *Pastenade sauvage*, wilde Pastenack, auf denen Wiesen, in der Ruprechtsau, *ann.*

Pedicularis pratensis purpurea, T. seu *Crista Galli, flore rubro IB.* 3. 437. *flosculis monopetalis personatis, foliis elegantissime dissectis fructu bifario*, rother Hahnen-Kamm, *Pediculaire de prez, á fleur rouge Ic. Tab. hist.* 1180. & *Rivin*, auf feuchten Wiesen zu Oßwald, *perenn.*

Pedicularis palustris rubra elatior, Ray. hist. 770. & *in Rivin.* hoher Wasser, oder Sumpf-Rädel, mit purpurfarben Blumen, cum præced. *perenn.*

Pedicularis pratensis lutea T. Crista Galli Fæmina dicta *IB.* 3. 436. Hanen-Kamm, Wiesen-Rödel, mit gelben Blumen / *Crete de Cocq, á fleur jaune* auf allen Wiesen, *ann.*

Pedicularis lutea erectior pratensis, calice floris hirsuto T. sive Crista Galli Mas *IB.* 3. 436. grosser gelber Hahnen-Kamm, est Pedicularis lutea *Tab. hist.* 1180. auf Wiesen, in dem Ost-winckel.

Pedicularis angustifolia montana T. *foliis oblongis angustis & crenatis, floribus pallide luteis,*

Wald-

Wald Hahnen-Rödel, im Gebürg hinter Barr. *ann.*

Pentaphylloides argenteum alatum, seu Potentilla T. sive Potentilla vel Argentina *IB.* 2. 398. *quæ* Anserina officinarum, *flore simplici rosaceo, foliis serratis subtus incanis*, Silber-Blatt, *Argentine*, Gänserich, an denen Wegen, und Landstrassen, *Ic. Tab. hist.* 342. *perenn.*

Phalangium parvo flore ramosum T. *Ic. IB.* 2. 635. *albo liliaceo, radice filamentosa, fructu subrotundo*, Spinnen-Kraut, *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 557. Gall. *Phalangium*, zu Oswald in denen Hecken, *perenn.*

Phalangium ampliore flore non ramosum T. seu *pulchrius non ramosum* IB. 2. 635. & *Tab. hist.* 2. *pag.* 557. Erdspinnen-Kraut, in dem Hanauer und Engelsheimer Wald, *perenn.*

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta T. Sanguisorba minor IB. 3. part. 2. 113. klein Sperber-Kraut, klein haaricht Pimpernell, *Ic. Tab. hist.* 316. auf allen Wiesen, *perenn. Petite Pimpernelle.*

Pimpinella sanguisorba minor lævis T. kleine glatte Pimpernell, prioris est varietas in hortis culta mutatur.

Pinus sylvestris vulgaris Genevensis T. & *IB.* 1. 253. *coma brevi, foliis rudioribus & acutioribus, floribus apetalis luteis, fructu squamoso*, Fichten oder Kienbaum, *Ic.* 5. *Tab. hist.* 1345. *Pin sauvage*, in dem Brumbter Wald, *perenn.*

Pinus sylvestris altera montana T. sive Pinus

ſylveſtris Mugho, ſive Crein *IB.* I. 246. Alpen Reinbaum, *Ic. Tab. hiſt.* 6. 1345. *perenn.*

Piſum hortenſe majus T. *flore candido papilionaceo, fructu rotundo albo, fructu ſiliquoſo*, runde Garten oder Stecken-Erbſen, mit weiſſer Blüthe, *Ic. Fuchs hiſt. plant. pag.* 627. auf denen Gartners-Feldern, *ann.*

Piſum hortenſe majus flore purpureo T. runde Garten oder Stecken Erbſen, mit rothen Blumen, *ibid. ann.*

Piſum humile caule firmo T. kriechende Feld-Erbſen, auf denen beſambten Aeckern, *ann.*

Piſum ſiliqua incurva carnoſa, ſeu falcata *Ray hiſt.* 891. krumme Schoten-Erbſen, *ibid. ann.*

Piſum arvenſe fructu viridi T. grüne Feld oder Lothatinger Erbſen, auf denen Gartners-Feldern, *ann.*

Piſum arvenſe fructu albo T. weiſe Saat-Erbſen, *Ic.* 4. *Tab. hiſt.* 883. *ann. ibid.*

Piſum majus quadratum, fructu cinerei coloris T. Lob. Ic. 65. groſe 4. eckichte Stock Erbſen, *ibid. ann.*

Piſum umbellatum T ſive Piſum proliferum *Tab. hiſt.* 882. Büſchel-Erbſen, *Poir à bougets ann.*

Plantago anguſtifolia major T. *floee monopetalo hypocrateriformi quadripartito, radice fibroſa, fructu ovato* Ic. I. *Tab.* 4. 1107. Spitz-Wegerich, auf denen Wieſen, und Reinen der Aecker, *Plantain, à feuilles etroites. perenn.*

Plantago latifolia glabra minor T. kleiner

glat-

glatter Breitwegerich, *Ic.* 3. *Tab. hist.* 1107. auf denen Wiesen, zu Eckbolsheim, *perenn.*

Plantago angustifolia minor T. kleiner Spitzwegerich, *Ic.* 3. *Tab. hist.* 1107. auf sandigen Orten, beym Canal, auf denen Wiesen zu Ostwald. *Petit plantain*, *perenn.*

Plantago latifolia sinuata T. gemeiner Breitwegerich, an allen Wegen, auf den Matten, beym Canal. *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1107. *perenn.*

Plantago latifolia hirsuta minor T. & Haller. 472. kleiner Breitwegerich, mit haarichten Blättern, auf dürren steinichten Orten, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Plantago trinervia folio angustissimo T. *foliis valde pilosis* Wegerich, mit 3. Rippen, bezeichneten schmahlen Blättern, vor dem Fischer-Thor, auf dem Glacis, neben einer Mauer, am Rhein Ziegel-Ofen, *perenn.*

Plantago latifolia incana T. Schaf-Zunge, oder Breitwegerich, *Ic.* 4. *Tab. hist.* 1107. *Plantain à la larges feuilles*, aller Orten, auf denen Wiesen, und an denen Wegen, *perenn.*

Pœonia folio nigricante & splendente T. *flore intense purpureo*, *simplici rosaceo*, *foliis latioribus dissectis*, *radice alba crassa*, *fructu siliquoso cornuto lanuginoso*, rothe Gicht oder Pfingst-Rosen, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1171. *Pivoine male*, in Gärten, und in denen Weinbergen.

Pœonia fœmina flore pleno rubro majore T. *radice bubosa*, rothe gefüllte Gicht, oder Pfingst-

Rosen, *Ic. Tab, hist.* 3. 1172. *Pivoine à fleur double ou Pivoine Femelle, perenn. ibid.*

Pœonia communis vel Fæmina T. *radice bulbosa*, gemeine Pfingst- oder Gicht-Rosen, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1171. *perenn.*

Polygonatum latifolium vulgare T. *flore albo simplici monopetalo, campaniformi tubulato diviso, fructu molli globoso*, sive Sigillum Salomonis officinatum, *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 1136. *Seau de Salomon à larges feuilles*, Weiß-Wurtzel, in schattichten Höltzern, zu Holtzheim, und Illkircher Wald. *perenn.*

Polygonatum latifolium maximum T. sive Polygonatum latifolium III. *Clus hist.* 1. *pag.* 275. *plus grande Seau de Salomon*, groß Weiß-Wurtz, mit breiten Blättern, in dem Hanßauer Wald, über dem Krümmeri, gegen Gravenstaden, häufig. *perenn.*

Polygonatum latifolium minus, flore majore T. breit blätterichte Weißwurtz, mit grosen Blumen, auf denen Felsen bey Rappolstein, nahe bey dem alten Schloß, *perenn.*

Prunus sativa vulgaris, fructu magno crasso subacido T. vulgo Prunus damascena, flore rosaceo albo, *folio oblongo serrato*, Pflaumen oder Quetschen-Baum, *Prunier Ic.* 1. *Tab. hist.* 1403. in Gärten und Weinbergen. *perenn.*

Populago flore majore T. *rosacea fructu vaginulato, radice fibrosa*, Dotterblum, mit grosen Blumen, *Ic. Tab. hist. pag.* 1128. an dem Mauerhof, vor der grünen Wart, am Graben. *perenn.*

Popu-

Populago flore minore T. seu Populago minor *Tab. hist.* 1128. auf der Lingelsheimer Nachtweyde, in sumpfichten Orten, beym Mauerhof. *perenn.*

Prunus fructu ovato magno flavescente, *flore albo rosaceo* T. Spilling, Imperiale jaune, in Gärten und Reben.

Prunus fructu ovato magno rubente T. *Imperiale rouge*, rothe Spilling. *ibid.*

Prunus fructu ovato maximo T. *Prune de Monsieur*, grose Spilling oder Marruncken. *ibid.*

Prunus fructu cerei coloris T. sive Prunea cerea *Ic.* 4. *Tab. hist. pag.* 1404. *Prune de St. Catherine*, gemeine Spilling. *ibid.*

Prunus fructu parvo dulci, atro cœruleo T. sive Pruna damascena, *Petit damas noir* Pflaumen-Baum, mit kleinen schwartzen Früchten, in allen Gärten.

Prunus fructu parvo præcoci T. sive Avenaria, *Tabern. hist.* 2. 1403. Haber-Schlehen, in denen Weinbergen.

Pyrus sativa, T. *floribus albis rosaceis*, zahmer Birnbaum, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1422. *Poirier* in allen Gärten. *hujus species fere innumerabiles recenset in Institutione rei Herb. Tournef. pag.* 628.

Pyrus sylvestris T. seu Pyra sylvestria T. *Poirier sauvage*, wilder Birnbaum, Holtzbirn-Baum, *Ic. hist.* 1425. an denen Dörffern, und Landstrassen.

Quercus latifolia Mas, quæ brevi pediculo est T. & *IB*, 1. 70. & *Tab. hist.* 1375. *flosculis rubentibus*

amentaceis fructu glanduloso, Eichbaum mit Früchten, an kurtzen Stielen, *Chene* in dem Ruprechtsauer und Jllkircher Wald.

Quercus cum longo pediculo T. sive Quercus vulgaris cum longis pediculis, *IB.* 1. 70. & *Tab. hist.* 1374. Eichbaum mit Früchten, so an langen Stielen hangen, in allen Wäldern, auf dem Weg gegen Lingelsheim, *perenn.*

Ranunculus aquaticus capillaceus T. sive Ranunculus aquaticus omnino *IB.* 3. 781. est Fœniculum aquaticum, *Tab. hist.* 3. 187. weisser Hahnen-Fuß, mit Stabwurtz-Blättern, in stehenden Wasser-Bächen, in der Ruprechtsau, und zu Jllkirch. *perenn.*

Ranunculus aquaticus capillaceus, cum globulis in extremitate foliorum *Mapp. hist. plant. alsatic. pag.* 262. in der Breusch, oberhalb der grünen Wart, *perenn.*

Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo T. *flore albo rosaceo*, sive Ranunculus aquatilis albus tenuifolius IB. 3. 781. *Grenouillette*, invenitur quandoque flore pleno, in einem stillstehenden Wasser, bey der Gansau, Fluß Hahnen Fuß, *Ic. Tab. hist. pag.* 119.

Ranunculus aquaticus albus fluitans, peucedani foliis. HLBat. seu Millefolium maratriphyllum fluitans, *IB.* 3. 782. *Ic. opt. Mapp. hist. pag.* 262. Lock mit Feuchel-Blättern.

Ranunculus aquaticus albus, foliis circinatis tenuissime divisis, floribus ex alis longis pediculis

diculis innixis Pluck. Phyt. Fluß Hahnen Fuß, mit gar zarten Blättern, bey Molßheim, in den ausgetretenen Fluß-Wässerlein, *perenn.*

Ranunculus aquaticus flore albo parvo hederaceo T. *Ic. IB.* 3.782. & Lugd. 1031. Wasser Hahnen-Fuß / mit Epheu-Blättern, zu Molßheim, in den Gräben, beym Kloster St. Johann, und in den Gansauer-Wald. *perenn.*

Ranunculus montanus aconiti folio flore albo majore T. sive *Ranunculus IV. Clus hist.* 236. & *Ic.* 5. *Tab.* 108. est Ranunculus flore albo, alpinus major, *IB.* 3. *app.* 861. Wald Hahnen-Fuß, hinter Mutzig, gegen Haßlach, an dem Bach.

Ranunculus montanus folio aconiti, magno flore *globoso luteo Ic. Clus hist.* 237. & *Tab. hist.* 11. 109. Kugel Hahnen-Fuß, auf bergichten Wiesen bey Wimmenau.

Ranunculus pratensis erectus dulcis T. süesser Hahnen-Fuß, Ancken oder Butter-Blumen, auf denen Wiesen, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 117. *perenn.*

Ranunculus pratensis major, radice verticilli modo rotunda T. *acri*, *sive* Ranunculus bulbosus, *Lob. Ic.* 667. & *Tab. hist.* 108. Wiesen Hahnen-Fuß, mit knollichter braunen Wurtzel, auf Matten, zu Oßwald und Ruprechtsau.

Ranunculus pratensis minor, radice verticilli modo rotunda T. sive Ranunculus tuberosus major. *IB.* 3.417. kleiner Wiesen Hahnen-Fuß, mit knollichter brennenden Wurtzel, St. Antoni-

us Rüblein, auf denen Wiesen, bey allen Lüf-ten, in der Ruprechtsau an denen Wegen.

Ranunculus pratensis repens hirsutus T. flore luteo simplici IB. 3. 479. dulci kriechender harichter Wiesen Hahnen-Fuß/ auf allen grasichten Orten, ingleichen auf denen Brach-Feldern. *Ic. 6. Tab. hist.* 118. *perenn.*

Ranunculus arvensis echinatus T. seu *arvorum Lob. Ic.* 665. 13. & 14. *Tab. hist.* 110. Acker Hahnen-Fuß, nostratibus Acker oder Frucht-Läuse, á Tabernæmont. *Ranunculus hic dividitur in latifol. & angustifol. sed est naturæ lusus* fast auf allen Frucht-Aeckern. *ann.*

Raphanus major oblongus T. *cortice albo & nigro, Raifort*, grose schwartze und weise Bauren-Rettich, vulg. Sprachmeister, in Gärten, und Garten-Feldern. *ann.*

Raphanus niger, T. gar groser schwartzer Rettich, Pfund-Rettich, Ic. Lob. 202. *ann. ibid.*

Raphanus major orbicularis vel rotundus T. *floribus rubellis*, gemeiner Rettich, mit röthlichten Blumen, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 797. ibid. *ann.*

Idemfloribus candidis T. Rettich mit weisen Blumen, *ibid.*

Raphanus minor oblongus T. *cortice rubro & albo*, frühe oder Monath-Rettich, mit rother und weiser Rinde: Radißgen, Ic. Matth. epit. 2. 400. *ann.*

Raphanistrum flore albo cruciformi striato, siliqua articulata glabra minore T. sive Rapistrum flore albo striato, seu Erucæfolio Lob.

Ic.

Ic. 191. Heydrettich, Hederich, auf den Aeckeren bey Gemar, *ann.*

Raphanistrum flore albo striato, siliqua articulata striata minore unicapsulari Moris hist. & *IB.* 2. 851. & *Tab. hist.* 800. weiß Hederich, auf denen Aeckeren, bey Haußbergen und Illkirch. *perenn.*

Raphanistrum segetum flore luteo vel pallido cruciformi T. Lampsana flore melino Tab hist. 793. Hederich, wilder Senf, mit schwartzen Körnern, auf allen Frucht-Aeckern. *ann.*

Rapistrum arvense folio auriculato acuto T. *siliqua rotunda floribus albis spicatis sive* Myagro affinis herba, capitulis rotundis *IB.* 2. 895. & in utroque Banhin. Rübsen, unter der Frucht, bey Niederhaußbergen. *ann.*

Rapunculus folio oblongo spica orbiculari T. *flore cæruleo monopetalo campaniformi. fructu loculari*, Ic. Rivin sive Rapunculus flore globoso purpureo *IB.* 2. 810. Wald-Rapuntzel, mit runden Blumen, zu Heilgenstein, auf den Gebürg, auf den Bergmatten hinter Baar. *perenn.*

Rapunculus spicatus, T. sive Alopecuroides, *foliis urticæ, spica longiore, floribus monopetalis cæruleis*, Wald-Rapuntzel, *Ic. IB.* 2. 809. Grand reponce, auf den Gebürg, zu Hochfeld.

Rapunculus spicatus flore saturate violaceo foliis maculis nigris notatis, seu comosus IB. p. 2. 809. Wald-Rapuntzel, mit Viol-blauen Blumen, und schwartz gefleckten Blättern, in dem Eckbolsheimer Wald, *perenn.*

Idem

Idem foliis non maculatis *quod non lusus naturæ est*, *uterque non mutatur*, Wald Rapuntzel, mit blauen Blumen, und Blättern ohne Flecken. *perenn.*

Rhamnus T. sive Rhamnus catharcticus, *flore monopetalo infundibuliformi ex albo virescente*, *foliis pyri*, *baccis nigris*, in officinis, *Spina Cervina* seu *infectoria*, Creutzbeeren-Baum, Färberbeer-Baum, *Ic. Tab. hist.* 1. *pag.* 1489. bey Illkirch und Lingelsheim. *perenn.*

Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato, folio glabro T. *fructu rubro rotundo oblongo*, wilde Feld oder Hecken-Rosen, mit röthlichten Blumen, *Eglantier ic. Tab. hist. pag.* 1495. *perenn.* an denen Strassen.

Rosa sylvestris odorata, flore candido T. wilde weise Hecken-Rosen, *ibid.*

Rosa sylvestris repens alba T. *floribus in umbellam congestis*. Haber-Rose, an dem Weg nach Oßwald, *perenn.*

Rosa sylvestris, flore majore & rubente T. sive *Rosa sylvestris flore rubro Hort. Eyst.* grose Bütten-Rosen, nostratibus, Essig-Rosen, in Gärten, und zu Haußbergen, *Rose rouge ou Roses des Provins*, *perenn.*

Rosa campestris, spinosissima flore albo odoro T. *foliis rotundis dense dispositis*, quæ Rosa præcox spinosa flore albo Hort. Eyst. seu Rosa pumila spinosissima foliis pimpinellæ glabris, flore albo, IB. 2. 40. weise Rosen, mit Pimpernell-Blättern, in dem Eckbolsheimer

Wald/

Wald, bey den Wiesen, neben den Ackern gegen Oßwald. *perenn.*

Rosa sylvestris pomifera major T. sive Rosa pomo spinoso folio hirsuto, *IB.* 2. 38. Wilde Rosen, mit stechender grosen Frucht, auf dem Gebürg, zu Niedeck. *perenn.*

Rosa rubra simplex T. *IB.* 2. 34. seu Damascena *Lob. Ic.* 206. gemeine Garten-Rosen, mit einfachen Blättern, *perenn.*

Rosa rubra multiplex T. gefülte Garten-Rosen, mit rothen Blumen, *Tab. hist.* 2. 1493.

Rosa purpurea T. seu *Provincialis major* Tab. hist. 3. 1494. seu Rosa rubello flore majore multiplicato IB. 2. 36. grose gefülte Provinz-Rosen. *perenn.*

Eadem flore simplici.

Rosa maxima multiplex T. seu Hollandica rubella plena, seu Centifolia, *IB.* 2. 37. die gröste gefülte Holländische Rose. *perenn.*

Rosa alba vulgaris major T. seu Rosa alba, *Tab. hist. flore semipleno*, weise Garten Rosen.

Rosa flore albo pleno T. Ic. Hort Eyst. & *Tab. hist. pag.* 1493. weise gefülte Rosen. *perenn.*

Rosa lutea multiplex T. IB. 2. 48. seu Rosa flava plena, Clus hist. pag. 114. gelbe gefülte Rosen. *perenn.*

Rubus Idæus spinosus T. *flore albo rosaceo rubro globoso, odoro IB.* 2. 59. & in *Matthiol. epit.* 357. Holbeer, Himbeer-Staude, mit rother wohlriechender Frucht, in denen bergichten Büschen, bey Barr. Frambosier. *perenn.*

Rubus

Rubus Idæus spinosus fructu albo T. Hohlbeer-Staude, mit weisser Frucht, hin und wieder in Gärten, in dem Hochgräflichen Leinningischen Garten. *peeenn.*

Rubus repens fructu cæsio T. *cæruleo* sive Rubus minor, fructu cœruleo *IB.* 2. 59. klein kriechende Kratzbeer, oder Brombeer Staude, neben denen Aeckern, und Gräben gegen Oßwald, vor dem Illkircher Wald. *perenn.*

Rubus vulgaris fructu nigro T. *albo rosaceo* sive Rubus major *IB.* 2. 57. *Ic. Tab. hist. pag.* 1297. *perenn. Ronce*, Kratz-oder Brombeer-Staude, mit weiser Blüthe, in dem Eckbolsheimer Wald.

Rubus vulgaris fructu nigro, flore purpurascente nostr. Brombeer-Staude, mit rother Blüthe. *ibid.*

Prior species non raro occurrit. etiam flore pleno, foliis laciniatis.

Ruta hortensis latifolia T. *floribus luteis rosaceis, foliis saturate viridibus graveolentibus, fructu tetragono*, Garten-Rautte, *Rue Ic.* 1. *Tab. hist.* 387. *perenn.*

Salix humilis angustifolia T. *seu repens, ante folia, julos ferens suaveolentes.* Girrl-Weyde, Ic. IB. 1. 214. & Lobel. Ic. 173. an der Ill häufig, *hæc prima inter salices floret. perenn.*

Sambucus humilis, sive Ebulus officinarum T. sive Sambucus herbacea IB. 1. 546. *flore albo rosaceo multifido, fructu racemoso globoso.* Attich, niedriger Hollunder, Ic. Tab. hist. 1160. *Veble*

zu Bischofsheim und Hönheim, am Weg. *perenn.*

Sambucus fructu in umbella nigro T. *flore albo monopetalo rotato* Hollunder-Staude, Holder-Baum, mit schwartzen Beeren, *Sureau Ic. 1. Tab. hist.* 1440. aller Orten, in Hägen und Hecken, bey der Catharinen-Brucke, beym Sand-Platz. *perenn.*

Sambucus fructu in umbella viridi T. sive Sambucus fructu albo *Lob. Ic.* 162. Holderbaum, mit weisen Beeren, in der Stadt, in Gärten, in den Hecken, beym Rhein-Giesen. *perenn.*

Sanicula officinarum T. sive Sanicula Mas Fuchs IB. 3. 639. *flore rosaceo, umbellato sub viridi* Sanickel, *Sanicle*, Ic. Tab. hist. 1. 244. & in Rivin. in Höltzern zu Oswald, und Ganshauer Wald. *perenn.*

Satureja sativa T. sive hortensis *flore galeato purpurascente monopetalo,* Saturey, Bohnen-Kraut, Ic. 1. Tab. hist. pag. 744. *Sarriette*, aller Orten in Gärten, *ann.*

Scabiosa pratensis hirsuta, quæ officinarum T. *flore ex cœruleo purpurascente composito, folio laciniato*, Apostem-Kraut, blaue Scabiosen, *Scabieuse vulgaire*, *Ic. 6. Tab. hist.* 442. auf allen Wiesen. *perenn.*

Scabiosa major, flore ex cœruleo purpurea T. *Ic. 2. Tab. hist.* 441. grose purpurblaue Scabiosen, neben dem Canal, auf denen Wiesen zu Lingelsheim, bey der Capell, *perenn.*

Scabiosa

Scabiosa montana latifolia non laciniata rubra & prima T. sive Pannonica purpureo flore IV. Clus hist. 11. breitblättrichte rothe Berg-Scabiosen, *Ic. Tab. hist.* 7. 442. auf dem Gebürg, hinter Baar. *perenn.*

Scandix vulgaris, semine rostrato T. *flore rosaceo albo*, sive Pecten veneris IB. 3. part. 2. pag. 71. & in Rivin. Nadelkörfel, *Peigne de Venus*, in denen Frucht-Feldern, fast aller Orten, Ic. 1. Tab. hist. 288. *ann.*

Scirpus palustris altissimus T. sive Iuncus altissimus seu maximus Holoschænos IB. 2. 522. *caule medulloso floribus apetalis stamineis, semine triangulari*, grosse Weyher-Binzen, Ic. Tab. hist. 565. in stillstehenden Wasser-Graben, vor dem Fischer-Thor. *perenn.*

Sclarea pratensis, foliis serratis, flore cœruleo, T. sive Sclarea sylvestris flore magno cœruleo IB. 3. 11. *monopetalo labiato, semine subrotundo*, wilder Scharlach, Ic. 4. Tab. hist. pag. 705. & in Rivin. *sub nomine*, Hormin. pratense, *Toute bonne*, auf denen Wiesen, auf allen Contrescarpes, *perenn.*

Variat quandoque vel flore rubente vel albo.

Sclarea major, foliis in profundas lacinias incisis T. sive Gallitricum sylvestre, coma virescente IB. 3. 312. quæ Hormini sylvestris IV. prima species. Clus. hist. XXX. Scharlach, mit tief eingeschnittenen Blättern, auf dem Glacis, vor dem Spithal-Thor, auf den Wiesen zu Oßwald und Gravenstaden. *perenn.*

Se-

Senecio minor vulgaris T. five Senecio vulgaris Erigeron IB. 2. 1041. *flore composito luteo flosculoso papposo, semine papposo* Ic. 1. Tab. hist. pag. 462. *Seneçon*, Creutzel oder Canarien-Kraut, in allen Gärten und Feldern. *ann.*

Sideritis foliis hirsutis, profunde crenatis T. *flore monopetalo ochroleuco labiato, semine oblongo*, Zeißgen-Kraut, Beruf oder Glied-Kraut, *Crapaudine* Ic. 5. Tab. hist. 370. & Rivin, neben denen Landstrassen, an der Klamm zu Achenheim. *perenn.*

Sinapi rapifolio T. *flore subluteo cruciformi, siliqua latiuscula glabra, semine rufo*, Ic. 1. Tab. hist. 838. Wilder Senf, mit braunrothen Saamen, zu Gundershofen, neben den Aeckern, *Moutarde sauvage. ann.*

Sisymbrium aquaticum T. *supinum pumilum, flore albo simplici cruciformi, siliqua bipartita* five Nasturtium aquaticum IB. 4. 884. Brunnen oder Wasser-Kresse, *Cresson d'eau ou de fontaine*, Ic. 1. Tab. hist. pag. 846. in fliesenden Wasser-Bächlein, auf dem Wacken, in Gräben. *perenn.*

Sisymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo T. five Eruca latifolia Barbarea dicta IB. 2. 862. & Tab. hist. Ic. 1. 843. Barbarea minor Boerhav. *Herbe de St. Barbe*, an denen Gräben, und andern feuchten Orten. *perenn.*

Sisymbrium aquaticum raphani folio, siliqua breviore T. five Rapistrum aquaticum Tab. hist. 1. 792. Wasser-Kresse, oder Hederich, in

in stillstehenden Wasser-Gräben, in der Ruprechtsau, *Raifort sauvage*, *perenn.*

Sisymbrium aquaticum, foliis inprofundas lacinias divisis, siliqua breviore, T. *flore luteo cruciformi* seu Raphanus aquaticus Tab hist. 3. 797. Wasser-Rettich, mit tief eingeschnittenen Blättern, vor dem Fischer-Thor, unten an dem Glacis, an der Jll, oberhalb der grossen Schliesse, *perenn.*

Sisymbrium palustre repens nasturtii foliis T, sive Eruca palustris minor. Tab. hist. 2. 836. *Roquette sauvage*, kleine Wasser-Raucke, aller Orten in feuchtem Grunde, neben, und an denen Wasser-Flüssen. *perenn.*

Smilax unifolia humillima T. sive Unifolium vel Ophris unifolia IB. 3. 534. *flore monopetalo albicante rosaceo, folio nervoso cordato, fructu molli subrotundo*, Ein Blatt, potius Hertz oder 2. Blatt, Ic. Tab. hist. 1134. in denen Hecken, zu Oßwald, im Ostwinckel, auf dem Gebürg, hinter Barr. *perenn.*

Solanum scandens T. sive Dulcamara vel Amara dulcis *Glycipicros*, *IB.* 2. 109. *floribus rosaceis graveolentibus monopetalis cæruleis rotatis; baccis rubris*, Hindsch-Kraut, Ic. Tab. hist. 1290. an denen Wasser gestaden, gegen der grünen Wart, und auf der Gallen-Matt.

Staphylodendron Matthioli T. sive Pistacia sylvestris, *flore albo rosaceo racemo oblongo pendente, foliis fraxini, fructu vesiculari*, Pimpernüßlein-Baum, hin und wieder in der Ruprechtsau, in dem

dem Ganßauer, und Illkircher-Wald. Ic. Tab. hist. 1430. *Nez coupez ou Pistachier sauvage. perenn.*

Stellaria aquatica Vaill. 190. & Lobel. Ic. 792. sive Fœniculum stellatum Tab. hist. 6. 187. *oblongis flosculis dipetalis albis, ex foliorum alis prodeuntibus*, auf der Wiese, beym Rhein Ziegel-Ofen, zu Eckbolsheim in dem Wald, in sumpfichten Orten. *perenn.*

Stellaria minor & repens & fluitans, nostr. seu *Alsine fluviatilis* Tab. hist. Ic. 10. pag. 1090. in feuchten Gruben, bey dem Eckbolsheimer Ziegel-Ofen, neben dem Seiler-Bahn, vor dem weissen Thurn. *perenn.*

Stramonium fructu spinoso, flore albo simplici T. *monopetalo infundibuliformi*, sive Pomum spinosum IB. 3. 624. Stech-Aepfel, *Pome Epineuse*, vor dem Metzger-Thor, lincker Hand, ohnweit dem Wirthshauß zum rothen Ochsen häufig. *perenn.*

Symphytum majus vulgare T. sive Consolida major, *flore purpureo monopetalo infundibuliformi, foliis oblongis hirsutis, radice crassa nigra, semine polito*, Schwartz oder Schmeer-Wurtz, Wallwurtz, Ic. 2. Tab. hist. 949. est Consolida Rivin. *Grande Consoude ou Oreille d'ane*, auf allen feuchten Wiesen. *perenn.*

Symphytum majus, sive Consolida major flore purpureo cœruleo T. *quæ Mas* est Symphytum magnum IB. 3. 593. Wallwurtzel, mit purpur farben Blumen. ibid.

Symphytum majus, flore albo, quæ fæmina T. Wallwurtzel, mit weisen Blumen. *ibid.*

Syringa alba sive Philadelphus Athenæi T. *flore albo rosaceo, fructu turbinato*, wilder Iasmin, Ic. Tab. 1. hist. 1457. in der Ruprechtsau, in denen Hägen und albier in vielen Gärten. *perenn.*

Tamnus racemosa T. *flore minore luteo pallescente monopetalo campaniformi, fructu ovato* sive Bryonia nigra seu lævis racemosa scandens, foliis cordatis splendentibus quæ sylvestris est Lob. Ic. 625. & Tab. hist, 1. 1288. *carot claviculis, hinc non ad Bryoniam pertinet*, est Vitis nigra Matthiol, schwartze Stick Wurtzel, falsche Mechoacana, *Bryone noire, ou faux Mechoacanne.*

Thlaspi vulgatius T. & IB. 2. 921. sive Thlaspi Vaccariæ folio incano majus, flore albo cruciformi, *fructu subrotundo plano*, quod Thlaspi majus est Tabern. hist. 2. 849. gemeiner wilder Bauren-Senf, grose Hirten-Tasche, *Moutarde sauvage*, auf denen Aeckeren, und in denen Weinbergen. *ann.*

Thlaspi arvense siliquis latis T. IB. 2. 923. seu Thlaspi majus Tab. hist. 1. 849. breit Täschel-Kraut, Bauren-Senf, mit breiten Taschen, auf denen Felderen, und Gartners Aeckern. *ann.*

Thlaspi umbellatum arvense amarum IB. 2. 925. Iberidis folio, Tab. hist. 10. 851. bitter Bauren-Senf, zu Holtzheim, auf denen Aeckeren, bey der Capell, auf dem Ottilien-Berg, Rotunda genannt, *ann.*

Thyms

Thymus vulgaris folio latiore T. *flore monopetalo labiato candicante.* Thymian, nostratibus Kümmig, Ic. in Rivin & Tab. hist 2.742. in Gärten, *ann.*

Tilia fœmina folio majore T. *flore rosaceo luteolo, fructu unicapsulari* Linden-Baum, mit breiten Blättern, Ic. 2. Tab. hist. 1396. auf denen Wällen der Stadt, auf der Promenade in der Stadt, und in der Ruprechtsau. *perenn.*

Tilia fœmina, folio minore T. & IB. 1.137. sive *Tilia sylvestris foliis Ulmi*, wilder Linden-Baum, mit kleinen Blättern, Ic. 1. Tab. hist. 1396. *cum præced. perenn.*

Tithymalus latifolius cataputia dictus T. *floribus monopetalis campaniformibus, fructu trigono* sive Esula major Rivini vel Lathyris sive Cataputia minor IB. 3. 880. Spring- oder Treib-Körner, hin und wieder in Gärten. *ann.*

Tithymalus characias folio lanuginoso T. sive Tithymalus Clus. 11. hist. CLXXXVIII. in der Ruprechtsau, gegen dem Rhein zu. *perenn.*

Tithymalus sylvaticus lunato flore T. *folia toto anno retinens*, immer grünende Wolfs-Milch, Ic. Optim Garidel. hist. plant. Tab. 102. & IB. 3.671. in dem Oberehenheimer Wald.

Tragopogon pratense luteum majus T. *flore semi flosculoso fructu papposo, Scorzonere de prez*, Ic. 1. Tab. hist. 994. gelber Bocks-Bart, auf denen Matten zu Oßwald, und auf der Contrescarpe, vor dem weisen Thurn. *ann.*

Tragopogon pratense luteum minus Moris. H R.Bles & T. kleiner Bocks-Bart, auf denen Wiesen, in der Ruprechtsau, *ann.*

Tragoselinum majus umbella candida T. sive Pimpinella saxifraga major hircina IB. 3. part. 2. 109. *umbella candida, floribus albis rosaceis, fructu oblongo striato.* Steinbocks Pimpernell. est Pimpinella Rivin. Ic. 1. Tab. hist. 255. *grande Boucage*, zu Oßwald. *perenn.*

Tragoselinum minus T. sive Saxifraga hircina minima, Pimpinella crispa Tragi IB. 3. part. 2. 113. sive Pimpinella saxifraga minor, *foliis crispis albis rosaceis umbellatis*, Krauß Bocks-Peterlein, Ic. 2. Tab. hist. pag. 255. *petite boucage*, auf dürren Orten, in der Klamm, zu Achenheim, und Mittelhaußbergheim, auf der Gansau. *perenn.*

Trifolium pratense luteum, capitulo Lupuli, seu Agrarium, T. aut Lupulinum Rivini, *flore luteo pupilionaceo majore*, groser gelber Feld oder Wiesen-Klee, auf der Wiesen, zwischen dem Canal, und Eckbolsheimer Wald. *ann.*

Trifolium pratense luteum, capitulo breviore, foliis meliloti, *nostr.* est Trifolium pratense luteum Fuchs, vel Trifolium pratense luteum fæmina, flore pulchriore seu Lupulino, IB. 2. 381. kleiner Wiesen oder Hopfen-Klee, *ann.*

Trifolium montanum purpureum majus T. seu 11. Clus. hist. CCXLV. groser Berg-Klee, mit rothen Blumen / Ic. IB. 2. 375. & in Rivin. auf dem Gebürg, gegen hohen Andlau, *perenn.*

Tri-

Trifolium montanum album T. ſive Trifolium majus Cluſ. hiſt. CCXLV. eſt Anguſtifolium Rivin. groſer Berg-Klee / mit weiſen Blumen, zu Oßwald in denen Hecken, auf dem Gebürg zu Barr, *perenn.*

Trifolium pratenſe album T. *foliis oblongis imis cordatis Ic. 1. Tab. hiſt. 907. & in Rivin.* gemeiner blättrichter Wieſen Klee, *Trefle des prez à fleurs blanches.* auf allen graßichten Orten und Wieſen, *perenn.*

Trifolium pratenſe flore albo minus, & ſemine glabrum T. *foliis ſubrotundis maculatis floribus ſuaveolentibus, & IB. 2. 280.* wohlriechender Wieſen-Klee, auf der Metzgerau und Schießrein. *perenn.*

Trifolium pratenſe album inodorum, folio ſubrotundo non maculato, *noſtr.* kleiner weiſer Weg-Klee, ohne Geruch, und ohne gefleckte Blätter. ibid *perenn.*

Trifolium pratenſe purpureum T. Ic. ſive Trifolium purpureum vulgare IB. 2. 374. Tab. hiſt. 2. 908. & in Rivin. brauner Wieſen-Klee, *Trefle á fleur rouge, perenn.*

Trifolium ſpica ſubrotundo rubra T. ſive Lagopus maximus IB. 2. 376. groſer Haſen-Klee, *Pied de Lievre,* bey dem Ganßauer Wald. *perenn.*

Hrifolium majus purpureum, foliis longioribus & anguſtioribus, ſpica longa rubicundiore, Ray. ſynops, groſer Wieſen-Klee, mit langen ſattrothen Blumen, *Eſpercette.* bey der Taback-Mühl, auf dem Schießrein.

Turritis T. *flore cruciformi, fructu siliquoso*, & *Lobel. Ic.* 220. seu *Turritis vulgatior*, *IB.* 2. 836. & *Tab. hist.* 849. Thurn-Kraut, in der Ruprechts-au, in dem XV. Wört am Rhein, auf dem Gebürg bey Wassenburg, hinter Oberbronn. *perenn.*

Turritis minor T. Bot. Monsp. sive Barbarea muralis IB. 2. 869. kleiner Mauer oder Berg-Kresse, auf steinichten Aeckern, unten am Hoch-gebürg, Hochfelden, *ann.*

Turritis petræa seu Saxatilis, foliis imis hirsutis asperis ac sinuatis, per humum sparsis, flosculis cruciformibus ex pallide cœruleo albicantibus, Stein oder Mauer Leucojen Ic. opt. vid. Tournef. Alsat. pag. 132. an der Mauer, einer verwüsten Capell, auf dem Gebürg St. Ottiliæ, ingleichen auf dem alten Berg-Schloß, Wassenburg zu Oberbronn. *perenn.*

Typha palustris major T. *floribus apetalis exiguis, folio triangulo*, grose Liesch oder Narren Kolben, *Ic. Tab. hist.* 558. *grande Masse* in allen Gräben der Stadt, *perenn.*

Typha palustris minor T. IB. 2. 540. klein Narren oder Rohr-Kolben, Ic. 2. Tab. hist. 559. in dem XV. Wört, an der grosen Rheinbruck.

Typha palustris clava gracili T. seu media IB. 2. 540. lange schmahle Narren oder Wasser-Kolben, neben dem Canal, bey der ersten Schliese, in der Tieffe, *perenn.*

Veronica Mas supina & vulgatissima T. sive Veronica vulgatior folio rotundiore IB. 3. 282. est Veronica officinarum serpens, folio rotun-

rotundiore serrato, *flore monopetalo dilute cœruleo rotato fructu membranaceo, Veronique mâle Ic. 1. Tab. hist.* 772. gemeiner Ehrenpreiß, Männlein, in Wäldern, und andern heckichten Oertern, auf der Schlut, bey allen Lüften, in dem Brumbter Wald. *perenn.*

Veronica spicata minor T. seu recta minor IB. 3. 282. vel recta minima, Clus. hist. 347. Ic. Tab. hist. 6. 773. kleiner aufrechtstehender Ehrenpreiß, auf dürren Wiesen, gegen Oßwald, auf der Metzgerau. *perenn.*

Veronica pratensis serpillifolia T. quæ repens minima Rivini, seu Betonica Pauli serpillifolia *IB.* 3. 285. *flore ex purpureo candido monopetalo rotato*, klein Wiesen Ehrenpreiß, kleiner Ehrenpreiß Weiblein, *Ic. 2. & Tab. hist.* 773. *perenn.*

Veronica minor, foliis imis rotundioribus T. sive Chamædrys, spuria minor rotundifolia latifolia IB. 3. 286. quod Teucrium pratense supinum & spurium chamædryoides *Lob. Ic.* 490. falsch Wiesen Gamenderlein, wilder Ehrenpreiß, mit runden Blättern, vor dem Metzger-Thor, auf feuchten Wiesen, am Weg, nach der Spital-Mühl, an dem Weg nach der Schleif-Mühl. *perenn.*

Veronica supina Teucrii facie T. & Lobel. Ic. 473. sive Chamædrys spuria angustifolia *IB.* 3. 285. wilder Ehrenpreiß, mit schmahlen Blättern, *Ic. 2. Tab. hist.* 771. auf der Metzgerau, in der Ruprechtsau, auf der Elisabethen oder Elsbeten Wall. *perenn.*

Veronica major frutescens, sive Teucrium IV. Clus. hist. 349. groser wilder Ehrenpreiß, mit breiten Blättern, est Veronica montana Rivin. auf denen Berglein, bey Niederhaußberg, neben denen Aeckern, zwischen Brumbt und Hagenau. *perenn.*

Viburnum T. sive Lantana IB. 1. 557. *flore albo monopetalo rotato, foliis crassioribus incanis parumper serratis, fructu globoso molli, Viorne Ic. Tab. hist.* 1. 461. kleiner Mehl oder Schlingbaum, auf dem Haulenberg, zu Illkirch in dem Wald, zu Oßwald, *perenn.*

Vicia sativa vulgaris semine nigro T. sive angustifolia *Rivin. flore purpureo papilionaceo, fructu siliquoso*, Feld oder Vogel-Wicken, Tauben-Wicke, auf denen Frucht-Aeckern, *ann.*

Vicia sativa vulgaris alba T. Vogel-Wicke, mit weisen Körnern, ibid. *ann.*

Vicia maxima dumetorum T. sive Cracca major *Tab. hist. Ic.* 2. 892. quæ Vicia sepium Rivin. *Vesse sauvage*, grose Wald-Wicke, Zaun-Wicke, in allen grasichten Büschen und Orten, *ann.*

Vicia multiflora T. sive *perennis, cæruleo spicato flore*, est Aracus *Tab. hist.* 891. seu Cracca Rivin. Vogels-Wicke, mit vielen Blumen, von satt blauer Farbe. *perenn.*

Vicia segetum cum T. *singularibus siliquis glabris brevibus*, Cracca minor siliquis gemellis, Flor. Jen. kleine Wicke, mit glatten Schoten, auf denen Feldern, bey Ober und Niederhaußbergen, *ann.*

Vicia

Vicia segetum, cum siliquis plurimis hirsutis T. & IB. 2. 315. *flosculis ex albo purpureis famine maculato* quæ Cracca minor Rivin *Ic. 3. Tab. hist.* kleine Feld-Wicke, mit vielen rauchen Schotten, unter dem Getreide bey Illkirch. *ann. Vesseron.*

Vicia segetum singularibus siliquis glabris T. Wicke, mit einzeln blauen Blümlein und Schoten, an den Pulver-Magezin, zwischen dem Steinstrasser und Cronenburger Wall, auf denen Aeckern, zwischen Lingelsheim und Ensißheim, *ann.*

Viola martia arborescens purpurea T. *flore polypetalo anomalo*, sive Iacea tricolor surrectis caulibus, arborea quibusdam dicta *IB.* 3. 547. blasse blaue Berg-Violen, Ic. Tab. hist. 681. & Garidel Hist. plant. Tab. 99. in dem Gebürg, bey hohen Andlau, in dem Hanßauer Wald, *perenn.*

Vitis Idæa foliis oblongis crenatis, *fructu nigricante molli, flore albo monopetalo campaniformi pendulo*, sive Vitis Idæa. angulosa *IB.* 1. 520. vel Myrtillus, *Tab. hist.* 1487. est Vaccinium Rivin Heidelbeer-Staude, mit schwartzer Frucht, *Myrtile* auf dem Barren Gebürg, *perenn.*

Vitis Idea foliis oblongis crenatis, fructu albo Mapp. hist. 334. weise Heidelbeeren Staude, auf dem Gebürg gegen Wangenburg, und zu Niedeck, oberhalb dem Berg-Schloß. *perenn.*

Vitis Idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris, T. sive Vitis Idæa semper virens, fructu rubro *IB.* 1. 522. Vaccinia rubra Lobel.

Ic.

*Ic.tom.*2.109. Steinbeer oder rothe Preißelbeeren, auf dem Ottilien Berg, auf dem Hochgebürg Hochfelden häufig, *Cousines rouges. perenn.*

MENSIS
JUNIUS ET JULIUS.

Acetosa rotundifolia hortensis T. *repens folio succulento pallide virente, floribus apetalis stamineis semine triangulari Ic. 3. Tab. hist.* 826. Garten-Ampfer, *Ozeille ronde, perenn.*

Acetosa rotundifolia alpina T. fol. asari rund blättrichter Berg Ampfer, an denen Felsen und Steinritzen, bey der schwartzen See, oberhalb Peris. *perenn.*

Acetosa lanceolata elatior, angustifolia Moris hist. Oxon. part. 2. 583. ubi Icon. auf dem St. Ottilien Berg, auf dem Gebürg zu Wassenburg, *perenn.*

Aconitum lycoctonum luteum T. *flore polypetalo anomalo* sive Napellus flore luteo anomalo Ic. in Rivin & in H. Eyst. gelbe Narren-Kappen, oder Eisenhütlein, Gift-Kraut, Tue Loup. ou, *Aconite à fleur jeaune*, in dem Münster-Thal, in dessen feuchten Thälern, an dem Felsen, bey Befort.

Agaricus intybaceus T. sive Fungus fimbriatus, & pulchre cristatus edulis nostr. est Fungus intybaceus *IB.* 3. 839. Eich-Schwamm, Fette Henne, in dunckelen Eich-Wäldern, unten an denen Stämmen.

Agari-


p. 109.
Tab. IV.
Alcea fol. rotund. laciniat.
G. Striedbeck sculp.

Agaricus varii coloris squamosus T. sive Fungus cerasorum imbricatim alter alteri innatus variegatus, CBp. Ic. Clus hist. gen. V. pernicios. fungor. CCLXXVII. Kirschen-Schwamm, mit mancherley Farben, an denen alten Kirschbäumen.

Agaricus fraxineus niger, durus orbicularis T. Eschen-Schwamm, an alten Esch-Stämmen, und auch Eichbäumen, in dem Illkircher und Ganßauer-Wald.

Agrimonia officinarum T. Agrimonia seu Eupatorium *IB. 2. 398. flosculis luteis rosaceis spicatis, radice nigra, fructu hirsuto oblongo echinato, caule hirsuto, folio serrato fisso*, Odermennig, *Aigremoine Ic. Tab. hist.* 330. in denen Hecken, aller Orten, *perenn.*

Alcea majore & procerior T. & *Ray hist.* 605. *flore monopetalo campaniformi rosaceo foliis dissectis*, hoch aufgeschossen Sigmars-Kraut, hin und wieder an denen Rändern der Wälder, in den Gansauer Wald, am Wasser. *perenn.*

Alcea vulgaris major T. seu Alcea vulgaris *IB.* 2. 953. Sigmars-Kraut, Fellriß, *Alcée ou Mauve sauvage Ic.* 1. *Tab. hist.* 1155. in der Ruprechtsau, vor dem weisen Thurn, auf der Contrescarpe, *perenn.*

Alcea foliis rotundis laciniatis T. sive Malva vulgaris erecta, foliis imis rotundioribus parum crenatis, superioribus profunde dissectis nob. quæ Alcea fruticans HEyst. Ic. vid. Tab. nostr. IV. Fellriß, dessen unterste Blätter rund sind, in dem

Illkir-

Jülkircher Wald, und auf der Contrescarpe am weisen Thurn, *perenn.*

Alchimilla vulgaris T. Pes Leonis sive Alchimilla *IB.* 2. 598. *folio rotundo crenato, floribus sublutеis apetalis hirsutis verticillatis*, Sinau, unser lieben Frauen Mantel, *Ic. Tab. hist. pag.* 249. auf denen Wiesen, bey Oßwald, auf dem Hausken Berg. *perenn.*

Alchimilla supina gramineo folio, flore minore T. sive Polygonum minus 111. Dodon. aut tenuifolium *IB.* 3. 377. Polygonum minus polycarpum, *Tab. hist. Ic.* 5. 1215. Johannis Blut, mit grünen Blümlein, auf dürren Aeckern häufig, zwischen der Frucht, *ann.*

Alga fontalis trichodes, vel Trichomanes aquaticum Lugdunens. 1023. est Muscus longissimus aquaticus capillaceo folio T. im Rheingiesen, in denen Quellwässerlein, *quo jure vero Tournefort hanc algam Muscis admiscuerit, pariter cum Rupp. in flora Ienensi non capimus, quem & sequutus est Do. Mappus* in sua hist. pag. 203. *qui tamen hanc plantam duplici nomine insignitus est, vid. ejus pag.* 12.

Alga viridis capilllaceo folio T. sive Conferva Plin. Lob. Ic. 257. est Alga vulgatissima & longissima Rupp. flor. Ien. 308 Moß Graß, Wasser-Graß, in allen stillstehenden Pfudeln, und andern Wasserbächen.

Alga tenuioribus filamentis & instar capillarium vasorum divisis segmentis Rupp. Flor. Ien. 308. sive Trichomanes aquaticum Dalechamp.

in

in denen Gräben, gegen der Pulver-Mühl, hinter dem Becken-Wäldlein, wie auch in dem Rheingiesen.

Alga bombycina CBp. & Prodr. 155. seu Conserva reticulata Dillen 199. Kasten oder Brunnen-Mooß, in stillstehenden Wasser-Pfützen, an denen Brunnenstein.

Allium montanum angustioribus foliis, caule maculato T. *flore albo liliaceo caule maculato radice cepacea oblonga capillosa* & Hort. Eyst. *ic. Tab. hist.* 875. sive Victorialis longa Clus. 189. Allermans Harnisch, Berg oder Schlangen-Knoblauch/ mit schmahlen Blättern, bey der Seegmühl, hinter Otterott, in denen Hägen, an dem Weg, oberhalb Mittelbergen. *perenn.*

Allium montanum capite rotundo T. Allium sphærocephalum purpureum sylvestre *IB.* 2. 562. Allium seu Moly montanum V. Clus. hist. 193. *Ail sauvage*, Berg-Knoblauch, in denen Feldern, bey Oßwald, hinter dem Bruckhof, bey dem Gartners Aeckern. *perenn.*

Alsine plantaginis fol. *IB.* 3. 363. & Chabræi 450. *floribus rosaceis albis, fructu subrotundo*, zu Baar, an denen alten Weiden-Bäumen, zu Oberbronn in feuchten Orten des Bergs.

Alsine altissima nemorum T. *seu major. IB.* 3. 362. *repens perennis floribus rosaceis amplioribus albis*, groß Vogel-Kraut, groser Wald Hüner-darm *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1086. in feuchten Hecken und Büschen, an dem Eckbolsheimer Wald, am Canal. *perenn.*

Alsine

Alsine aquatica media T. sive longifolia, uliginosis locis proveniens, quæ Fontana est *Tab. hist. Ic.* 8. *pag.* 1089. Brunnen Vogel-Kraut, Meyerich, zu Oberbronn, unter denen Bäumen/ im Gebürg, wo das Wasser immerzu abläufft. *perenn.*

Alsine hyperici folio Vaill. Hünerdarm, mit dem St. Johannis-Kraut Blatt, auf dem Paßberg, zu Buchsweyler, und Oberbronner Gebürg. *perenn.*

Duas has species Dn. Mappus pag. 16. & Dn. Dr. Haller, pag. 385. *cum Vaillantio conjunxit, cum tamen foliorum ratione, quam maxime interse differunt, quasque etiam pro diversis, speciebus Tournefort in Inst. RH.* 242. & 243. *recenset.*

Alsine spergulæ facie minima seminibus nudis T. auf kleinen Hügeln bey Gemar.

Alsine minor multicaulis T. sive Alsine minima *IB.* 3. 364. *Ic. Tab. hist.* 4. *pag.* 1087. kleiner Hünerdarm, mit vielen Stengeln, auf sandigen Boden aller Orten, *ann.*

Alsine minor capitulis lini CB. & Boerhav. sive Petræa minima *Tab. hist. Ic.* 3. 1088. klein Stein-Vogel-Kraut, auf steinigten Aeckern, zwischen denen Steinritzten, auf der Mauer am Graben, zwischen dem Steinstrasser und Spirer Thor. *ann.*

Alsine spergulæ facie minor, sive Spergula minor, flosculo sub cæruleo T. *rosaceo foliis tenuissimis, circa geniculum positis* seu Spergula purpurea *IB.* 3. 722. *Ic. Tournef. alsat. Tab. IV.* klein Spergel-Kraut, mit bläulichten Blumen, auf der

der Insul, wo die Preusch in die Ill fält. *ann.*

Alsine saxatilis & multiflora capillaceo fol. T. quæ Auricula muris, pulchro flore, folio tenuissimo *IB.* 3. 360. *Ic.* elegans Vaill. *Tab.* 2. *fig.* 3. zwischen denen Ritzen der Felsen, des Männleinsteins, bey dem St. Ottilien Gebürg. *ann.*

Alsine tenuifolia muscosa T. seu Alsine muscosa, Lugdun 1235. & *IB.* 3. 365. auf feuchten Aeckern bey Illkirch, welche unter Wasser gestanden.

Alsine maxima solanifolia T. *foliis cordatis, & undulatis*, Wald-Hünerdarm, mit breiten hertzförmigen Blättern, in dem Oberehenheimer Wald, auf dem Gebürg, St. Ottiliæ, *perenn.*

Alsine arenaria dicta Vaill. pag. 7. *flosculis albis rosaceis foliis tenuissimis*, est Arenaria *IB.* 3. 723. auf einer feuchten Wiese, oberhalb der Schiffmatt, bey dem Eckbolsheimer Ziegelofen, an denen Gräben, auf den Aeckern, nahe am Wirthshäusel, zwischen Lingelsheim und Ensisheim. *ann.*

Alsine palustris, folio gramineo angustiore, Dillen. vor dem Spithal-Thor, unten an dem Glacis, in der Ruprechtsau, in feuchten Gräblein.

Alyssum fœtidum T. *flosculis cruciformibus pallide luteis, foliis glasti, pallide virentibus auriculatis, capsula orbiculata*, stinckender Lein- oder Flachs-Dotter, Ic. Tournef. Alsat. *sub nomin.* Myagr. fœtid. pag. 94. in denen Gräben, an der Landstrasse, zwischen Lingels- und Ensisheim, bey Oswald. *Myagrum puant*, *ann.*

Alyssum segetum, foliis auriculatis acutis, T. flore & semine majore, est Myagrum sylvestre Zwing. vid. Ic. p. 434. aut Myagrum 1. Tab. hist. vel Turcium *IB.* 2. 893. Lein oder Flachs-Dotter, in denen Flachs-Stückern. *ann.*

Alyssum serpillifolium, flosculis albis cruciformibus, capsula bipartita, radicula tenui filamentosa, gar kleiner Lein-Dotter, in denen Reben, zu Oberbronn, *ann. vid. Tab. nostr. V.*

Anblatum flore è rufo candicante T. sive Anblatum Cordi hist. 89. est Squamaria Rivin. *Ic. Tab. hist.* 1231. Ohnblatt, Schuppen Wurtz, in dunckeln bergichten Wäldern, in dem Rhein-Wört, zwischen denen Wurtzeln der Bäume, *perenn.*

Angelica pratensis altera apii folio T. quæ Angelica tenuifolia est Rivin. auf denen Wiesen, hinter dem Spithal-Garten, auf der Contrescarpe, vor dem Steinstrasser-Thor, rechter Hand. *Tab. hist.* est Hippomarathum 2. 161. *perenn.*

Angelica sylvestris minor, sive erratica T. vel repens *IB.* 3. *part.* 2. 145. *floribus rosaceis umbellatis albis, foliis latioribus atro virentibus, semine oblongo striato,* sive Herba Gerardi *Tab. hist. pag.* 243 est Podagraria Rivin. kleine wilde Angelica oder Geißfuß, hin und wieder in dem Zäunen, *perenn.*

Anonis spinosa T. sive Resta bovis vulgaris purpurea *IB.* 2. 395. *trifolia, flore purpu-*

reo simplici papilionaceo, radice longa alba fructu siliquoso brevi, Arete beuf Hauhechel, Stall-Kraut, *Ic. Tab. hist.* 913. & *Rivin.* aller Orten, auf dürren Heyden, bey allen Lüften häufig, *perenn.*

Anonis spinosa flore albo T. & *IB.* 2. 395. Hauhechel, mit weisen Blumen, *Ic. Tab. hist.* 2. 913. *perenn.* bey der hohen Wart, zu Illkirch, an denen Aeckern. *perenn.*

Anonis spinosa fruticosa erecta, flore purpureo, Vaill. sive Anonis Hort. Eyst. Tab. 263. neben dem Canal, und zu Oßwald. *perenn.*

Anonis spinis carens purpurea T. sive Anonis non spinosa purpureo flore *IB.* 2. 393. *Ic. Tab. hist.* 3. *pag.* 913. Hauhechel ohne Stacheln, an denen Rändern der Frucht-Aecker zu Illkirch, in dem Wald, zu Oberbronn, an dem breiten Weg, in der Luß, copiose, *Arete beuf, sans epines. perenn.*

Aparine vulgaris semine minori T. duro, *flore albo cruciformi, fructu semine globulari, caule quadrangulo, fructu lævi,* Kleb-Kraut, mit kleiner Frucht, *Ic. Vaill. Tab. IV. fig.* 3. in der Ruprechtsau, auf denen Linsen-Feldern. *perenn.*

Asparagus sativa T. *foliis Anethi, flosculis luteis rosaceis divisis, baccis, rubris, radice squamosa alba* Spargen, *Asperge Ic. Tab. hist.* 414. in Gärten, und Gärtners-Feldern. *perenn.*

Asparagus sylvestris, tenuissimo folio T. florib. rosac. seu Asparagus sylvestris, Matthioli Epit. 260. Turionibus amaris, non dulcibus, uti Mappus existimat, wilde Spargen, auf dem Glacis, *Asperge sauvage*, auf dem Glacis, vor dem Juden-Thor, zu Illkirch, in denen Hecken, in horto medico. *perenn.*

Asplenium sive Ceterach T. *foliis pulchre sinuatis*, klein Miltz-Kraut / Stein-Farren, *Ic. Tab. hist.* 1191. in dem Niedecker-Thal, hinter Haßlach, in Ritzen rauher Felßen, *perenn.*

After montanus luteus, salicis glabro folio T. sive Bubonium luteum, *Tab. hist.* 2. 716. gelb Bergstern-Kraut, mit weyden ähnlichen Blättern, zu Oßwald im Ostwinckel, in denen Hecken häufig. *perenn.*

After omnium maximus, Helenium dictus, sive Helenium vulgare, seu Enula Campana *IB.* 3. 108. *flore luteo radiato, folio integro lato in cano semine papposo*, Alant-Wurtzel, *Aunée ou Enule Ic. Tab. hist.* 953. auf der Wiesen zu Hochfeld, und Ringendorf häufig. *perenn.*

After palustris luteus laciniatus T. seu altissimus sauveolens, *foliis dissectis serratis, floribus luteis radiatis*, sive Conyza helenitis, foliis laciniatis, Lob. Ic. 347. Wasser Wund-Kraut, in denen Gräben um die Stadt, zwischen den Rohren. *perenn.*

After arvensis cœruleus acris T. sive Conyza cœrulea *IB.* 2. 1043. scharfe kleine Dürr-Wurtzel, oder Beruf-Kraut, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1244.

hin

hin und wieder an dürren Orten, in der Ruprechtsau, *ann.*

Astragalus luteus perennis procumbens T. sive *Glycirrhiza sylvestris, floribus luteo pallescentibus papilionaceis, fructu siliquoso bicapsulari,* est Fœnum græcum sylvestre IB. 2. 330. wilder fœnum grœcum, Stein-Wicke, Gliedweich, beym Schnackenloch, und St. Gallen, auf dem Glacis, vor dem weisen Thurn-Thor, *Fœnugréc sauvage. perenn.*

Astragalus luteus perennis, siliqua gemella rotunda, Vesicam referente, T. sive Cicer sylvestre multifolium *IB. 2. 294. Tab. hist. Ic. 2. 885.* est Glaux Rivin. wilde Ziser-Erbsen, auf denen Wiesen, in der Wantzenau, an denen Furchen der Aecker, bey Ehrstein, *Pois chiches sauvages ann.*

Astragalus flore viciæ, dilute purpurascente Moris hist. Ox. part. 2. 106. *seu Onobrychis subcæruleo flore IB. 2. 337.* quæ Onobrychis II. Clus. hist. CCXXXIX. wild Süß-Holtz, mit blauen Blumen, *rarissimi apud nos ejus proventus est, invenitur quandoque,* auf der Metzgerau beym alten Schießberg. *perenn.*

Astrantia major, corona floris purpurascente T. radice nigra, acri sive Astrantia Riv. *Ic. Tab. 67. optim. Icon. vide,* Hort. Eyst. schwartzer Sanickel, schwartze Meisterwurtz, auf dem Hochgebürg Hochfelden, auf dem Hallen Berg, per me luxuriat. *perenn.*

Avena vulgaris alba T. *floribus apetalis gramineis, fructu oblongo*, weiser oder gemeiner Habern, *Avoine blanche*, Ic. Tab. hist. 642. auf denen Saamen Feldern, *ann.*

Avena nigra T. schwartzer Habern. ibid.

Ballote T. sive Marrubium nigrum fœtidum IB. 3. 318. quod Marrubiastrum *Tab. hist.* 926. & Rivin, *flore monopetalo verticillato labiato purpureo, fructu quinquepartito, semine oblongo*, stinckender schwartzer Andorn, *Marrube noir puant*, an denen Garten-Zäunen, hin und wieder vor dem Fischer-Thor.

Ballote flore albo T. weiser stinckender Andorn, *rarissime occurrit, prioris est varietas, invenitur tamen quandoque cum praecedente.*

Balsamina lutea, sive *Noli me tangere* T. & IB. 2. 908. *flore pendulo polypetalo patulo luteo, folio oblongo latiusculo, fructu tumido acuminato* vel Impatiens Rivin. Spring-Kraut, Ic. *Tab. hist.* 1254. in denen Wörten bey Jllkirch, zu Mutzig an dem Bach.

Barba capræ floribus oblongis albis rosaceis T. *oblongo semine* sive Barba capri *IB.* 3. 488. aut *Drymopogon. Tab. hist. Ic.* 1163. Geiß-Bart, mit langen flockichten Blumen, auf einer feuchten Wiese, zwischen dem Mauerhof und Oßwalder Schlut, an dem Brückel.

Belladona majoribus foliis & floribus T. *fructu globulari molli*, multis *Solanum Maniacum* IB. 3. 611. *floribus monopetalis campaniformibus, fructu globoso nigricante molli*, Toll oder Wuthbeeren Kraut, wild

wild Wald Nachtschatten, *Ic. Tab. hist.* 977. auf dem Lützelsteiner Gebürg, *perenn.*

Beta alba vel pallescens quæ Sicla officinar. T. *radice fibrosa, floribus stamineis, folio latiori costa spissa, fructu globoso,* Mangold, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 814. *Poire blanche*, in Gärten, und Gartens Feldern. *ann.*

Beta rubra radice rapæ T. rothe Rube oder Möhre, *Betterave Ic.* 3. *Tab. hist.* 814. ibid. *ann.*

Betonica purpurea T. *flore monopetalo labiato, semine oblongo*, braune Betonien, *Betoine Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 931. in Rivin. auf denen Wiesen, und in denen Hecken, zu Oßwald, *perenn.*

Eadem flore albo ibid. *sed rarius.*

Brassica campestris perfoliata, flore albo cruciformi T. & Clus. hist. CXXVII. seu *Perfoliata siliquosa IB.* 2. 835. & *Tab. hist.* 2. 1140. Feld-Kohl, Durchwachs, mit Steckruben Blättern, fast auf allen Kraut-Aeckern.

Brunella folio laciniato T. *flore monopetalo labiato purpureo, semine subrotundo*, Brunellen, mit zerschnittenen Blättern, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 2. 943. & in Rivin *perenn.* in dem Hansauer Wald häufig.

Brunella folio laciniato flore albo T. *frutex non vulgaris*, 2. *Clus hist. pag.* XLIII. Brunellen, mit eingeschnittenen Blättern, und weissen Blumen, auf der Lingels- und Oßwalder Nachtweide häufig.

Brunella major folio non dissecto T. sive Brunella flore minore vulgaris *IB.* 3. 428. *flore pur-*

purpurascente, grose Brunellen, mit gantzen Blättern, und purpur-rothen Blumen, *Ic. Rivin.* an denen Zäuhen, gegen dem Schnackenloch, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Brunella major folio non dissecto, flore albo T. grose Brunellen, mit weisen Blumen, *rarissimi est proventus.*

Brunella, coeruleo magno flore T. *folio integro* sive *Brunella*, *Clus. hist.* XLIII. est Brunella flore magno, folio non laciniato *IB.* 3. 429. blaue grosse Brunellen, mit gantzen Blättern, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 944. & *in Rivin.* sub nomine Brunella majore flore, in dem Illkircher Wald, nahe an denen Aeckern, auf der Oswalder Nachtwend, *perenn.*

Buglossum angustifolium majus T. seu vulgare majus *IB.* 3. 578. *flore caeruleo monopetalo infundibuliformi*, *semine viperini capitis aemulo*, grosse wilde Ochsen Zung, mit blauen Blumen, *Ic. Tab. hist.* 803. auf dem Glacis, vor dem Cronenburger-Thor, in dem XV. Wört, *Buglosse sauvage perenn.*

Buglossum angustifolium majus *flore albo* T. sive *Buglossum Italicum* Hort. Eyst. grose schmahle blättrichte Ochsen-Zung, mit weisen Blumen, auf denen Matten, im Urbis-Thal.

Buglossoides Echii folio hirsuto, floribus minoribus eleganter coeruleis nostr. quod Buglossum sylvestre minus CB. est Echium Fuchsii pag. 269. vel Echioides flore coeruleo Rivin. wilde kleine Ochsen-Zung, mit Himmel blauen

Blu-

Blumen, hin und wieder neben den Aeckern, gegen Oßwald, in der Seiler-Bahn zu Hört, wie auch nahe an dem Wald, zu Sultz häufig, vor dem Thor in einer Gruben, *petite buglosse. ann.*

Buglossum arvense annuum, lithospermi folio T. *radice rubra, flore albo monopetalo infundibuliformi* seu Lithospermum arvense nigrum, flore albo, semine Echii, *IB.* 2. 592. est Echioides, flore albo, Rivin, wilder kleiner Meer-Hirse, kleine Ochsen-Zung, mit weisen Blumen, und röthlichter Wurtzel, aller Orten, auf denen besamten Feldern.

Bupleurum montanum latifolium T. sive Perfoliata longifol. Dalechamp. Lugd. pag. 1321. non bene, melior Ic. sub nomine Perfoliatæ montanæ Thalii. Hort. fig. XXXVIII. zwischen denen Steinen beym Sultzbad. *perenn.*

Butomus flore roseo T. sive Iuncus floridus major paludosus, *IB.* 2. 524. *floribus sub purpureis, folio graminea triangulo, semine oblongo, Ic. 6. Tab. bist.* 567. Cyper oder purpur Schwertel, in denen Gräben, vor dem Spital-Thor, an der Straß. *ann.*

Cacalia foliis crassis hirsutis T. sive Cacalia quibusdam *IB.* 3. 569. *flosculis flosculosis purpurascentibus, semine papposo,* sive Cacalia incano folio, Clus. hist. CXV. Wald Roßhub, mit dicken haarichten Blättern, in dem Gebürg, hinter dem klingen Thal, bey der Eisenhütte. *perenn.*

Cacalia tomentosa T. *foliis magnis subrotundis, floribus subpurpureis flosculosis*, grose Wald Roßhub, mit wollichten weiß grauen Blättern, *Pied de Cheval* in dem Oberehenheimer und Barrer Gebürg. *perenn.*

Calceolus Marianus T. *flore luteo polypetalo anomalo, folio latiore nervoso fructu fenestrato*, rothe Marien-Schühlein, Endlein, Meyen-Schellen, Sabot ou *Soulier de nostre Dame Ic. Hort. Eyst.* & *Garidel, Tab.* 17. est Damasonii species sive Calceolus divæ Mariæ *IB*.3.518. zwischen Dorlisheim und Mutzig, auf kleinen Berglein häufig. *perenn.*

Campanula arvensis erecta T. Viola Pentagonia, *Tab. hist. Ic.* 683. *flore cæruleo moncpetalo, campaniformi*, *Doucette*, Frauen-Spiegel, mit schönen Viol blauen Blumen, in denen Frucht-Feldern in der Ruprechtsau, neben dem Jesuiter Garten, ingleichen um Höhnheim, *ann.*

Campanula arvensis erecta flore albo T. Frauen Spiegel, mit weisen Blumen, in der Frucht gegen Haußbergen, *ann.*

Campanula nemorosa angustifolia, magno flore major, T. sive *Rapunculus nemorosus Tab. hist. Ic.* 6. 795. Wald Rapuntzel, mit grosen Glocken, gegen Oßwald, unter den Wachholder Stauden, auf dem Gebürg gegen Mutzig. *perenn.*

Campanula nemorosa angustifolia, magno flore minor T. seu Rapunculus nemorosus parvo flore *Ic.* 7. *Tab. hist.* 794. kleine Waldglöcklein, mit sehr schmahlen Blättern, vor dem Ganßauer Wald. *perenn.* Cam-

Campanula nemorosa angustifolia, parvo flore major T. sive Ranunculus nemorosus angustifolius, parvo flore 3. *Tab. hist.* 794. kleine Waldglöcklein, mit sehr schmahlen Blättern, vor dem Ganßauer Wald. *perenn.*

Campanula persicæ folio T. seu Campanula angustifolia cœrulea *IB.* 2. 803. *Ic. Clus. hist.* CLXXI. *flore magno cæruleo, folio angusto atque oblongo parum crenato, radice lactescente. Ic. Tab. hist.* 2. *pag.* 699. Waldglöcklein, mit grosen blauen Blumen, und Pfersich ähnlichen Blättern, hinter Barr, auf denen Bergmatten, auf dem Gebürg, bey Waßenburg, und auf dem Haulenberg. *perenn.*

Campanula persicæ folio flore albo T. seu Campanula *angustifolia alba IB.* 2. 803. Waldglöcklein, mit weisen Blumen, im Reichstätter Wald, auf dem Haulenberg. *perenn.*

Campanula hortensis rapunculi radice T. *repente, flore minore cæruleo, Ic. IB.* 2. 806. wilde Milchglöcklein, auf Wiesen, zwischen Lingelsheim und Oßwald. *perenn.*

Campanula minor vulgaris rotundifolia T. sive Campanula minor, rotundioribus imis foliis Clus. hist. CLXXIII. blaue Wiesen, oder Puschglöcklein, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 794. überall an abhangenden grasichten Orten, und auf denen Wällen der Stadt, *perenn.*

Caryophyllata alpina lutea T. seu Caryophyllata montana, flore luteo magno, *fructu globoso, semine caudato, Ic. IB.* 2. 398. Benedicten

Wurtzel, mit grosen gelben Blumen, auf Berg Wiesen, hinter Rappolsweiler. *perenn.*

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius T. *fructu cylindraceo flore, caryophyllæo rubro simplici* seu Vulgatissimus *IB.* 3, 334. sive Caryophyllus montanus 1. *Tab. hist. Ic.* 12. 668. *Oillet rouge sauvage*, rothe Feld-Negelein, wilde Graß-Blümlein, auf denen Wiesen, bey dem Canal, und sonst andern grasichten Orten, *perenn.*

Caryophyllus sylvestris prolifer T. *floribus fasciculatis*, sive Armeria prolifera, seu Betonica coronaria squamosa sylvestris, *IB.* 3. 335. allerwegen, auf dürren grasichten Orten, auf der Wiese, bey der grünen Wart. *perenn.*

Caryophyllus sylvestris vulgaris angustifolius T. sive Caryophyllus montanus albus 11. *Tab. hist.* 668. Donner-Nägelein, mit weisen Blumen/ zu Mutzig auf Hügeln, rarissime occurrit.

Caryophyllus sylvestris humilis, flore unico T. *rubello, radice longa tenui fibrosa*, sive Betonica coronaria, aut *Caryophyllæa repens rubra, IB.* 3. 328. est Caryophyllus sylvestris 1. Clus. hist. pag. 282. Donner-Nägelein, mit einzeln Blumen, auf der Contrescarpe, lincker Hand, am weisen Thurn, vor dem Ganßauer Wald, auf dürren sandigen Boden. *perenn.*

Caryophyllus flore tenuissime dissecto T. sive Superba alba, medio corolla purpuro violacea obsoleta cincta, Lobel. Ic. 450. sive Caryophyllæa superba elatior vulgaris *IB.* 3.

330.

330. *Mignardise*, wilde Feld-Nägelein, Muthwillen, in dem Gansauer Wald, auf Wiesen, wo die Preusch in die Ill fält.

Caryophyllus sylvestris, floribus lanuginosis hirsutis candidis T. *sine corniculis*, seu Betonica minus ramosa coronaria *IB*. 3. 332. auf Brach-Aeckern bey Ehrstein. *ann.*

Caryophyllus barbatus sylvestris T. seu Viola barbata angustifolia Dalechamp. *IB*. 3. 335. unter den Bäumen, auf der Lingelsheimer Nachtweyd, auf Matten, bey Oßwald. *perenn.*

Cataria major vulgaris T. sive *Nepeta officinarum* Mentha Cataria *IB*. 3. *part*. 2. 225. *est Nepeta major Rivini, flore monopetalo labiato, foliis canescentibus, odore acri aromatico semine, subrotundo*, Katzen-Nept, Katzen-Müntz / *Herbe aux chats*. beym Wickhäusel, in des Zollers Garten, an denen Zäunen. *perenn.*

Centaurium luteum perfoliatum T. & IB. 3. 353. *flore monopetalo, infundibuliformi luteo, radice alba fibrosa, fructu cylindraceo*, gelb tausend gulden Blum, *Centaurée jaune Ic. Tab. hist*. 4. 1166. bey dem Engelländischen Hof, und zu Oßwald häufig.

Cepa fissilis T. *flore albo liliaceo, fructu subrotundo*, Schleiß-Zwiebel, *Ciboule*, *Ic. Matthiol. epit. pag*. 326. auf denen Gartners Feldern, *ann.*

Cepa sectilis juncifolia T. sive *Porrum sectivum juncifolium Moris Hist. Ic. Tab. hist*. 873. Schnittlauch, in allen Gärten.

Cepa sectilis, caule, floribus & semine vulgaris

garis Cepæ ſimilibus, ut & Bulbulis oblongis, minime capitatis, noſtr. Schnitt oder St. Jacobs Zwiebeln, *Oignon de St. Jacque Ic. Matth. epit.* 325. in Gärten und Gartners-Feldern, *perenn.*

Cepa vulgaris T. *rotunda, floribus & tunicis purpuraſcentibus liliaceis, foliis fiſtuloſis*, gemeine Zibeln, *Oignon Ic. Tab. hiſt.* 2. 870. in Gärten und Gartners-Feldern, *ann.*

Cepa vulgaris, floribus & tunicis candidis T. ſive *Cepa alba rotunda. Tab. hiſt.* 1. 870. weiſſe Zibeln.

Cepa vulgaris oblonga T. & *IB.* 2. 547. Winter Zibeln, *ibid.*

Cepa aſcalonica T. ſive ſterilis vel *fiſſilis IB.* Schalotten, *Ic. Matth. Epit. cap.* 327. *perenn.* in Gärten.

Cepa juncifolia minor purpuraſcens T. ſive Porrum ſylveſtre latifolium purpuraſcens majus, wilder oder Zauber-Knoblauch, *Ic. Tab. hiſt.* 872. *Porreau ſauvage*, auf denen Brach-Aeckern, bey Jllkirch. *perenn.*

Cepa tenuifolia, ſphærocephalos purpuraſcens T. ſive Porrum ſylveſtre II. *Tab. hiſt.* 872. wilder Knoblauch, Brißlauch, mit Binſen förmigen Blättern, auf denen Aeckern und Wieſen, beym Mauerhof. *perenn.*

Chamædrys paluſtris caneſcens T. *IB.* 2. 292. ſive Scordium officinarum, *flore purpureo monopetalo labiato, folio villoſo allium redolente, ſemine ſubrotundo*, Lachen Knoblauch, *Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 1144. & *H. E. atque Rivin. Germandrée d'Eau*

du Scordium, auf wässerichten Wiesen, beym Mauerhof, und Oßwald, *in hortum medic, per me transpositum, luxuriose viget. perenn.*

Chamædrys major repens T. *flore purpureo monopetalo labiato, seu vera existimata, IB.* 3. 288. & *Tab. hist. Ic.* 1. 769. & *in Rivin.* Edel oder groß Gamanderlein, Bathengel, bey der hohen Wart, auf rauhem sandigem Boden, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Chamædrys minor repens T. sive *Chamædrys vulgaris vel.* 2. *Clus. hist.* 351. gemein Gamanderlein, auf allen rauhen ungebauten Orten, *perenn.*

Chamædrys minor repens flore niveo T. sive *Chamædrys albo flore*, *Clus. hist.* 351. Gamanderlein, mit weisen Blumen, unter den andern sed rarius, auf der Metzgerau. *perenn.*

Chamæmælum inodorum T. sive Cotula non fœtida *IB.* 3. 120. est Cotula *Tab. hist.* 70. Kroten Chamillen, Chamillen ohne Geruch, fast neben allen Aeckern, male dicitur inodorum, dum non omnis odoris expers est.

Chamæmælum fœtidum T, flore radiato, *folio amaro*, sive Cotula fœtida, *IB.* 3. 120. *Ic.* 1. *Tab. hist.* 60. Hunds-Chamillen, Kroten Dill, *Camomille puant*, aller Orten, auf denen Feldern, an dem Weg gegen Eckbolsheim. *ann.*

Chamæpythis lutea vulgaris T. *seu odorata, flore luteo, monopetalo unilabiato, folio trifido oblongo*, Erdpin, Feld Cypresse, Schlangen-Kräutlein, *Ic. Tab. hist. pag.* 776, & *in Rivin.*

Ivet-

Ivette ou Ive musquée, auf denen eingeerndten Feldern, bey Illkirch, Oßwald, und anderen Orten. *perenn.*

Chamæspartium, IB. sive Genistella herbacea T. *humilis & sagittalis, flore luteo papilionaceo*, quæ Chamægenista 11. Clus. hist. 104. niedrige Erdpfrimmen, *Ic. Tab. hist.* 12. 1512. zu Lingelsheim, auf graßichten Reinen, zwischen denen Aeckern, an der Landstraß, oberhalb Lingelsheim, *perenn.*

Chærophyllum sylvestre, seminibus brevibus hirsutis T. striatis, *flosculis albis rosaceis umbellatis*, seu *Caucalis foliis chærefol. Rivin. & Tab. hist.* 285. *Persil d'asne*, Esels-Körfel, Esels-Peterlein, an dem Weg gegen Illkirch, neben den Hecken, *ann.*

Chærophyllum sylvestre alterum, geniculis tumentibus, HRP. sive Myrrhis annua nodosa, semine aspero, *Moris, H.R.Bles, radice alba fibrosa*, um den Schießrein, an denen Zäunen, nahe der Lohmühl, vor dem weisen Thurn an Weg, nahe bey der grünen Wart. *ann.*

Chondrilla juncea viscosa arvensis, quæ prima Dioscorid. T. semine papposo, vel Chondrilla viminea. *IB.* 2. 1021. *Tab. hist.* 7. 487. klebrichte Acker-Chonrillen, an denen Aeckern, in dem XV. Wört gegen dem Rhein. *perenn.*

Cichorium sylvestre seu officinarum T. *IB.* 2. 1007. *flore cæruleo composito semiflosculoso, radice alba amara, semine angulato*, wilde Wegwart oder Wegweiß, mit blauen Blumen, *Ci-*

cherée

chorée sauvage Ic. Tab. *hist.* 1. 467. aller Orten, neben den Landstrassen, *perenn.*

Idem flore albo T. wilde Wegwart, mit weissen Blumen, an der Landstraß, nahe dem Rebberg bey Ittenheim, *perenn.*

Cichorium angustifolium T. sive *Endivia sativa, angustifolia vulgaris*, Endivien, mit schmahlen Blättern, *Ic.* 3. *Tab. hist.* 477. *Scariole, ou Endive*, in Gärten, und Gartners-Felderen. *perenn.*

Cichorium crispum T. sive *Endivia foliis crispis*, krause Endivien, *Ic.* 2. *Tab. hist. pag.* 477. Endive crespée ibid. *perenn.*

Cichorium latifolium, sive Endivia vulgaris T. gemeine breitblättrichte Endivien, *Tab. hist.* 1. 476. *Endive á feuilles larges.* ibid.

Cichorium sativum T. *flore cœruleo*, zahme oder Garten-Wegwart, Cichorien, mit blauen Blumen, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 467. *ann.*

Idem flore albo T. zahme Wegwart, mit weissen Blumen. ibid.

Cicuta major T. *floribus albis rosaceis umbellatis gravissimi odoris, caule maculoso fistuloso, fructu globoso, Ic. Tab. hist.* 1170 *& in Rivin.* Schirling, Dollkörfel, aller Orten in denen Hecken, an denen Aeckern, vor dem Spithal-Thor. *ann.*

Cicutaria latifolia fœtida T. sive Cicutaria quorundam *IB.* 3. *part.* 2. 184. *caule geniculato, foliis Myrrhidis latioribus & nigrioribus, floribus albis umbellatis, semine longo striato*, stinckender Schirling, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1170. *Cique puant*, in feuchten

ten schattichten Orten, vor dem Metzger-Thor, an dem Gatter.

Cicuta minor petroselino similis T. *floribus albis cordatis, fructu globoso*, sive Cicutaria fatua, Lob. Ic. 280. aut Cicutaria Apii folio *IB. 3. part. 2. 179. Ic. Tab. hist. 273.* Cynapium Rivin. Hunds-Peterlein, kleiner Schirling, in allen Gärten, und Gärtners Feldern. *ann.*

Convolvulus major albus T. & H. Eyst. sive Convolvulus major *IB. 2. 154. flore campaniformi fructu subrotundo*, weise Winde, oder Zaunglocken, *Ic. 1. Tab. hist. 1. 263.* aller Orten, in denen Zäunen. *perenn.*

Convolvulus minor arvensis, flore roseo T. sive Helxine cissampelos Fuchs. 258. vel Convolvulus minor *IB. 2. 157.* kleine Kornwinde, mit röthlichen Blumen, *Ic. 2. Tab. hist. 1263. petit Liseron*, auf denen Frucht-Feldern zu Oswald, *perenn.*

Convolvulus minor arvensis, flore purpureo, radiis albis picto T. kleine Kornwinde, mit röthlichten u. weiß gestriften Blumen. ibid. *perenn.*

Convolvulus minor arvensis flore candido T. kleine Kornwind, mit gantz weisen Blumen, auf denen Aeckern, bey Haußbergen und zu Illkirch. *perenn.*

Convolvulus minor arvensis flore albo, cum umbilico purpureo T. weise Kornwind, mit rothem Boden, auf den Aeckeren, bey Ober-haußbergheim. *perenn.*

Convolvulus angustissimo folio nostras cum auri-

auriculis Pluck. Phytogr. Tab. 24. fig. 3. kleine Kornwind, mit sehr schmahlen Blättern, und geöhrten Blümlein, in Ostwinckel zu Oswald *perenn.*

Conyza linariæ folio T. sive Helichrysos Tragi, vel Linaria III. *IB.* 3. 151. *capitulo luteo, flosculis flosculosis, semine papposo*, quæ Linaria aurea, H.Eyst. seu Linaria aurea major, Tab. hist. 1209. gulden Lein-Kraut, bey Gemar, auf sandigem Boden. *perenn.*

Corallina fœniculi folio breviore T. sive Fucus ferulaceus Lob. Ic. 255. *flore ranunculi & capitulo* est Peucedanum aquaticum *Tab. hist. Ic. 6. pag.* 187. existimat Dn. Mappus quod Potamogeton sit ingens gramineo fol. *vid. hist. ejus pag.* 251. *quod etiam nos confirmamus cum* Vaill. Tab 32. f. 5.

Coriandrum majus T. seu *sativum, flore albo rosaceo, umbellato foliis inferioribus latioribus, superioribus tenuius dissectis, fructu globulari Ic. Tab. hist.* 176. *& in Rivin*, Coriander, auf denen Gartners-Feldern, *ann.*

Coronopus sativus seu hortensis T. *flore monopetalo albo cruciformi, fructu ovato*, zahmer oder Garten Kräben-Fuß, Corne de cerf. *Ic.* 1. *Tab. hist.* 302. in Gärten, *ann.*

Cruciata palustris alba T. *flosculis albis campaniformibus, fructu gemello*, sive Gallium album *Tab. hist. Ic.* 2. 433. weiß sumpficht Wald-Stroh, in sumpfichten Orten, gegen Oswald, und zu Lingelsheim, *perenn.*

Cruciata minima T. klein sumpficht Wald-Stroh, in dem XV. Wört, in der Ruprechts-au, in feuchten Gräben.

Coronilla herbacea flore vario T. sive Melilotus Tragi, *IB.* 2. 349. *monopetalo papilionaceo fructu siliquoso, Ic. in Rivin. & Garidel. hist. plant. Sain foin* gemahlte Vogelwicke, bey Achenheim in der Klamm, hin und wieder auf dem Glacis, vor denen Thoren. *perenn.*

Cyperoides vesicarium glabrum, spica pendula longiore T. & *angustiore*, e spicis viridantibus vel subfuscis, blasenförmiges glattes Cypern-Graß, mit hangender Blüthe, in sumpfichten Orten, bey Illkirch, *perenn.*

Cyperoides vesicarium humile, locustis rarioribus T. unter dem Graß, in sumpfichten Orten, in der Ruprechtsau.

Cyperoides spica pendula breviore T. sive Pseudo cyperus Lobel. spicis vel paniculis pendentibus, ex longis pediculis, *IB.* 2. 496. in morastichen Orten, in der Ruprechtsau, gegen dem Rhein.

Cyperus rotundus inodorus germanicus T. seu Cyperus aquaticus septentrionalis Lob. *Ic.* 77. & *IB.* 2. 503. runder wilder Galgant, nahe an der Brensch, bey der grünen Wart. *perenn.*

Cyperus vulgatior panicula sparsa T. sive *Gramen* cyperoides aquaticum vulgatius Lob. Ic. 10. & Scheuchz. Agrostaph. 398. & 400. Tab. IX. fig. 7. & 8. item *Tabern. hist. 6. pag.* 533. groß Cypern-Graß, mit flatterichtem Strauß, in denen Gräben um die Stadt, an der Ill, an

Herrn

Herrn Prætoris Schloß-Garten, zu Illkirch. *perenn.*

Cyperus maritimus capitulis glomeratis T. sive Iuncus acutus maritimus, caule triangulo CBprodr. 22. In dem Rheingiesen häufig, auf der grünen Wart, auf feuchten Matten, *perenn.*

Cyperus gramineus T. & IB. 2. 504. est Cyperus graminea sive miliacea *Lob. Ic.* 79. Cypern-Graß / mit flatterichtem Hirse Strauß, an denen Gräben der Wasser, bey dem Schießrein, an der Bruck, oberhalb der Lohmühl, am Wickhäusel, und an der Ill. *perenn.*

Cyperus minimus, panicula sparsa nigricante T. seu Gramen parvum pulchrum, panicula compressa nigricante *IB.* 2. 471. & *Tab. hist.* 4. 533. klein Ried-Graß, auf der Insul, wo die Breusch in die Ill fält, in allen wässerichten Gräben. *perenn.*

Cyperus minimus, panicula sparsa subflavescente T. seu Gramen pulchrum parvum, panicula lata compressa, *IB.* 2. 470. & Scheuchz. agrost. *Tab. VIII. fig.* 13. klein Ried-Graß, mit gelben Kölblein, auf feuchten Wiesen, beym Schnackenloch, und in der Ruprechtsau. *perenn.*

Daucus officinarum T. sive Daucus vulgaris *Clus. hist.* CXCVIII. *Ic. Tab. hist.* 195. vel Pastinaca sylvestris aut Staphylinus Græcorum, *IB.* 3. *part.* 262. est Staphylinus Rivin. *flosculis albis rosaceis umbellatis, in medio puncta rubra, fructu subrotundo*, Vogels-Nest, wilde Möhren, gelbe Pest-Nägel, *Carotte sauvage*, auf allen Wiesen.

Daucus sativus radice lutea T. *Ic. Tab. hist pag.* 192. gelbe Möhre oder Rube, Carotte jaune, auf allen Gartners-Feldern, *perenn.*

Daucus sativus radice alba T. weise Möhre oder Pest-Nägel, *Carotte blanche ibid. ann.*

Daucus sativus radice atro rubente T. rothe Möhre oder Rube, nostratibus rothe Ranen, *Carotte rouge Ic.* 2. *Tab. hist.* 192. *ibid. ann.*

Delphinium segetum flore cœruleo T. sive *Consolida regalis arvensis, flore minore IB.* 3. 210. *cœruleo polypetalo anomalo, foliis tenuissime incisis, semine angulatos*, Korn oder Feld-Ritter-Sporn, in denen Korn-Feldern, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 131. & *in Rivin. Pied d'alouette ann.*

Digitalis minima Gratiola dicta T. sive *Gratiola IB.* 3. 443. *floribus monopetalis anomalis tubulatis, dilute purpurascentibus, fructu rotundo acuminato*, Gottes Genad, Purgier-Kraut, *Ic. Tab. hist.* 754. & *in Rivin. Herbe á pauvre homme*, an dem Rand der wässerichten Wiese, vor der grünen Wart, und bey dem Mauerhof. *perenn.*

Eadem flore albo. T. quæ Gratia Dei Hort. Eystett. wilder Aurin, mit weisen Blumen, zu Dorlisheim, auf feuchten Wiesen.

Doronicum plantaginis folio alterum T. *villoso ex adverso posito, flore aureo radiato, semine papposo, sive Doronicum Germanicum, IB.* 3. 19. vel Arnica Schrœd. & officin. est Damasonium Dioscorid primum, *Tab. hist. pag.* 1116. groß Lucians-Kraut, Wolferley. *Doronic à feuilles larges ou de plantain*, auf dem Hochgebürg Hochfeld

feld auf denen bergichten Wiesen, zu Buchsweyler auf dem Paßberg. *perenn.*

Echium vulgare T. & *IB.* 3. 586. *flore cæruleo monopetalo infundibuliformi, semine viperino*, wilde Ochsen-Zung, mit blauen Blumen, *Herbe aux Vipere Ic. Rivin.* bey Oßwald, auf dem Glacis, vor dem Fischer-Thor. *perenn.*

Echium majus & asperius flore albo *monopetalo infundibuliformi semine viperino* T. seu Echium flore albo majus *IB.* 3. 588. wilde Ochsen-Zung, mit weisen Blumen, in dem Ostwinckel, auf dem St. Ottilien Berg, zwischen Eckbolsheim und Ittenheim an der Werb. *perenn.*

Echium majus & asperius, flore dilute rubente T. wilde Ochsen-Zung, mit rothen Blumen, hinter St. Arbogast, rarissimi est proventus. *perenn.*

Emerus Cæsalpini T. qui Coronilla major Rivin. sive Colutea scorpioides 1. *elatior.*, *Clus. hist.* 97. & *Tab. hist.* 1. 1503. Schaf-Linsen, mit Scorpions-Kraut Schoten, zu Inlenheim, an der Maur im Wirthshauß, zu Blinschweyler beym Schloß häufig, *perenn.*

Emerus minor T. sive colutea siliquosa minor, est Scorpioides *Clus. hist. pag.* 97. *Tab. hist.* 2. 1503. auf dürren Aeckern bey Lützelburg, auf dem Falckensteiner Hochgebürg. *perenn.*

Epilobium ramosum & siliquosum foliis angustis, flore purpureo cruciformi nobis. sive Lysimachia siliquosa speciosa angustifolia *IB.* 2. 907. *Est Epilobium spicatum fo-*

foliis integerrimis, linearibus fasciculatis Haller 458.

Epimedium Dod. pempt. 539. seu Epimedium quorundam *IB.* 2. 395. *floribus cruciformibus luteis, limbo purpureo cinctis, siliqua unicapsulari, radice repente, fructu siliquoso unicapsulari*, auf dem Haulen Berg, *per me transplant. ubi nunc luxuriat. vid. Tab. nostr. VI.*

Equisetum palustre brevioribus setis T. sive Equisetum palustre Lob. Ic. 795. sumpfichter Roßschwantz, mit kurtzen Bürsten, auf sumpfichten Wiesen, vor dem Fischer und Spithal-Thor, *perenn.*

Equisetum foliis nudum ramosum T. sive Iunceum ramosum *Ic. Tab. hist.* 568. Schaft Heu, mit neben Zweig, *Queue de Cheval, avec la branche*, in allen Stadtgräben. *perenn.*

Equisetum foliis nudum non ramosum sive junceum T. seu Equisetum nudum *Tab. hist.* 568. Schaft Heu, ohne neben Zweig, *Queue de cheval. sans branche. perenn.*

Equisetum foliis nudum minus variegatum Basileum T. *radice nigra, julo brevissimo*, zu Oßwald auf feuchten Wiesen, in dem XV. Wört am Rhein. *perenn.*

Equisetum palustre longioribus setis T. sive *Hippuris Lob.* 793. & *Tab. hist. Ic.* 2. 565. vel Equisetum majus aquaticum IB. 3. 728. groß Wasser Roß-Schwantz, in der Ruprechtsau, bey dem Jäger-Hof, auf dem Schießrein, am Wasser. *perenn.*

Equi-

Equisetum sylvaticum tenuissimis setis T. in feuchten Wäldern, in dem Illkircher Wald, bey dem Fasanen-Garten. *perenn.*

Erica vulgaris glabra T. sive Erica humilis vulgaris semper virens, flore purpureo *IB.* 1. 354. *monopetalo, foliis sabinæ similibus, fructu subrotundo,* Heyde, mit rothen Blumen, *Ic. Tab. hist.* 1. & 2. 1517. *Bruyere,* bey allen Lüsten, bey der Schlut, *perenn.*

Erica vulgaris glabra, flore albo T. seu Erica alba *Tab. hist.* 3. 1517. Heyde, mit weisen Blumen, in dem Eckbolsheimer Wald, *sed rarius occurrit. perenn.*

Eruca sylvestris major lutea, caule aspero T. *floribus cruciformibus flavescentibus, fructu siliquoso,* wilde Raucke, *Ic.* 3. *Tab. hist.* 837. *Roquette sauvage,* in der Ruprechtsau, in den Rhein-Wörten, vor der Citadell, gegen Kehl. *perenn.*

Eruca tenuifolia perennis, floribus luteis T. & *IB.* 2. 861. kleine wilde Raucke, bey dem Ziegel Ofen, gegen dem Rhein, neben wässerichten Gruben, bey Oßwald und Lingelsheim. *perenn.*

Eryngium vulgare T. & *IB.* 3. 85. *flosculis albis rosaceis umbellatis, semine ovato,* Manstreu, Bracken-Distel, *Ic. Tab. hist. pag.* 1072. *Chardon Roland, ou à cent têtes,* bey allen Lüsten, und andern grasichten dürren Orten. *perenn.*

Erysimum alterum, siliquis Erucæ T. *fructu siliquoso* sive 2. *Tab. hist.* 840. an dem

Weg nach der Rheinbruck, an dem Canal. *perenn.*

Eupatorium Cannabinum T. *flore flosculoso, semine papposo*, sive Eupatorium adulterinum *IB.* 2. 1065. Wasser Dosten, Kunigunden-Kraut, *Eupatoire Ic. Tab. hist.* 336. an dem Canal, bey Eckbolsheim, in dem Stadt-Graben, vor dem weissen Thurn, *perenn.*

Filago vel Impia T. sive Gnaphalium vulgare majus, *floribus flosculosis coagmentatis, semine papposo*, grose Feld-Katzen, Ruhr-Kraut, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 781. *Herbe a Cotton*, in der Ruprechtsau, auf ungebauten und sandigen Feldern, zu Oßwald. *ann.*

Filago seu Impia altera T. sive Gnaphalium majus, angusto oblongo fol. CBp. schmahl Blättrig Ruhr-Kraut, auf dem Schießrein, in steinichten Gruben. *ann.*

Filago vulgaris tenuissimo folio erecta T. sive Gnaphalium vulgare tenuifolium *IB.* 3. 159. auf dürren trockenen Ackern zu Oßwald. *ann.*

Filago incana, capitulis in summis caulibus & ramulis dispositis Dillen append. Catal. plant. Giss. klein Ruhr Kraut, mit schwartzen Köpfen, auf der Insul wo die Breusch in die Ill fält, und andern feuchten Orten mehr. *ann.*

Filicula, quæ Adiantum nigrum officinarum T. pinnulis obtusioribus, sive Adiantum nigrum officin. seu vulgare *IB.* 3. 742. foliis longioribus pulverulentis, pedicula nigro, gemein Frauen-

Frauen-Haar, *Ic. 5. Tab. hist.* 1185. *Capillaire noir ou ordinaire*, zu Baar, und Oberbronn, zwischen denen Steinfugen, *perenn.*

Filicula fontana major, sive Adiantum album Filicis folio T. *IB.* 3. 741. Brunnen Farren-Kraut, bey dem Ottilien Brunnen, an denen Felsen, neben denen Quellwässerlein zu Heilgenstein, *perenn.*

Filicula fontana minor T. sive Filicula fontana *Tab. hist. Ic.* 3. 1181. klein Brunnen Farren-Kraut, beym Quellwässerlein, auf dem Gebürg St Ottilien, an denen Felsen. *perenn.*

Filicula saxatilis corniculata T, sive Holostium petræum *Tab. hist. Ic.* 3. 1113. Schlangen-Zwang, auf dem St. Ottilien Berg, zwischen denen Felsen. *perenn.*

Filipendula vulgaris T. *flore albo rosaceo, radice fibrosa*, rother Steinbrech, *Filipendule. Ic. IB.* 2. 189. auf der Oßwalder Nachtweyd. *perenn.*

Filix non ramosa dentata T. vel Filix Mas sive non ramosa IB. 3. 737. Filix sive *Mas officinarum*, *Fougere Male*, Wald Farn, gemeine Farren ohne Zweig, aller Orten in Wälderen, im Brumbter und Hördter Wald, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1181. *perenn.*

Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis T. est Filix major & prior Tragi, sive ramosa repens IB. 3. 735. vel Fœmina, *Fougere femelle Ic.* 2. *Tab. hist.* 1181. groß Farn-Kraut, Weiblein, mit zweigen, *perenn.*

Filix ramosa minor pinnulis dentatis T. sive

Filix

Filix ramoſa minor IB. 3. 741. vel Filix querna vel arborea *Ic.* 7. *Tab. hiſt.* 1182. Baum oder Eich-Farren, auf allen zerfallenen Bäumen, in den Wäldern, auf dem Gebürg zu Barr. *perenn.*

Filix non ramoſa petiolis tenuiſſimis & tenuiſſime dentatis T. ſive Filicula lutea fœmina *Ic.* 7. *Tab. hiſt.* 1182. in dem Hochgebürg, gegen Hochfeld, eſt Filix dentata Munting 288.

Filix minor non ramoſa T. ſive paluſtris minor, quæ Filix querna Lobel. ſeu Dryopteris Ic. 815. aut Petræa fœmina *Tab. hiſt. Ic.* 2. 1182 Sumpf-Farren, an dem Bach beym Kloſter Peris, bey groſen feuchten Steinen, oberhalb Keyſersberg. *perenn.*

Filix Rhætica tenuiſſime dentata T. & IB. 3. 740. ſive Filix dentata T. eſt Filix dentata, Munting. fig. 84. pag. 288. oberhalb Ottrott, gegen Lützelburg auf dem Gebürg. *perenn.*

Filix ramoſa dentata, ramulis & pinnulis longius, ab invicem diſtantibus Mapp. hiſt. Ic. VIII. pag. 106. in dem Haßlacher Thal, unter denen Thannen-Bäumen. *perenn.*

Filix non ramoſa latifolia dentata, profundius pinnulis maximis Bœrh. Ind. plant. pag. 26. unter den kleinen Thannen, hinter St. Ottilien Berg. *perenn.*

Filix mollis ſive glabra vulgari mari non ramoſa accedens *IB.* 3. 738. & *Vaill.* 53. *Tab.* 9. *fig.* 4. Farren-Kraut, mit weichen zarten Blättern, auf dem St. Ottilien Berg, beym Brunnen. *perenn.*

Filix

Filix ramosa major, pinnulis acutissimis non dentatis CBp. in dem Haßlacher und Wimmenauer Gebürg. *perenn.*

Filix tenuissime secta ex monte Ballon. IB. 3. 739. Farren-Kraut, mit gar zarten eingeschnittenen Blättern, auf dem Gebürg zu Niedeck, in dem Wald hinter hohen Andlau. *Ic. Vaill. Tab. IX. f. 3. perenn.*

Fœnum græcum sativum T. *flore albo papilionaceo, foliolo ex uno pediculo terno, fructu siliquoso,* Bockshorn, Fönugröck, *Ic. IB.* 2. 363. & *in Rivin.* auf denen Gartners-Feldern. *ann.*

Fungoides infundibuliformâ semine fœtum T. in denen Waldungen, am faulen Holtz, *Ic. Vaill. Tab. XI. fig. 67.*

Fungus betulaceus orbiculatus albus T. *Ic. Clus. hist. CCLXXVIII. noxior. genus Fung.* & *IB.* 3. 841. weiser Bircken-Schwamm, in allen Waldungen, an abgehauenen alten Bircken-Stämmen, in dem Ganßauer Wald.

Fungus pileolo lato orbiculari flavescente T. *esculento* sive Capreolini *Tab. hist.* 1520. est Fungus pallidus *IB.* 3. 832. gelbe Pfifferlinge, auf dürren Erdreich, vor dem Ganssauer Wald.

Gallium album vulgare T. & IB. 3. 721. *latifolium, flore albo simplici campaniformi, fructu gemello*. groß Stern Meyer-Kraut, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 434. & *IB.* 3. 721. *perenn.*

Gallium album supinum multicaule Flor. Ien. 4. & Dillen. append. 3. klein niedrig stehend Meyer-Kraut, in dem XV. Wört, und andern

andern Orten, in feuchten Gräblein. *perenn.*

Gallium luteum T. seu *Verum IB.* 3. 720. unser Frauen Bett-Stroh, *Caille laict Ic.* 1. *Tab. bist.* 432. auf allen Glacis, vor der Stadt, aller Orten an den Reinen der Aecker, *perenn.*

Gallium flore pallido, seu flavescente T. Wald-Stroh, mit bleich gelben Blumen. Ic. IB. 3. 721. neben dem Canal, in Gruben, auf feuchten Wiesen, zu Oßwald. *perenn.*

Gallium arvense flore cœruleo T. sive Rubia cœrulea erectior elatiorve IB. 3. 719. & Chabræi pag. 547. blau Acker Meger-Kraut, auf Berg-Ackern, gegen Haßlach und Niedeck. *ann.*

Gallium montanum latifolium ramosum T. sive Rubia sylvatica lævis IB. 3. *Caille laict de montaigne*, Bergstern-Kraut, groser Waldmeister, *Ic. Tab. bist.* 434. *perenn.*

Genista tinctoria germanica T. sive Tinctorius flos, *IB.* 1. 391. *flore luteo papilionaceo, fructu siliquoso*, kleine Acker-Pfrimmen, Genster, *Petit Genet ou Fleur à teindre Ic.* 6. *Tab. bist.* 1510. hinter der Citadel, neben den Aeckern in der Wantzenau, auf denen Matten, *perenn.*

Genista tinctoria germanica foliis angustioribus T. Genster, mit schmahlen Blättern, est Genistella Rivini. auf dürren Wiesen, zu Oßwald. *perenn.*

Genista spartium majus, brevioribus & longioribus aculeis T. sive Genistellæ spinosæ affinis, Nepa quibusdam IB. 1. 400. sive Scorpi-

us

us 1. Clus. hist. 106. Hag oder Zaun-Genster, grose stechende Pfrimmen, est Genista spinosa Rivin. in dem Schloß-Garten zu Brumbt. *perenn.*

Genista spartium minus germanicum T. sive *Genista aculeata, foliosa* IB. 1. 399. kleine stechende Pfrimmen, *Petit genet piquant* est Genistella spinosa Rivini, in dem Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Genista ramosa, foliis hyperici T. sive Genistella pilosa IB. 1. 393. est Genista minima Dalech. 173. *folia ejus inferius lanuginosa, superius glabra sunt.* auf dem Gebürg hinter hohen Andlau. *perenn.*

Genistella herbacea sive Chamæspartium IB. 1. 393. sive Chamægenista 11. Clus. hist. 104. Genistella articulata & Sagittata *nobis* niedrige Erd-Pfrimmen, an der Landstrasse, nach Ensisheim, und an den Reinen der Aecker, zu Lingelsheim. *perenn.*

Gentiana alpina pumila verna major T. sive Gentianula quæ Hippion. IB. 3. 527. *flore elegantissime cœruleo monopetalo campaniformi*, sive Gentiana VI. Gentianella minor verna Clus. hist. 315. Himmels-Stengel, blaue Roß-Violen, in dem Jllkircher Wald, und bey Oßwald vor dem Wald, *perenn.*

Geranium columbinum dissectis foliis, pediculis, florum longissimis T. Storcken-Schnabel, oder Tauben-Fuß, mit gespaltenen tief eingeschnittenen Blättern, in

in denen Hecken, an der hohen Wart an Oßwald, *ann.*

Geranium sanguineum maximo flore T. *rosacco, radice crassa IB. 3. 478. Ic. 13. Tab. hist. 126. est Geranium hæmatodes VII. Clus hist. CII. Sanguinaire*, Berg Storchen-Schnabel, mit grosen rothen Blumen, an denen Reinen der Reben zu Oberbronn. *perenn.*

Geranium phæum seu fuscum, petalis reflexis T. Ic. Hort. Eyst. & IB. 3. 477. braun schwartzer Berg Storchen Schnabel, mit gebogenen Blumen, auf Berg-Wiesen zu Barr, auf dem Haulen Berg / *per me satum. perenn.*

Geranium phæum petalis rectis seu planis, Moris hist. oxon, sive *Geranium phæum, pullo flore Clus. IB. 3. 477. utrumque maculatum aut non maculatum est.* Storchen-Schnabel, mit aufrecht stehenden Blumen zu Barr, auf denen Berg-Matten. *perenn.*

Geranium Batrachioides, collum gruis germanorum sive *Gruinalis Lugd.* 278. Storchen-Schnabel, mit langen Schnäbeln, auf Hügeln bey Seltz, auf brachliegenden trockenen Aeckern, zu Cron Weißenburg *perenn.*

Geranium batrachioides, Gratia Dei German. T. & IB. 3. 475. *Ic. 6. Tab. hist.* 124. groser blauer Storchen-Schnabel, auf dem Gebürg, gegen dem Stein-thal, und Hochfelden, *perenn.*

Gramen aquaticum paniculatum latifolium T. sive *Arundinaceum paniculatum Tab. hist.* Ic. 2. 525.

525. est *Gramen majus aquaticum* Lob. & IB. 2. 481. groß Ried-Graß, an dem Ufer der Ill, und Breusch, in allen Stadt-Gräben ausser denen Thoren. *perenn.*

Gramen aquaticum spicatum, spica cylindracea brevi T. sive *Gramen fluviatile album Tab. hist. Ic.* 2. 530. weiß Fluth oder Fluß-Graß, in denen Gräblein, neben den Gartners-Feldern, unterhalb dem Wickhäusel, in stehenden Wasser-Gruben am Canal, *perenn.*

Gramen aquaticum paniculatum fluitans T. *panicula longissima*, sive *Gramen fluviatile Tab. hist. Ic.* 1. 580. Endten oder schwimmend Graß, in denen meisten Wasser-Gruben, vor dem Fischer und Spithal-Thor. *perenn.*

Gramen paniculatum spicis crassioribus & brevioribus T. *folio aspero, floribus pallide luteis, aut etiam subrubris* Scheuchz. Agrost. pag. 300. seu *Gramen asperum* IB. 2. 467. quod spicatum Dalechamp. 427. Strauß Graß, mit rauhen Blättern, auf denen Wällen umb die Stadt. *perenn.*

Gramen paniculatum latifolium, radice repente crassiori T. sive *Gramen canarinum longius radicatum* IB. 2. 457. groß Quecken-Graß, in dem Ochsen Wört. *perenn.*

Gramen aquaticum paniculatum miliaceum T. *Ic. Vaill. Tab. XVII. fig.* 7. Wasser-Graß, mit einem Hirse Strauß, zu Oßwald und Gravenstaden an Gräben, *perenn.*

Gramen paniculis elegantissimis, sive *Eragrostis* majus T. sive Gramen paniculatum sati-

vum, Heragrostis *Tab. hist. Ic.* 11. 518. hinter der hohen Wart, neben denen Aeckern, *perenn.*

Gramen panicula fere arundinacea, locustis brevissimis T. sive Gramen pratense vulgare spica fere arundinacea IB. 2. 461. an dem Canal, auf denen Matten bey Eckbolsheim. *perenn.*

Gramen paniculatum arundinaceum, panicula densa spadicea T. sive *Calamagrostis quorundam* Lob. Ic. 6. Wasser Feder-Graß, auf feuchten Wiesen zu Oßwald, beym Mauer Hof, an dem Canal, in denen Hecken, *perenn.*

Gramen paniculatum proliferum T. sive Gramen cum panicula molli rubente *IB.* 2. 464. hin und wieder auf verfallenen Mauren der Dörfer, auf steinichten dürren Wiesen, neben dem Rhein-Giessen. *perenn.*

Gramen avenaceum, panicula purpuro argentea splendente Ray hist. 1909. auf trockenen Wiesen, in der Metzgerau, auf dem Glacis, vor dem Juden Thor, *perenn.*

Gramen avenaceum locustis glabris purpurascentibus & aristatis T. seu Gramen murorum *Dalechamp.* 428. in denen Korn-Felderen bey Drusenheim. *perenn.*

Gramen avenaceum spica simplici, locustis candicantibus splendentibus & rarioribus T. in dem Gansauer Wald, unter denen Hecken. *perenn.*

Gramen avenaceum locustis villosis crassioribus, T. sive *Festuca graminea glumis hirsutis*, Treffi oder Twalch; *Ic.* 2. *Tab. hist.* 544. auf den

Wällen

Wällen und Wercken um die Stadt, in dem Ruprechtsauer Wald. *perenn.*

Gramen avenaceum montanum lanuginosum T. sive *Gramen avenaceum Tab. hist.* 15. 579. *Spicatis parvis candidis pilosis*, Haber-Graß, mit haarichten Köpfen, auf dem Gebürg zu Oberbronn. *perenn.*

Gramen avenaceum panicula sparsa, locustis minoribus & aristatis T. sive Festuca altera Lob. Ic. 33. quod Bromos est *Tab. hist. Ic.* 1. 544. an denen Wegen und Ackern bey Oßwald, zu Eckbolsheim unter der Frucht am Weg, bey der Carthauß. *perenn.*

Gramen avenaceum locustis villosis angustis candicantibus & aristatis T. sive *Gramen murorum spicis pendulis angustioribus* Dillen Catal. plant. Giss. 71. hin und wieder auf den Mauren, auf dürren Wiesen und Aeckern zu Oßwald. *perenn.*

Gramen avenaceum utriculis lanugine flavescentibus T. sive *Avena pilosa* IB. 2. 433. wild Haber-Graß, unter dem Habern, auch unter der Gerst. *perenn.*

Gramen avenaceum panicula sparsa, locustis majoribus & aristatis T. sive *Avena fatua Tab. hist. Ic.* 1. 544. Gauch Habern, unter der Frucht, und an denen Wegen. *perenn.*

Gramen avenaceum montanum locustis rubris T. seu Gramen locustis rubris IB. 2. 434. in der Ruprechtsau gegen dem Rhein, neben den Aeckern. *perenn.*

Gramen antoxanthum spicatum T. Ic. Lugd. 426. spica flavescente, Wiesen-Graß mit gelblichten Aehren, zu Oßwald, auf trocknen Wiesen. perenn.

Gramen capillatum paniculis rubentibus IB. sive Gramen segetum panicula sparsa latiore Lob. Ic. 2. pag Acker-Graß / mit einem rothen Strauß, unter der Frucht um die Stadt. perenn.

Gramen capillatum, paniculis viridantibus IB. sive Gramen agrorum Lob. IB. 2. 461. Tab. hist. 4. 526. perenn.

Gramen loliaceum radice repente sive Gramen officinar. T. foliis viridibus spica triticea compacta, Quecken oder Hunds-Graß, Chien dent. Ic. 5. Tab. hist. 516. an denen Wegen, und auf denen feuchten Aeckern. perenn.

Gramen loliaceum majus, spicis longius distantibus T. auf denen Wiesen, und an dem Weg, bey Oßwald. perenn.

Gramen loliaceum, panicula multiplici spicata T. an dem Gräblein bey Gutleuthen, und an der Landstraß gegen Schiltigheim an denen Wegen in der Ruprechtsau. perenn.

Gramen loliaceum spicis brevioribus & latioribus compressis. Moris hist. Ox. auf ausgetretenen Fußpfaden gegen Oßwald. perenn.

Gramen loliaceum spica simplici & densa T. sive Gramen angustifolium spicæ tritici muticæ simili CB prodrom. 17. ubi Icon. auf den Wiesen, zwischen dem Canal-Schliesen und Eckbolsheimer Wald. perenn.

Gra-

r. Gramen loliaceum corniculatum, spicis villosis T. sive *Gramen avenaceum dumetorum spicatum* Dillen. Append. Catal. plant. Giss. pag. 170. ubi Ic. an denen Hecken Eckbolsheimer Walds, wie auch zu Gravenstaden und Oswald *perenn.*

Gramen loliaceum angustiore folio & spica T. sive Phœnix lolio similis *IB. 2. 436.* Mause Gersten, *Ic. Tab. hist. 546. perenn.*

Gramen loliaceum repente radice sive *Gramen aristis longioribus donatum* T. *Ic. Vaill. Tab. XVII. fig. 2.* neben denen Aeckern zu Illkirch. *perenn.*

Gramen loliaceum spica longiore aristas habens T. Lulch oder Schwindel-Korn, *Ic. 1. Tab. hist.* 550. auf denen Weitzen und Korn-Feldern, *perenn.*

Gramen loliaceum spica longiore sine aristis T. an der Landstraß, und neben denen Frucht-Feldern, zu Eckbolsheim. *perenn.*

Gramen loliaceum corniculatum spicis glabris T. in trocknen Gräblein / bey Schiltigheim und auf dem Heilgensteiner Gebürg. *perenn.*

Gramen loliaceum minimum, foliis junceis, panicula unam partem spectante T. sive *Gramen spartum nostras parvum* Lob. Ic. oberhalb hohen Andlau und Hochfeld. *perenn.*

Gramen loliaceum altissimum, spica Brizæ per longa, aristis brevioribus donata T. est *Gramen spica Brizæ majus CB. prodr. ubi Icon.* auf denen

nen Matten, zu Druttenhausen häufig, in dem XV Wört am Rhein.

Gramen loliaceum minus capillaceo folio, spica Brizæ longissima T. sive *Gramen tenuifolium glabrum* IB. 2. 462. radice nigra, auf denen dürren Wiesen zu Mutzig. *perenn.*

Gramen nodosum avenacea panicula CBp. sive *Gramen bulbosum nodosum* Lob. Ic. 23. & Scheuchz. Agrost. Tab. 4. fig. 27. Knoten Graß, auf feuchten Aeckern. *perenn.*

Gramen pratense paniculatum majus latiore folio T. spica fere arundinacea, Heu-Graß, *Ic. 2. Tab. hist.* 575. *perenn.*

Gramen paniculatum minus radice repente panicula duriore T. auf denen Mauren, des alten Stadtgrabens.

Gramen pratense paniculatum minus rubrum T. roth Strasen-Graß, *Ic. Tab. hist.* 16. 519. an allen Wegen.

Gramen pratense paniculatum minus album T. *Ic.* 15. *Tab. hist.* 519. weiß Strasen-Graß, aller Orten an dem Wegen.

Gramen paniculatum medium T. est *Gramen pratense minus IB.* 1. *pag.* 542. auf allen magern Wiesen.

Gramen paniculatum majus locustis magnis candicantibus tremulis T. sive *Gramen tremulum majus*, Zitter-Graß, Hasen Brodt, Amourettes tremblentes *Ic. Tab. hist.* 541. auf Wiesen zu Oßwaldt.

Gramen paniculatum minus, locustis parvis

vis tremulis, T. & *IB.* 2. 470. sive *Gramen tremulum minus, panicula parva, radice rufescente repente*, klein Zitter-Graß, oder Hasen-Brodt auf dürren Wiesen zu Oßwald. Ic. CB. prodr. pag. 4. *perenn.*

Gramen paniculatum majus, locustis magnis phœniceis tremulis T. sive Gramen tremulum majus, panicula spadicea CBp. groß Zitter-Graß, mit braun rothen Hülsen, ibid. und auf denen Wiesen, bey Reichshofen häufig. *perenn.*

Gramen pratense, panicula duriore, laxa, unam præcipue partem spectante, Ray synops. 257. auf Wiesen, gegen der Gansau. *perenn.*

Gramen pratense paniculatum molle CBpr. pag. 5. seu Gramen lanatum Dalechamp Lugd. 425. & IB. 2. 466. auf dürren Wiesen, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Gramen minus vulgare, panicula rigida T. sive Gramen duriusculum *Tab. hist.* 18. 520. klein hart Graß, vor dem Spithal-Thor, bey der Seiler-Bahn. *perenn.*

Gramen paniculatum aquaticum, Phalaridis semine T. klein Ried-Graß, an dem Wasser der Ill, und der Breusch. *perenn.*

Gramen paniculatum arundinaceum, spica multiplici T. sive Gramen Calamagrostis Lobel. IB. 480. Rohr oder Ried-Graß, auf der Gansau, an dem Rhein, vor dem weisen Thurn Thor, in denen sumpfichten Orten. *perenn.*

Gramen nemorosum, panicula rufescente

 molli

molli T. sive Sylvaticum *Ic. Tab. hist. pag.* 537. Wald-Graß, in dem Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Gramen sylvaticum, panicula miliacea sparsa T. sive Gramen miliaceum *Lob. Ic.* 3. & *Tab. hist. Ic.* 13. 518. Wald Hirse Graß, an dem Canal, und Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Gramen pratense paniculatum altissimum, locustis parvis splendentibus non aristatis T. auf dem Spithal-Wall, auf denen Aeckern bey Jllkirch. *perenn.*

Gramen spicatum vulgare secalinum T. sive Holcus Plin. Anguillaræ Lob. *Ic.* 30. est Hordeum murinum *IB.* 2. 431. Gersten-Graß, Twalch, an allen Fuß-Pfaden, und Wegen. *perenn.*

Gramen spicatum secalinum minus T. Ic. Vaill. Tab. VII. fig. 4. Mauß-Gersten, taub Korn-Graß, an allen Fuß-Pfaden, an denen Mauren alter Stadt-Gräben. *perenn.*

Gramen spicatum spica cylindracea longissima T. sive Gramen cum cauda muris majoris longa, majus *IB.* 2. 472. *perenn.*

Gramen spicatum, spica cylindracea brevi, radice nodosa T. est *Gramen nodosum tertium CB.* *vodrubi Icon.* auf dem St. Ottilien Berg.

Gramen spicatum, spica cylindracea molli & densa T. sive Gramen alopecuroidi accedens & Phalaridi, spica longiuscula, folio

longi-

longiusculo *IB.* 2. 474. Fuchs-Schwantz, oder Kolben-Graß, auf allen Wiesen und Glacis.

Gramen secalinum spicatum altissimum T. gar groß Gersten-Graß, auf dem Wall, zwischen dem Juden und Steinstrasser-Thor, in den Ruprechtsauer-Wald, an denen Hecken. *perenn.*

Helleborine montana angustifolia flore purpurascente T. *polypetalo anomalo fructu fenestrato.* sive Damasonium purpureum dilutum aut Elleborine IV. *Clus.* *IB.* 3. 516. wild schmahl blättricht Nießwurtz, *Ic. Tab. hist.* 3. 1100. auf dem Haulenberg, bey Mundolsheim. *perenn.*

Helleborine altera flore rubente T. sive Elleborine botryoides seu Alisma racemosum IB. Nießwurtz, mit gantz rothen Blumen, hinter Rappolsweyler, auf dem Hochgebürg, in dem Granwört neben den Aeckern, am Wasser gegen der Citadell. *perenn.*

Helleborine flore albo T. seu *floribus albis* *IB.* 3. 516. *Ic. Tab. hist.* 2. 1100. breite Berg-Nießwurtz, mit weisen Blumen, hinter dem Berg St. Ottiliä häufig. *perenn.*

Helleborine montana latifolia T. sive *Elleborine Dodon.* *IB.* 3. 516. *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1100. est *Helleborine Rivin.* beym Jäger-Hof und Illkircher Wald, an dunckeln Orten, *perenn.*

Helleborine angustifolia palustris sive pratensis T. *flore herbaceo intus nonnihil candicante* *IB.* 3.

IB. 3. 517. wilde Nießwurtz, auf feuchten Wiesen, in dem Ostwinckel, und in dem Graben, vor dem Cronenburger Thor. *perenn.*

Heliotropium majus Diosc T. sive Heliotropium majus *Clus. hist.* XLVII. *flore albo monopetalo semine angulato & gibbo infundibuliformi*, Krebs-Blumen, auf denen Aeckern, zu Ehrstein auf dem Haulenberg. *ann.*

Hieracium alpinum, latifolium villosum, magno flore T. *semiflosculoso, semine papposo* sive Hieracium Alpinum hirsuto folio, 5 Clus. CXLI. breit berg Habich-Kraut, mit haarichten Blättern, oberhalb Niedeck und gegen Dachsburg.

Hieracium asperum majori flore T. & *IB.* 2. 1029. *luteo semiflosculosa* sive Hieracium intybaceum asperum *Tab. hist. Ic.* 6. 492. rauh schmahl blättricht Berg Habich-Kraut, mit grosen Blumen, auf dem Glacis, vor dem Fischer-Thor, und an denen Reinen der Aecker. *ann.*

Hieracium dentis leonis folio bulbosum T. sive Intybaceum *Tab. hist. Ic.* 6. 492. est Hieracium dentis leonis folio monoclonon sub asperum CBp. 121. & *sic bis in pinace occurrit quod in prodr. 62. describitur & cum Jcon. Tabern. exacte convenit.* auf dem Gansau, gegen dem Jäger-Hof.

Hieracium pratense latifolium non sinuatum majus Haller. caule aphyllo striato, breit blättricht Wiesen Habich-Kraut, zwischen Hördt und Brumbt auf denen Wiesen. *vid. Tab. nostr.* VII.

Hiera-


p. 154.
Tab. VII
Hieracium pratense
latifol non Sinuat. Haller.
J. Striedbeck. sculp:

IB. 3. 517. wilde Nießwurtz, auf feuchten Wiesen, in dem Ostwinckel, und in dem Graben, vor dem Cronenburger Thor. *perenn.*

Heliotropium majus Diosc T. sive Heliotropium majus *Clus. hist.* XLVII. *flore albo monopetalo semine angulato & gibbo infundibuliformi*, Krebs-Blumen, auf denen Aeckern, zu Ehrstein auf dem Haulenberg. *ann.*

Hieracium alpinum, latifolium villosum, magno flore T. *semiflosculoso, semine papposo* sive Hieracium Alpinum hirsuto folio, 5 Clus. CXLI. breit berg Habich-Kraut, mit haarichten Blättern, oberhalb Niedeck und gegen Dachsburg.

Hieracium asperum majori flore T. & *IB.* 2. 1029. *luteo semiflosculosa* sive Hieracium intybaceum alperum *Tab. hist. Ic.* 6. 492. rauh schmahl blättricht Berg Habich-Kraut, mit grossen Blumen, auf dem Glacis, vor dem Fischer-Thor, und an denen Reinen der Aecker. *ann.*

Hieracium dentis leonis folio bulbosum T. sive Intybaceum *Tab. hist. Ic.* 6. 492. est Hieracium dentis leonis folio monoclonon sub asperum CBp. 121. & *sic bis in pinace occurrit quod in prodr.* 62. *describitur & cum Jeon. Tabern. exacte convenit.* auf dem Gansau, gegen dem Jäger-Hof.

Hieracium pratense latifolium non sinuatum majus Haller. caule aphyllo striato, breit blättricht Wiesen Habich-Kraut, zwischen Hördt und Brumbt auf denen Wiesen. *vid. Tab. nostr.* VII.

Hiera-

Hieracium dentis leonis folio obtuso majus T. five Hieracium longius radicatum *Tab. hist. Ic.* 7. 492. Habich-Kraut, mit Pfaffen-Röhrlein Blättern, und langen Wurtzeln, auf denen Wiesen bey Oßwald, an denen Reben bey Baar. *perenn.*

Hieracium minus glabrum, foliis eleganter virentibus T. & CB. prodr. 63. auf denen Aeckern bey Ehrstein *perenn.*

Hieracium murorum folio pilosissimo T. five *Pulmonaria gallica vel aurea Ic. Tab. hist.* 1. 504. est Pulmonaria flore luteo *IB.* 2. 1033. haaricht Habich-Kraut, auf alten Mauren und Dächern, in Waldungen. *perenn.*

Horminum sylvestre latifolium verticillatum T. five Horminum sylvestre Clus. hist. XXIX. *flore monopetalo labiato cœruleo*, est Horminum spurium Rivin. an denen Landstrassen, und an denen Aeckern, gegen Siegelsheim. *perenn.*

Hydroceratophyllum, folio lævi, octo cornubus armato Vaill. & plus diviso, gehörntes glattes Wasser Garben-Kraut zu Illkirch, zwischen denen Wörten. *perenn.*

Hyoscyamus vulgaris & niger T. *caule folioque piloso, flosculis monopetalis infundibuliformibus luteis striatis, radice alba, fructu campaniformi operculato*, Bilsam-Kraut, *Iusquiame noir, Ic. Tab. hist.* 68. & *in Rivin.* an denen Landstrassen, in der Ruprechtsau an denen Gärten-Zäunen. *perenn.*

Hype-

Hypericum vulgare T. *floribus luteis rosaceis, foliis glabris conjugatis caule rotundo, fructu tricapsulari:* sive Perforata *IB.* 3. 387. *Milkepertuis* St. Johannis Kraut, *Ic. Tab. hist.* 1. 1249. *perenn.*

Hypericum ascyrum dictum caule quadrangulo T. & *IB.* 3. 382. sive *Hypericum glabrum non perforatum, caule quadrato sub rubro, flosculis luteis minoribus.* hart Heu, oder St. Johannis Kraut, mit 4. eckichten Stenglen, *Ic. Tab. hist.* 4. 1250. & *Hort. Eyst. Tab.* 247. in denen Wörten bey Illkirch, in groser Meng, *perenn.*

Hypericum minus erectum T. seu pulchrum Tragi *IB.* 3. 353. klein aufrecht stehend Johannis Kraut, an dem Weg nach Blobsheim, in dem Brumbter Wald. *perenn.*

Hypericum minus supinum glabrum T. & repens sive Hypericum supinum tertium minimum Clus. hist. CCCXXXI. klein niedrch kriechend St. Johann Kraut, auf Brach-Aeckern, bey Oßwald und Illkirch, *perenn.*

Hypericum elegantissimum non ramosum folio lato T. & *IB.* 3. 383. hart Heu, ohne Zweig und breiten Blättern, in dem Eckbolsheimer Wald, bey dem Canal, in denen Hecken, auf der Gansau: *perenn.*

Hypericum villosum erectum caule rotundo T. sive *Hypericum Androsæmum dictum IB.* 3. 382. Conrads-Kraut, auf dem Paßberg neben denen Hecken, in groser Menge, auf dem St. Ottilien Berg. *perenn.*

Hyssopus officinarum cœrulea seu spicata T.

Isop

Jsop *flore monopetalo labiato semine oblongo*, Kirch-Jsop, mit blauen Blumen, *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 651. in Gärten, und auf denen Kirch-Höfen. *perenn.*

Eadem flore rubro & albo T. ibid.

Jacea pumila supina purpurea *Vaill. pag.* 203. *foliis latis integris radice repente*, est Cyanus latifolius repens CBp. 274. fast auf allen dürren grasichten Orten und Wiesen. *perenn.*

Jacobæa vulgaris laciniata T. & *IB.* 1057. *flore luteo radiato semine papposo*, St. Jacobs-Blum, *Fleur de St. Iacque Ic. Tab. hist.* 485. hin und wieder an denen Strassen, *perenn.*

Jacobæa vulgaris foliis instar Erucæ laciniatis T. sive *Jacobæa vulgaris altissima*, *foliis artemisiæ æmulis*, St. Jacobs-Blum, mit Beyfuß Blättern, an dem Eckbolsheimer Canal, Schliesse, in dem Gebüsch. *perenn.*

Jacobæa montana lanuginosa angustifolia non laciniata T. sive *Pannonica, folio non laciniato IB.* 2. 1058. quæ Jacobæa II. Clus. hist. XXII. gegen Hochfeld, in dem Hohenwald, *perenn.*

Imperatoria major T. *flore albo rosaceo umbellato flore latiore diviso*, *radice alba crassa odorata*, *semine ovato striato*, Meister-Wurtzel, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 238. & *in Rivin. Imperatorie*, in vielen Gärten. *perenn.*

Juncago palustris & vulgaris T. flore roseo sive *Gramen junceum & spicatum seu Triglochin IB.* 2. 508. gedhrt lang gespitztes Binsen-Graß in der Ruprechtsau auf der Schiffmatt. *perenn.*

Jun-

bey vorherstehenden und an dem Rhein Ziegel-Ofen, *perenn.*

Lapathum folio acuto rubente T. sive *Lapathum sanguineum*, *Munting. hist.* 691. & *IB.* 2. 988. *alias Sanguis draconis herba.* Drachen-Ampfer, roth Mengel-Wurtzel, *Sang de dracon ou Patience rouge Ic. Tab. hist.* 824. hin und wieder auf denen Aeckern, in Feldern und Gärten. *perenn.*

Lapathum folio minus acuto Lob. Ic. 285. seu *vulgare folio obtuso. IB.* 2. 984. auf dem Schießrein und Illkirch, an dem Wasser. *perenn.*

Lapathum pulchrum Bononiense sinuatum T. & *IB.* 2. 988. in denen Wörten bey Illkirch, *perenn.*

Lathyrus sylvestris major T. seu dumetorum *IB*, 2. 302. *flore suave rubente papilionaceo*, *fructu siliquoso*, *c.* 4. *Tab. hist.* 885. la Gesse & H. Eyst. & in Rivin. Waldwicke, in denen Hecken bey Oßwald, *perenn.*

Lathyrus angustifolius siliqua hirsuta T. sive *Lathyrus siliqua hirsuta IB.* 2. 305. est *Lathyrus sylvaticus siliqua hirsuta Rivin.* Wicke mit schmahlen Blättern, und haarichter Schote, hin und wieder in denen Frucht-Feldern, zu Gravenstaden häufig. *ann.*

Lenticula palustris quadrifolia CBp. sive *Lens palustris quadrifolia IB.* 3. 785. *radice repente*, vierblättrichter Wasser-Klee. *Lentille à quatres feuilles Ic. elegans Mapp. hist. alsat.* 166. & *Tab. hist.* 2. *pag.* 890.

p. 216.

Tab. IX

Cassida palustris minima T.



J. Striedbeck. sculp

p. 205. Tab. VII

Alsine pusilla graminea flore tetrapetalo T.



J. Striedbeck. sculp.


p. 136.
Epimedium. T.
Tab. VI
I. Striedbeck. sculp.

890. in sumpfichten Orten, vor dem Fischer und Spithal-Thor. *perenn.*

Lenticula aquatica trisulca CBp. sive *Hederula aquatica.* Lobel. *Ic.* 2. *pag.* 36. est *Hederula palustris Tab. hist.* 1281. flore dipetalo, Wasser-Linsen, Wasser-Epheu, mit 3. spitzigen Blättern, in denen Gräblein am Huren-Graben, wie auch in Gräben, neben der Aubruck. *perenn.*

Lenticula palustris vulgaris CBp. sive *Lens palustris IB.* 3. 784. *Ic. Tab. hist.* 890. ubi Ic. sed minus accurata. & Vaill. Tab. XX. fig. 2. Wasser- oder Endten-Linsen, in allen stillstehenden Wasser-Gräben. *Lentille d'eau, ou de marais, ann.*

Lenticula palustris superne virens, inferne nigricans, IB. 3. 784. seu potius *Lenticula palustris, foliis majoribus, subtus rubentibus*, Flor Altorf. Ic. Vaill. Tab. XX. fig. 2. grose Wasser-Linsen, in denen Gräben, bey der Schiffmatt, bey denen Eckbolsheimer Ziegel-Ofen. *ann.*

Leucanthemum vulgare T. *caule folioso, flore radiato*; sive Bellis major IB. 3. 114. Gänse-Blumen, grose weise Maßlieben. *Ic.* 1. *Tab. hist.* 710. aller Orten auf den Wiesen. *perenn.*

Lichen arboreus sive Pulmonaria arborea T & IB. 3. 759. *Pulmonaire de Chene, Lichen arboreum Ic. Tab. hist.* 1. 1199. Lungen-Mooß, Baum Lungen-Kraut, in allen Waldungen, an alten Eich- und Buch-Bäumen. *perenn.*

Lichen pulmonarius saxatilis maximus cinereus. T. Stein oder Felsen Lungen-Kraut, auf dem Ottilien Berg, an denen Felsen. *perenn.*

Lichen cinereus arboreus, marginibus fimbriatis T. an alten Stämmen, der Weyden-Bäumen, in dem Ruprechtsauer Wald. *perenn.*

Lichen pyzidatus, acetabulorum oris coccineis & tumentibus T. an Stämmen, abgefaulter Bäume, in dem Hanßauer Wald, und an denen Steinen, St. Ottilien Gebürgs. *ann.*

Lichen cinereus vulgaris capillaceo folio minor T. sive Muscus arboreus cum & sine orbiculis, Baum-Mooß, blühend ästiges Baum-Mooß. *Ic. 2. & 3. Tab. hist.* 1195. in Waltungen, zwischen denen Aesten, erwachsener Eich-Bäume, *perenn.*

Lichen cinereus latifolius ramosus T. sive Muscus arboreus coralloides CBp. Ic. Vaill. Tab. XX. fig. 6. Baum-Mooß mit Zweigen, an denen Eich-Bäumen, in dem Wald, zu Schweighausen. *perenn.*

Lichen capillaceus longissimus, ex fago & abiete pendens T. coroll. an Muscus arborcus barbatus IB. 3. 764. groß hangend Baum-Mooß, an alten Eich und Bircken-Bäumen, zu Schweighausen. *perenn.*

Lichen fruticosus pendulus candicans, extremitatibus cauliculorum umbilicatis coccineis! Mapp. hist. alf. 170. in den XV. Wört, in einem quellenden Wasser-Loch.

Lichen petræus latifolius, sive Hepatica fontana CBp: & IB. 3. 758. est Lichen Fuchs. ubi Ic. elegans 476. Brunnen oder Steinleber-Kraut, in denen unsaubern Brunnen-Bütten. *perenn.*

Li-

Lichen petræus stellatus aut Lichen. 2. Lob. Ic. 246. est Hepatica secunda *Tab. hist. Ic. 2. pag.* 1200. Stein Leber-Kraut, in wässerichten und schattichten Gärten.

Lichen petræus umbellatus sive 3. Lob. Ic. 246. vel Hepatica III. Tab. hist. pag. 1200. bey Quellen und Bächlein, in dem Urbis-Thal, auch in feuchten Gärten.

Lichen minimus foliolis laciniatis. Ray. hist 126. bey dem St. Ottilien Brunnen, an denen Felsen, neben der Quelle.

Lilium montanum floribus reflexis rubentibus T. *radice flava squamata, fructu oblongo*, sive Lilium flore rubente ferrugineo majus & minus IB. 2. 692. est Martagon vulgare *Tab. hist.* 4. 1029. & Garidel hist. plant. Tab. 63. wilder türckischer Bund, oder Gold-Wurtzel, Heyden-Lilien, auf denen Gebürgen gegen Hochfeld. *perenn.*

Lilium montanum floribus reflexis albis non punctatis T. Gold-Wurtzel, mit gantz weisen Blumen, auf dem Hochfeld, und eine Stund hinter Hochfeld. *perenn.*

Lilium floribus reflexis montanum, flore maculis rubris inordinatis adsperso T. sive Lilium montanum flore purpurascente punctato HEyst. Gold-Wurtzel, mit punctirten Blumen, auf dem Gebürg, bey Sirrbaden, *perenn.*

Lilium floribus reflexis alterum lanuginosum hirsutum T. sive Lilium montanum, vel sylvestre 1. majus Clus. hist. 134. Berg-Lilien, bey

Mollkirch, auf dem Gebürg, bey den 3. Aehren. *perenn.*

Lilium purpuro croceum majus T. Feuer oder Gold-Lilien, sive Lilium rubens majus IB. 2. 688. auf dem Hochgebürg, hinter Rappolsweyer, in groser Menge. *perenn.*

Linaria pumila arvensis vulgatior T. *seu Antirrhinum minus arvense, floribus monopetalis personatis, fructu subrotundo Ic. Tab. hist.* 4. 1236. *& in Rivin.* est Antirrhiuum minimum IB, 3. 465. wild Löwen-Maul, klein Feld-Orant, hin und wieder auf denen Aeckern *ann.*

Linaria flore pallido rictu aureo T. sive Linaria Pannonica 1. Clus. hist. 322. Lein oder Flachs-Kraut, mit bleich gelben Blumen, auf aufgeworfenen Gräben, und an denen Strassen. *Ic. Tab. hist.* 1. 1208. *perenn.*

Linaria vulgaris lutea, flore majore T. & IB. 3. 456. *Lin sauvage*, Lein-Kraut, mit schönen grosen gelben Blumen, *Ic. Tab. hist.* T. 1210. bey allen Lüften, bey denen Sand-Gruben, an der Landstraß gegen Moltzheim. *perenn.*

Linaria vulgaris lutea flore minore T. an dem Zaun des Schliessenmeisters Garten, am Canal, auf dürren Wiesen bey Oßwald.

Linaria vulgaris flore majore alba T. *rictu aureo* Lein-Kraut, mit weisen Blumen, auf einem kleinen Hügel, vor dem Bad zu Sultz, an denen Zäunen bey der Eckbolsheimer Ziegel-Hütte, bey der ersten Bleich, unterhalb dem Wasser Zoll. *perenn.*

Lina-

Linaria segetum nummulariæ folio villoso T. *ex albido flavescente*, sive Elatine folio subrotundo IB. 3. 372. niedrig Acker Lein-Kraut, mit bleich gelben Blumen und Epheu-Blättern, *Ic. T. Tab.* 1091. & *in Rivin.* auf denen Frucht-Aeckeren nach vollendter Erndte, zu Illkirch und Oßwald *ann.*

Linaria segetum nummulariæ folio auriculato villoso, flore luteo T. sive Elatine fæmina folio anguloso IB. 3. 372. niedrig klein Acker Lein-Kraut, mit rauhen Blättern, *Ic. Tab. hist. 2. pag.* 1091. zu Barr, in denen Gruben am Weg, wenn man auf hohen Landsspurger Schloß gehen will. *ann.*

Linum arvense T. *flore caryophyllæo cæruleo fructu globoso*, wilder Flachs, auf den Aeckeren bey Inlenheim, unter dem Habern, auf dem Glacis, beym Rheingiesen, *ann.*

Linum sativum T. seu vulgare cœruleum zahmer oder Weiber-Flachs, Spinn-Flachs. *Ic. Tab. hist.* 1205. auf denen Aeckeren. *ann.*

Linum sylvestre angustifolium, floribus dilute purpurascentibus, vel carneis T. sive Linum sylvestre VI. angustifolium Clus. hist. 318. est *Linum III. Tab. hist. pag.* 1207. wilder Lein oder Flachs-Kraut, mit röthlichten Blumen, und schmahlen Blättern, zwischen Oßwald und Gravenstaden, auf dem Steinbruch, bey dem Sultzbad häufig. *perenn.*

Linum sylvestre angustis & densioribus foliis, flore minore T. sive Linum sylvestre tenuifolium

nuifolium Lob. Ic. 413. est Linum sylvestre IV. Tab. hist. 1207. schmahl blättrichter wilder Flachs, auf der Wiesen zu Oßwald häuffig. *perenn.*

Linum pratense flosculis exiguis T. seu Linum minimum IB. 3. 455. est Linum Catharcticum Wedel. klein Wiesen Flachs, klein Vogel-Kraut, auf Wiesen zwischen dem Ostwinckel und Hohenwart, in der Ruprechtsau, wie auch in der Elsau und Kaltau. *perenn.*

Lithospermum majus erectum T. sive Lithospermum aut Milium solis IB. 3. 500. *floribus monopetalis infundibuliformibus albis* sive Lithospermum arvense *Tab. hist.* 1234. *Gremil ou Herbe aux Perles*, Meer oder Stein-Hirse, in der Ruprechtsau am Garten, bey der Aubruck im Ostwinckel. *perenn.*

Lithospermum arvense minus floribus luteis, vel luteo cœruleis T. kleine blaugelbe Mauß-öhrlein, mit harichten Blättern, vor dem Spithal-Thor, auf denen Frucht-Felderen bey Niederhaußbergen. *ann.*

Lithospermum arvense minus T. sive Echium scorpioides solisequum, flore minore IB. 3. 589. *cœruleo monopetalo infundibuliformi, folio integro aspero*, blaue Mauß-Oehrlein, *Ic.* 1. *Tab. hist*, 511. *petit gremil*, auf allen ungebauten Feldern. *ann.*

Lithospermum arvense medium, flore cœruleo Vaill. sive Auricula muris Lob. Ic. 461. grosse blaue Mauß-Oehrlein, mit harichten Blättern,

tern, in der Ruprechtsau in trockenen Gräblein, in dem Gansauer Wald.

Lithospermum arvense medium, flore albo Mappi hist. alsat. pag. 179. grose weisse Mauß-Oehrlein, in dem Barrer Wald, nahe der Ertz-grub, gegen Hochfeld. *ann.*

Lotus seu Melilotus pentaphyllos minor glabra T. sive Trifolium siliquosum, *fructu sub-rotundo, Tab. hist, Ic. a.* 905. est Lotus corniculata glabra minor IB. 2. 356. fünff blättrichter Lotus, kleiner Schoten-Klee, auf denen Wiesen in der Gansau, in der Rupprechtsau. *perenn.*

Lotus corniculata hirsuta minor T. IB. 2. 356. kleine Vogelwicke, mit rauhen Blättern, in sandigen Orten, in steinichten Gruben, bey der Rheinbruck. *perenn.*

Lupinus sylvestris flore luteo T. *floribus papilionaceis, foliis digitatis seu stellatis, fructu siliquoso,* Wicken Bohnen, Lupinen, *Lupin. Ic. 3. Tab. hist.* 881. in Gärten, und Gartners-Feldern. *ann.*

Luteola herba salicis folio T. sive Lutea Plinii quibusdam IB. 3. 465. *integro folio, flore luteo polypetalo anomalo.* Streich-Kraut, *Gande ou herbe á jaunir Ic. Tab. hist.* 319. auf denen Wällen / und auf allen Glacis. *perenn.*

Lychnis segetum major T. sive Pseudomelanthium *IB.* 3. 314. & *HEyst. Ic.* 5. *Tab. hist.* 674. Raden, unter der Frucht, aller Orten. *ann.*

Lychnis segetum rubra foliis perfoliatæ T. Vaccaria dicta *IB.* 3. 357. *Ic. Tab. hist.* 3. 1253. Küh-Kraut, in denen Sommer-Feldern. *ann.*

Lychnis segetum rubra, foliis perfoliatæ, flore pallido T. Küh-Kraut, mit bleich rothen Blumen, auf denen Aeckern gegen Niederhaußbergen. *ann.*

Lychnis sylvestris angustifolia, caliculis turgidis striatis T. *folio incano, sive altera incana*, *Lobel. Ic.* 338. Wald-Rößlein, mit aufgeblasenen und gestriften Kelchen, *Passe fleur.* aller Orten auf der Glacis *perenn.*

Lychnis sylvestris latifolia, caliculis turgidis striatis T. *foliis hirsutis*, sive Lychnis sylvestris III. Clus. hist. *caliculis striatis*, & *Lob. Ic.* 339. zu Waßlenheim. *perenn.*

Lychnis papaver spumeum angustifolia glabra, flore purpureo Moris, Prælud. 284. & T. *caule inferius intense rubro*, auf dem Glacis, vor dem Spithal-Thor, gegen der Ill. *perenn.*

Lychnis sylvestris quæ saponaria vulgo T. sive Saponaria vulgaris *IB.* 3. 346. *flore ex albido purpurascente rosaceo, folio glabro. Savoniere*, Seiffen-Kraut, an denen Strassen, bey Hohnheim. *perenn.*

Lychnis sylvestris, quæ Saponaria vulgo, *apicibus violaceo purpureis*, & *majoribus odoratis*, Seiffen-Kraut, mit Viol blauen Zünglein, bey Höhnheim häuffig. *perenn.*

Lychnis sylvestris, quæ Saponaria vulgo, flore albo. Vaill. Seiffen-Kraut, mit weisen Blumen, oberhalb Blobsheim, auf der Kraft, am Wasser, *perenn.*

Lysima-

Lysimachia humifusa, folio rotundiore, *flore luteo.* T. *monopetalo rotato, fructu globoso*, sive Nummularia vel Centimorbia IB. 3. 370. Pfennig oder Egel-Kraut, *Ic. Tab. hist.* 1261. auf feuchten Wiesen, bey der Schlut, bey allen Lüften, *perenn.*

Malva vulgaris folio sinuato, flore majore T. *monopetalo campaniformi, fructu orbiculari* sive Malva sylvestris major, Papellen, Roßpapellen, mit gestriften rothen Blumen, auf ungebauten fetten Orten, in denen Hecken, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Malva vulgaris flore minore, folio rotundo, T. & IB. 2. 949. sive Malva sylvestris minor *Tab. hist.* 1150. *Petite Mauve*, gemeine Käß oder Gänse papellen, an denen Wegen, aller Orten, an der Mauer alter Stadt-Gräben, *perenn.*

Matricaria tanacetifolio, flore minore, semine umbilicato T. oblongo, sive Tanacetum inodorum II. Clus. hist. 338. Berg Mutter-Kraut, mit kleinen Blumen ohne Geruch, auf dem Gebürg, in dem Urbis-Thal, oberhalb Kaysersberg, *perenn.*

Matricaria tanacetifolio flore majore, semine umbilicato T. sive Tanacetum inodorum I. Clus. hist. 338. Berg Mutter-Kraut, mit grosen Blumen, auf dem Hochgebürg zu Rappolstein / und oberhalb Dusenbach, in denen Gebüschen. *perenn.*

Medica sylvestris floribus croceis T. sive

Medica flavo flore Clus. hist. CCXLIII. est Lens major repens, *Tab. hist. Ic.* 123. in Rivino nominatur Falcata, nobis vero Medicago est sylvestris, *floribus croceis papilionaceis*, *fructu falcato*, Sichel-Klee, grose kriechende Linsen, mit gelben Blumen, auf der Contrescarpe, vor dem Cronenburger und Steinstrasser Thor ganze Plätz voll. *perenn.*

Melampyrum coma purpurascente T. *flore monopetalo personato* & in Rivin, sive Triticum vaccinum IB. 3. 439. *fructu subrotundo bifario*, Buch oder Küh-Weitzen, Wachtel-Weitzen, *Ble de Vache*, in der Frucht, zu Lingelsheim und Oßwald. *ann.*

Melampyrum coma cœrulea T. sive *Melampyrum sylvaticum Rivin Ic.* 1. *Tab. hist.* 553. Wald Küh-Weitzen, mit blauen Strauß, in dem Ostwinckel und Wald, zu Zabern. *ann.*

Melampyrum cristatum, flore purpureo albo T. & *IB.* 3. 440. *rictu luteo*, *foliis angustis*, in denen Frucht-Aeckern, zu Ittenheim.

Melampyrum luteum latifolium T. *rictu albo* gelber Küh-Weitzen, est Milium sylvaticum *Ic.* 1. *Tab. hist.* 555. auf dem St. Ottilien Gebürg, auf der Oßwalder Nacht-weyde. *ann.*

Melampyrum flore albo Mapp. hist. Alsat. p. 190. Buch-Weitzen, mit weissen Blumen, zwischen Juleuheim und Niederehenheim, auf dem Paßberg, zu Buchsweyler. *ann.*

Melilotus officinarum Germaniæ T. *flore luteo*

teo papilionaceo odorato, radice longa alba, seu Melilotus vulgaris, flore luteo IB. 2. 370. est Melilotus Germanica Lobel. Icon. 43. & Tab. hist. 895. ut & in Rivin. *Melilot*, gemeiner Stein-Klee, in der Ruprechtsau, und zu Lingelsheim, auf den Feldern. *perenn.*

Melilotus officinar, germaniæ, flore albo T. *semine subrotundo*, weiser Stein-Klee, an dem Canal, bey Eckbolsheim, bey denen Schantzen vor dem Fischer-Thor, auf der kleinen Insul, bey der Rhein-Bruck. *perenn.*

Melilotus vulgaris altissima frutescens, flore albo T. hoch aufgeschossener Stein-Klee, mit weisen Blumen, zwischen beyden Rein-Brucken, auf denen aufgeworfenen Werckern.

Melilotus vulgaris altissima frutescens, flore luteo T. groser Stein-Klee, mit gelben Blumen, bey dem Mauerhof, am Canal, zu Eckbolsheim, bey der Brucken, zwischen beyden Rhein-Brücken, an dem Weg. *perenn.*

Melilotus major odorata violacea T. Siebengezeit, mit blauen Blumen, *Lotier bleu Ic. Tab. hist.* 896. auf grasichten Boden, bey dem Engelländischen Hof. *perenn.*

Melissa hortensis T. seu vulgaris, odore Citri *IB. 3. part. 2. 232. floribus monopetalis labiatis albis, semine subrotundo, Melisse*, Mutter-Kraut, *Ic. Rivin & Tab. hist.* 757. *perenn.*

Melo rotundus parvus T. sive Sacharinus *Tab. hist. Ic.* 3. 856. *flore monopetalo campaniformi, fructu luteo ovato. Melon sucrée*, Zucker-Melonen, in Gärten, *ann.*

Melo

Melo vulgaris T. & IB. 2. 242. gemeine Melonen, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 885. *ibid. ann.*

Melo reticulatus T. & IB. 2. 244. Netz-Melonen, *ibid. ann.*

Mentha sylvestris rotundiore folio T. sive Menthastrum, *folio rugoso rotundiore, flore albo monopetalo labiato spicato, odore gravi, Ic.* IB. 3. *part.* 2. *pag.* 219. wilde Müntz, wilder Balsam, *Menthe sauvage Ic. Tab. hist.* 729. vor dem Spithal-Thor, auf dem Schießrein, bey Oßwald an der Landstraß. *perenn.*

Mentha sylvestris longiore folio T. sive Menthastrum spicatum, folio longiore candicante, *IB.* 3. *p.* 2. 221. *hirsuto, floribus sub purpurei coloris spicatis*, Roß oder Pferd-Müntze, Ic. Rivin & Fuchs hist. plant. Matthiol. Epitom. 489. *Mente sauvage.* an denen Rändern der Wasser, gegen der grünen Wart, und andern Orten mehr. *perenn.*

Meum fol. anethi T. sive Meum vulgare *IB.* 3. *p.* 2. 11. *florib. alb. rosaceis umbellat. Ic. Clus. hist.* CXCVIII. & *in Rivin.* Bärwurtz, Bären-Fenchel, auf der Wiese, des Hochgebürgs Hochfelds, häufig. *perenn.*

Millefolium nobile T. sive *Tanacetum minus album, odore camphoræ*, vel Achillea millefolia odorata, IB. 3. 140. weiß edel Garben-Kraut, auf Brach-Aeckern zu Ostheim. *perenn.*

Muscus squamosus vulgaris repens clavatus T. sive Lylopodium *Tab. hist. Ic.* 3. 1199. *Julis semine farinaceo refertis Pate. de Loup.* Bärlapp, St. Joh.

Joh. Gürtel, in dem Gebürg, hinter Waßlenheim, in dem Börser Wald, hinter dem St. Ottilien Gebürg. *perenn.*

Muscus capillaceus major, pediculo & capitulo crassioribus T. sive Adiantum aureum *Tab. hist. pag.* 1186. Tausend Gulden Wiederthon, *Perce mousse*, an feuchten sumpfichten Orten, hinter Ottrott. *perenn.*

Nasturtium hortense crispum latifolium T. *flore albo simplici cruciformi, fructu subrotundo*, krauser groß blätterichter Garten-Kresse, *Cresson frisee à feuilles larges Ic. CB. prodr.* 44. *& Tab. hist. Ic. IV.* 842. in Gärten. *ann.*

Nasturtium hortense latifolium T. breiter Garten-Kresse. Ic. Matthiol. Epitom. 156. *ann.*

Nasturtium sylvestre capitulis cristatis T. sive Nasturtium verrucosum IB. 2. 919. *foliis coronopi, flosculis albis cruciformibus*, *Ic. Tab. hist.* 4. *pag.* 302. Feld-Kresse, an denen Wegen und ungebauten Orten, auf dem Schießrein. *ann.*

Nasturtium sylvestre tenuiter incisum, fructu minori T. sive *Thlaspi angustifolium* Fuchs. *Ic. Tab.* 16. 853. Besam-Kraut, an denen Wegen vor dem Spithal-Thor, vor dem Steinstrasser Thor, an der Landstraß, nach Schiltigheim, neben denen Aeckern, *ann.*

Nasturtium sylvestre tenuissime divisum T. kleiner wilder Kresse Weg-Kresse, neben den Aeckern am Pfad-Weg, nach Eckbolsheim, bey der Carthauß häufig. *ann.*

Nymphæa alba major T. *flore rosaceo multiplici*

ci radice tuberosa longa & filamentosa. IB. 3. 772. & *Tab. hist.* 1. 1117. *Nenufar blanc*, weise Wasser-Lilien, weise See-Blumen, in dem Graben auf der Wiese, bey der grünen Wart häufig, *perenn.*

Nymphæa lutea major T, *fructu globoso multicapsulari* & IB. 3. 771. Ic. *Tab. hist.* 3. 1118. & HEyst. *Nenufar jaune*, gelbe See-Blumen, in denen Stadt-Gräben, vor dem Juden-Thor, bey Gravenstaden, bey dem Zoll. *perenn.*

Nymphæa alba minor H Eyst. kleine weise See-Blum, in stillen Wassern, zwischen Oswald und Gravenstaden, in dem Gräblein hinter dem Rhein Ziegel-Ofen., *perenn.*

Nymphæa alba minima, foliis asari, floribus tripetalis albis *longis pediculis, radice filamentosa longa*, nobis; quæ *Ranæ morsus Tab. hist. Ic. pag.* 1131. Frosch-Biß, in allen Gräben um die Stadt. *perenn.*

Oenanthe aquatica T. sive Filipendula aquatica IB. 3. *part.* 2. 191, *Tab. hist*. Ic. 4. 424. *flosculis albis, rosaceis umbellatis, semine oblongo striato* & *in Kivin.* Wasser Stein-Brech, auf allen sumpfichten Wiesen, in Gruben, vor dem Spithal-Thor. *perenn.*

Oenanthe seu Filipendula aquatica altera IB. 3. part. 2. 192. quæ Ruta palustris *Tab. hist.* Ic. 2. 421. Wasser Filipendel Wurtzel, zwischen Arbogast und dem Wickhäusel, in sumpfichten Gruben, *perenn.*

Ophioglossum vulgatius T. sive *Ophioglossum*

IB. 3.

IB. 3. 708. flosculis in oculos non cadentibus foliis, crassis, angustis oblongis, fructu lingulato Ic. Tab. hist. 1232. Natter-Zünglein, *Langue de serpent*, auf denen Bergmatten / bey Baar und hohen Andlau, *perenn.*

Ornithopodium majus T. seu Ornithopodium, flore flavescente *IB. 2. 313. papilionaceo, siliqua recurva articulata, radice tuberculis nodosa, fructu siliquoso articulato falcato, semine subrotundo.* Vogel Fuß-Pfote, auf dürren Aeckern, bey Bofsheim, in dem obern Ried. *ann.*

Ornithopodium minus T. sive Perpusillum Ornithopodium, Lob. Ic. 82. auf brachliegenden Aeckern, bey Hagenau und Schweighausen, *ann.*

Orchis muscam referens major T. sive Orchis myodes, flore grandiusculo *IB. 2. 767. testiculata absque calcari, flore grandiusculo*, grose Mucken præsentirende Stendel-Wurtzel, in ausgesteckten Hölzern, und andern trockenen grasichten Orten zu Holtzheim / *Orchis semblent une grande Mouche Ic. Tab. hist. 3. 1050. & Lob. Ic. 182. perenn.*

Orchis palmata montana, maculata, flore variegato, Mapp. sive Palmata maculata *IB. 2. 775.*

Orchis corpus muscæ referens minor T. testiculata, sine calcari, sive Orchis Myodes galea est alis herbidis IB. 2. 761. Vaill. p. 147. est Orchis Myodes I. Lob. Ic. 181. kleine Stendel Wurtzel, mit grünen Mücklein, auf dem Haulenberg häufig *perenn.* Or-

Orchis muſcam referens lutea T. ſive Orchis Myodes lutea *IB.* 2. 768. *teſticulata cum calcari & foliis tribus Ic. Tab. hiſt.* 2. 1050. gelb Stendel-Wurtzel, in dem Jllkircher Wald. *perenn.*

Orchis, parva ſeu Monorchis floſculis luteis minoribus moſchum olentibus, bulbo unico, nobis, quæ Orchis parva autumnalis lutea IB 3. 768. gelb wohlriechend Knaben-Wurtzel, mit einer Ziebel, zu Hangenbietheim und auf dem Haulenberg.

Orobanche hypopitys lutea Dillen cat. Giſſ. 99. quæ Hypopytis Rivin. *floſcul. muſcoſis clauſis, in ſpicam congeſtis fructu oblongo quinquecapſulari*, gelbe Wald-Wurtzel, oder Schuppen Wurtzel, in dunckelen uud ſchattichten Waldungen, hinter dem Ottilien Berg. *perenn.*

Oſmunda foliis lunatis T. ſive *Ruta lunaria, Tab. hiſt. Ic.* 413. *Lunaria Botrytis IB.* 3. 709. kleine Mond-Raute, *Lunaire*, auf dem Gebürg, beym Lichtenberger Schloß, und hinter Waſſenburg, in dem Dettweiler Wald häufig. *perenn.*

Oxycoccus ſive Vaccinia paluſtris T. & IB. 7. 525. *flore albo roſaceo fructu globoſo* Mooßbeeren, Keſſelbeeren, *Canneberge* zu Boſelshauſen, und in dem Hagenauer Forſt. *Ic. H. Eyſt. perenn.*

Pedicularis ſerotina, purpuraſcente flore T. ſive Euphraſia parva purpurea *IB.* 3. 433. eſt Odontites Tabern. & Rivin. rother Augen-Troſt, Wieſen Rötel, zu Oßwald, auf denen Wieſen, wie auch zu Gravenſtaden. *ann.*

Pedicularis ſerotina flore albo Vaill. Wieſen Rödel mit weiſen Blumen, auf feuchten Wie-

ſen,

sen zwischen dem Mayer-Hof, und dem Eckbols-heimer Ziegelofen *ann.*

Pentaphylloides palustre rubrum T. sive Quinquefolium seu potius Heptaphyllum flore rubro *IB.* 2. 398. est *Quinquefolium palustre Tab. hist. Ic.* 12. 354. *foliis superne viridibus, inferne cinereis serratis, floribus purpureis rosaceis Ic. Hort. Eyst.* auf sumpfichten Wiesen, zu Wört, zu Wimmenau, hinter Buchsweyler. *perenn.*

Pepo oblongus T. *flore luteo monopetalo campaniformi fructu oblongo Ic. Tab. hist.* 8. 857. grose gemeine Kürbse, hin und wieder an denen Reinen der Reben, auch gantze Aecker voll, aller Orten auf dem Land. *ann.*

Pepo vulgaris T. sive *major rotundus, flore luteo folio aspero non maculato*, quæ Cucurbita sive Zucha *IB. Ic.* 2. 218. grose runde Kürbse ibid. *ann.*

Pepo vulgaris sive Cucurbita major, foliis asperis albis maculis pictis, *fructu rotundo* nobis. grose runde Kürbse, mit rauhen weiß gespreckten Blätteren, ibid. *ann.*

Peucedanum germanicum T. *flore rosaceo umbellato semine ovato* sive *Peucedanum minus Germanicum IB.* 3. *part.* 2. 36. vel Peucedanum Fœniculum porcinum Lobel. Ic. 781. *Ic. Tab. hist.* 1. 163. est Hippomarathrum Rivin. Haar Strang, auf der Contrescarpe, vor dem Metzger-Thor, auf denen Wiesen, zu Oswald, *perenn.*

Phaseolus vulgaris T. sive Smila hortensis

IB. 2. 255. flore papilionaceo purpureo, foliis ternis uno pediculo scandente, absque capreolis, fructu longo, semine reniformi, gemeine Bohnen, mit rothen Blumen, *Ic. Tab. hist.* 876. & *Lobel.* 59. in Gärten, und auf denen Felderen, *ann.*

De hoc genere plures dantur species & varietates quoad fructum, & colorem. vide Tournef. Inst. pag. 412. die man bey denen Ackersleuten findet.

Phaseolus major HLB. sive Smilax hortensis major, fructu ex rubro & nigro variegato, flore coccineo. grose gemahlte Türckische Bohnen, in Gärten, *ann.*

Phaseolus major sive Smilax hortensis major fructu ex rubro & nigro variegato, *flore candido.* grose gemahlte welsche Bohnen, mit weisen Blumen, ibid. *ann.*

Phellandrium T. & Rivin. vel Cicutaria aquatica quorundam *IB. 3. part. 2.* 183. *tenuifolia flore rosaceo umbellato albo, caule crasso, semine gibbo leviter striato, & Tab. hist. Ic.* 3. 1170. *Cique en marais*, in Gräben, stillstehender Wasser, in dem Graben gegen der Ziegel-Hütte, wenn man an Wasser-Zoll gehen will, *perenn.*

Polygala major T. & *IB.* 3. 357. *flore anomalo polypetalo personato, folio longo & angusto, fructu compresso, semine oblongo*, blaue Creutz-Blümlein, *Tab. hist. Ic.* 2. 1212. an feuchten Wiesen, und andern grasichten Orten, bey Heilgenstein. *perenn.*

Polygala major alba T. Kreutz Blümlein, mit weisen Blumen, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1212. ibid. *perenn.*

Polygala major purpurea *Tab. hist. Ic.* 3. 1212. rothe Creutz-Blümlein.

Poly-

Polygala vulgaris T. five *Polygalon multis* IB. 3 386. vel. *Polygala cærulea Tab. hist. Ic.* 5. 1213. gemeine blaue Creutz-Blümlein, *Ic. Hort. Eyst.* auf allen feuchten Wiesen, und andern grasichten Orten. *perenn.*

Polygala alba T. & *Tab. hist. Ic.* 7. 1213. Kreutz-Blümlein, mit weissen Blumen, ibid. *perenn.*

Polygala purpurea T. & *Tab. hist. Ic.* 6. 1213. rothe Creutz-Blümlein, ibid. *perenn.*

Potamogeton rotundifolium T. folio rotundiore *IB.* 3. 776. *flore cruciformi spicato purpureo, Ic. Tab. hist.* 1117. Saam-Kraut, mit runden Blättern, *Epidean*, in denen Stadtgräben, bey dem Spithal-Thor. *perenn.*

Potamogeton foliis crispis five *Lactuca ranarum* T. seu *Fontinalis crispa IB.* 3. 778. Frosch-Lattich, mit krausen Blättern, in dem Spithal-Graben, in Wasser-Gräblein, in der Ruprechtsau, *perenn.*

Potamogeton longo ferrato folio T. potius *undulato alterno & lucido sine pediculo, est* Lapathum fluitans, longo ferrato folio *IB.* 2. 988. Hecht-Lock, in der Ill häufig.

Potamogeton foliis latis splendentibus T. *perfoliatis*, five Potamogeton altera Dodonæi *IB.* 3. 778. Saam-Kraut, mit breiten gläntzenden Blättern, *ibid.*

Potamogeton foliis angustis & undulatis T. *floribus Muscatellæ*, schmahl blättricht Saamm-Kraut, mit Wollen gestalten Blättern, auf der Kaltau, in denen Gräben, auch auf dem Wa-

cken, in denen eingefaßten Wasser-Quellen, *perenn.*

Potamogeton flosculis ad foliorum nodos T. *albis cruciformibus* sive Myriophyllum aquaticum minus Clus. hist. CCLII. Saam Kraut, mit Blumen, an denen Gleichen der Blätter / in denen fliesenden Wasser-Gräben, in der Ruprechtsau, und auf dem Krümmerich, bey dem Wickhäusel. *perenn.*

Potamogeton alpinum plantaginis folio T. *alterno oblongo leviter undulato*, sive Fontinalis lucens major *Ic. 3. IB.* 777. Saam-Kraut, mit Wasser Wegerich-Blättern, in der Ill häufig, bey Oßwald. *perenn.*

Potamogeton graminifolium fluviatile *flosculis ex alis foliorum prodeuntibus, ex viridi albicantibus nobis*, seu Fluviatilis gramineo folio polycarpos. Vaill. pag. 54. auf dem Wacken, in einem eingefaßten Quell-Wasser-Brunnen, in dem Rhein-Giessen. *perenn.*

Potamogeton minus, foliis densis mucronatis non serratis Bot. Mo. ʿ sive *Fontalis media lucens*, *Ic. IB.* 3. 777. spitzig Saam-Kraut, in sümpfichten Wassern auf dem Wacken, in dem Eckbolsheimer Wald, in denen leimichten feuchten Gruben. *perenn.*

Potamogeton ramosum angustifolium T. & *IB.* 3. 778. *flosculis pusillis uvæ in modum congestis Moschatellinæ similibus*, Aestig Saam-Kraut, mit schmahlen Blättern, in der Ill, zwischen denen Fischer-Pfählen, und Reisen zu Oßwald.

Pota-

Potamogeton caule compresso, foliis graminis canini Ray hist. 189. Saam-Kraut, mit Graß-Blättern, in stillstehenden Wasser-Gräblein, bey Gravenstaden, wie auch in der Jll bey Oßwald häufig. *perenn.*

Ptarmica vulgaris folio longo serrato T. & *IB.* 3. 147. *flore albo radiato*, wilder weisser Bertram, weise Rhein-Farn, *Ic. Tab. hist. pag.* 1164. auf feuchten Matten zu Oßwald, an denen Wasser-Gestaden, bey der Gallen-Matt, *perenn.*

Pyrola rotundifolia major T. *fructu subrotundo, flore viridi rosaceo, folio crenato*, sive *Pyrola IB.* 3. 533. *Ic. Tab. hist.* 1139. *& in Rivin. Pyrole à feuilles, larges & rondes*, Apfel Wintergrün, Wald-Mangoldt im Hörter-Wald, auf denen Bergmatten, zu Barr häufig. *perenn.*

Pyrola folio mucronato serrato T. sive Pyrola folio serrato *IB.* 3. 536. est Pyrola II. Clus. hist. CXVII. *Pyrole à feuilles pointues.* Wintergrün, mit spitzigen Blättern, Wald-Mangold mit Birn-Laub, in dem Hörter-Wald, zu Dorlisheim, auf den Bergen. *perenn.*

Quinquefolium folio argenteo T. sive Pentaphyllum erectum, foliis profunde sectis subtus argenteis, flore luteo *IB.* 2. 398. *rosaceo.* quod *Quinquefolium petræum majus Tab. hist. Ic.* 10. 353. aufrecht stehend 5. Finger-Kraut, mit silberfärbigen Blättern, neben den Wegen, an Gärten, zu Oßwald, auch in dem Ostwinckel, und an steinichten Orten, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Ranunculoides folio circinato, tenuissime diviso Act. Reg. Scient. pag. 48. 1719. & Vaill. Bot. Paris. 143. *in ima parte cornu cervin. exprimente, flosculis rosaceis albis, pediculo nudo insidentibus longiori*, est Millefolium aquat. minus Clus. hist. CCLII. *Grenouillette*, gehörnt Wasser-Garbe, in dem Graben, vor dem Spithal-Thor, bey der ersten Brücke häufig, in dem Graben, hinter der Schiffmatt. *perenn.*

Ranunculus palustris longifolius major T. sive Ranunculus lanceatus major *Tab. hist. Ic.* 17. 111. est Lingua Plinii IB. 3. app. 365. groß lang blättricht Wasser Hahnen-Fuß, in feuchten sumpfichten Orten, bey dem Eckbolsheimer Ziegel-Ofen. *perenn.*

Ranunculus palustris minor T. *Ic.* 18. *Tab. hist. pag.* 111. sive Ranunculus longifolius, aliis Flammula IB. 3. app. 864. kleiner langblättrichter Wasser Hahnen-Fuß, ibid. und zu Oßwald auf feuchten Wiesen. *perenn.*

Ranunculus palustris serratus T. sive Ranunculus lanceatus serratus *Tab. hist.* Ic. 19. *pag.* 112. Sumpf Hahnen-Fuß, mit eingeschnittenen Blättern, vor dem Fischer-Thor, auf der Wiese oberhalb der Schiffmatt, in denen Pfützen, vor dem Metzger-Thor. *perenn.*

Ranunculus palustris folio sagittato maximo

mo T. seu Sagitta major *IB. 3. 790. flore rosaceo albicante*, groß Pfeil-Kraut, *Queue d'arondelle*, oberhalb der grünen Wart, wo man auf Oßwald zu gehet, und in denen Gräben um die Stadt. *perenn.*

Ranunculus palustris folio sagittato minori. T. sive *Sagitta IB. 1. 790. Tab. hist. Ic. 2. pag. 1121.* klein Pfeil-Kraut, in Wasser-Bächlein bey Arbogast und der grünen Wart *perenn.*

Ranunculus palustris folio sagittato angustiori T. sive Sagitta minor angustifolia *IB. 3. 790. Ic. Tab. hist. 3. pag. 1121.* in denen Stadt-Gräben und sumpfichten Orten am Canal. *perenn.*

Rapa sativa oblonga seu Fæmina T. seu *Rapum oblongum sativum IB. 2. 838. flore luteo cruciformi siliquoso*, lange Winter-Ruben, *Rave Ic. Tab. hist. 797.* auf Aeckern aller Orten. *ann.*

Rapa rotunda radice candida T. sive Rapum sativum rotundum *IB. 2. 838.* est Rapum vulgare *Tab. hist. 790.* Rave commune, gemeine runde Ruben, ibid. *ann.*

Rapa sativa rotunda minor vel Rapum rotundum minus, *Ic. Tab. hist. 2. 790.* frühe Rube, oder Stupfel-Rube, auf denen Gartners-Feldern, *ann.*

Rapa major sativa orbiculata sessili seu compressa candida Boerh. quod Rapum orbiculatum, *Tab. hist. Ic. 3. 790.* Scheib-Ruben, *ann.*

Rapa minor sativa orbiculata sive Rapum orbiculatum minus, *Tab. hist. Ic. 4. 791.* kleine Scheib oder Früh-Rube *ann.*

Rapa ſativa rotunda radice foris & intus flaveſcente T. gantz gelbe Rube, zu Brumath und Krautweyler, auf denen Aeckern. *ann.*

Rapa ſativa rotunda radice punicea T. braun rothe Ruben, auf denen Gartners Feldern *ann.*

Rapunculus ſcabioſæ capitulo cœruleo T. ſive Scabioſa globularis vel ovina *IB. 3. 12. Ic. Tab. hiſt.* 14 444 Schaf Rapuntzel, auf denen Aeckern, in dem Ruprechtsauer Wald, gegen dem Rhein *perenn.*

Reſeda vulgaris T. *flore roſaceo ſubluteo, fructu trigono oblongo ſpicato,* ſive Reſeda lutea *IB.* 3.467. ſpicata, Feld-Raucken, auf denen Wällen, hin und wieder um die Stadt. *perenn.*

Roſmarinus hortenſis anguſtiore folio T. *floribus monopetalis labiatis ſub cœruleis, ſemine ſubrotundo, Romarin,* Roßmarin, mit ſchmahlen Blättern, *Ic. Tab. hiſt. pag.* 311. in Gärten. *perenn.*

Roſmarinus ſpontaneus latiore folio T. ſive Roſmarinus coronarius *fruticoſus ignobilior IB.* 2. 15. *Romarin ſauvage,* Roßmarin, mit gantz breiten grünen Blätteren, *cum præced. perenn.*

Roſmarinus folio variegato T. Roßmarin, mit ſchmahlen gold gefleckten Blättern, *in horto medico.*

Roſmarinus hortenſis anguſtiore folio argenteus H.R.Par. Roßmarin mit weiß gefleckten Blättern, *in hort. medico.*

Rubeola vulgaris quadrifolia lævis, floribus purpuraſcentibus T. *monopetalis infundibuliformibus* ſive Rubia cynanchica *IB.* 3. 23. klein blau

Me-

Megerkraut, auf dürren Wiesen und Aeckern, zu Oßwald und Illkirch / neben den Aeckern, und zu Niederhaußbergen.

Rubeola vulgaris lævis quadrifolia floribus albis T. klein Megerkraut, mit weisen Blümlein, *Ic. 4. Tab. hist.* 433. auf der Contrescarpe, bey dem Fischer-Thor, auf der Glacis, vor dem Cronenburger-Thor. *perenn.*

Rubia tinctorum sativa T. *flore albo monopetalo campaniformi, foliis stellatis, radice rubra fructu gemino Ic. Tab. hist.* 1. 1178. Ferber-Röth, *Garance*, zu Krautweyler häufig.

Rubia sylvestris Monspessulana major T. & *IB.* 3. 715. *floribus luteis, foliis asperis*, wilde Ferber-Röthe, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 118. an der Land-strasse, vor dem Weisen-Thurn, in denen Hägen. *perenn.*

Ruta muraria T. & *IB.* 3. 753. Mauer oder Steinraute, *Rue de murailles. Ic.* 3. *Tab. hist.* 1184. & *in Tournef. Inst. rei herb.* in allen Fugen, alter Mauren. *perenn.*

Sabina sterilis IB. seu vulgaris Sabina Mas. *Tab. hist. p.* 1355. Seven-Baum Männlein.

Sabina baccifera IB. fol. Cupress. Seven-Baum, Weiblein. *Ic. Tab. hist. p.* 1355.

Salvia major an Sphacelus Theophrasti T. sive Salvia latifolia 3. 324. *flore monopetalo labiato purpureo, semine subtrotundo.* grose oder breite Salbey. *Ic.* 1. *Tab. hist.* 760. *Grande sauge*, in Gärten, *perenn.*

Salvia major foliis ex luteo & viridi variega-

tis HAP. gemahlte oder Froschen-Salbey, *in horto medico*, *perenn.*

Salvia altera perelegans tricolor argentea Belgarum HRP. 3. färbige oder Holländische Salbey, ibid. *perenn.*

Salvia latifolia serrata T. seu crispa *IB.* 3. 395. *Sauge frisée*, breit blättricht Salbey, mit an dem Rand eingeschnittenen Blättern, hin und wieder in Gärten. *perenn.*

Salvia baccifera T. sive Cretica pomifera Clus. hist. 343. Beeren oder Fruchttragende Salbey, *in horto medico. perenn.*

Salvia minor aurita T. seu auriculata IB. 3. 305. Edel-Salbey, mit spitzigen geöhrten Blättern, oder Creutz-Salbey, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 761. *Sauge Franche*, in Gärten. *perenn.*

Salvia minor non aurita T. *flosculis albis*, Edel-Salbey, mit spitzigen Blättern ohne Ohren *ibid.*

Salvia folio tenuiore T. seu Arborescens flore albo, est Salvia Hispanica. H. Eyst. schmahl blättrichte Salbey, *in horto medico. perenn.*

Samolus Valerandi T. & *IB.* 3. 791. *folio rotundo non crenato, floribus albis rotatis, pediculis longis insidentibus*, sive Anagallis aquatica tertia Lob. Ic. 467. vor dem Fischer-Thor, auf dem feuchten Grund, gegen dem Ziegelofen über. *perenn.*

Scabiosa capitulo globoso major T. quæ Scabiosa V. Clus. hist. Ic. 11. & *Tab. hist. Ic.* 21. 445. *flore, cœruleo tubuloso flosculoso, semine coronato Scabieuse tete etoilée*, rund köpfige Skabiosen, oder

Apo-

Apostem-Kraut, bey Mittel und Niederhaußbergen, auf dem Haulenberg. *perenn.*

Scabiosa capitulo globoso minor T. sive Scabiosa minor IV. *Tab. hist. Ic.* 12. 445. kleine rund köpfige Scabiose, auf dürren Wiesen auf der Gansau, auf der Metzgerau, in dem Illkircher Wald. *perenn.*

Scabosa folio integro hirsuto T. sive *Succisa seu Morsus Diaboli*, *IB.* 3. 11. *flore cœruleo purpureo flosculoso, radice præmorsa Ic. Tab. hist. pag.* 452. rauher Teufels Abbiß, *Mort du Diable*, auf allen feuchten Wiesen, bey der grünen Wart, *perenn.*

Scabiosa folio integro glabro T. *flore cœruleo* Teufels-Abbiß, mit blauen Blumen, und Blättern, ohne Haar, auf Berg-Wiesen, hinter Baar, *prioris est varietas.*

Scabiosa folio integro ; flore albo T. Teufels-Abbiß, mit weisen Blumen.

Scorzonera angustifolia sub cœrulea T. *flore semiflosculoso, semine papposo* aut elatior IV. Clus. hist. sive *Scorzonera Pannonica angustifolia Tab. hist. IB.* 996. schmahlblättrichte Scorzonera, mit blaulichten Blumen, in Gärten und Gartners-Feldern. *perenn.*

Scorzonera humilis latifolia nervosa T. sive Pannonica *Tab. hist. Ic.* 2. 995. Scorzonere, breitblättrichte Scorzonera, *ibid.*

Scorzonera humilis angustifolia T. sive Pannonica 3. *Clus. hist. Ic.* 6. 996. schmahl blättrichte Scorzonera, ibid. *perenn.*

Scor-

Scorzonera laciniatis foliis T. sive Tragopogon pratense laciniatum, flore luteo pallido *IB.* 2. 1059. Bocks Bart, mit grosen Bleichgelben Blumen, auf denen Wiesen. *Ic. Tab. hist.* 994. *Barbe de Boue.*

Scorzonera latifolia sinuata T. sive Scorzonera major hispanica Clus. hist. CXXXVII. radice nigra longa, gemeine Scorzonera, *Ic. Tab. hist.* 1. 995. *Scorzonere perenn.*

Scrophularia aquatica major T. sive Scrophularia maxima radice fibrosa IB. 3. 421. *foliis betonicæ, flore monopetalo anomalo sub purpureo auriculato, radice fibrosa, fructu rotundo acuminato* quæ Betonica aquatica *Tab. hist.* 934. *& in Rivin.* Braunwurtzel, mit Betonien-Blätter, *grande Scrophulaire*, auf feuchten Orten, und Wassergestaden. *perenn.*

Scrophularia palustris non foetida seu aquatica minor T. sive Scrophularia aquatica fœmina Matth. Ic. 867. kleine Braunwurtzel, an der Ill bey Oswald. *perenn.*

Scrophularia nodosa fœtida T. sive Scrophularia vulgaris & major *IB.* 3. 421. *Grande scrophulaire*, Braunwurtzel, am Wasser, bey der Gallenmatt/ *Ic. Tab. hist.* 930. *perenn.*

Secale hybernum vel majus T. Secale *IB.* 2. 416. *flore apetalo, folio graminis, semine oblongo.* Winter Roggen, oder Korn, *Ic. Tab. hist.* 586.

Secale vernum vel minus T. sive Secale alterum Dalech. Lugd. 396. Sommer-Rocken.

Sedum minus teretifolium album T. sive

Sedum

Sedum minus folio longiusculo tereti, flore candido, *IB.* 3. 690. Katzen-Träublein, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1226. *Trique madame* aller Orten, auf un reinen Dächern und alten Mauren. *perenn.*

Sedum teretifolium album majus Mor. hist. R. Bles. grose weisse Katzen-Träublein, auf den Glacis, vor dem Fischer-Thor, zwischen den Maursteinen, in dem Steinstrasser Wasser-Graben, *perenn.*

Sedum minimum luteum non acre T. sive Sempervivum minus vermiculatum insipidum *IB.* 3. 695. Mauer-Pfeffer ohne scharfen Geschmack, auf steinichten Ackern, zwischen Lingelsheim und Ensisheim. *perenn.*

Sedum minus luteum folio acuto T. sive Sedum minus flore luteo *IB.* 3. 692. kleine gelbe Katzen-Träublein, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1226. auf brachliegenden steinichten Aeckern, *perenn.*

Sedum parvum acre flore luteo T. & *IB.* 3. 695. kleine Katzen-Träublein, mit scharfen Geschmack, *Ic.* 3. *Tab. hist.* 1226. *Pain d'oiseau*, auf sandigen Orten, in der Ruprechtsau, auf dürren Wiesen, bey dem Rhein Ziegelofen. *perenn.*

Sedum palustre subhirsutum T. sive Sedum minus tertium seu palustre Clus. hist. VIII. est Sedum purpureum pratense *IB.* 3. 692. klein roth Wiesen Hauswurtz, auf feuchten Wiesen, bey Wimmenau. *perenn.*

Sedum minus luteum ramulis reflexis T. sive Aizoon scorpioides Lob. Ic. 377. est Sedum minus

minus luteum flore se circumflectente *IB.* 3. 639. Katzen-Träublein, mit gelben Blumen, und umgebognen Aestlein, auf dem Weg, gegen dem Ottilien Kloster, nicht weit von dem Bäumen. *perenn.*

Serpillum vulgare majus flore purpureo T. *monopetalo labiato Ic.* 4. *Tab. hist.* 749. & *in Rivin.* Quendel oder Feld-Kümmel, mit rothen Blumen, auf dürren Wiesen, auf denen Reinen der Aecker, beym Mauer-Hof. *Serpolet à fleur rouge. perenn.*

Serpillum vulgare majus flore albo T. groser Quendel, mit weisen Blumen, *Ic.* 4. *Tab. hist. Serpolet á fleur blanc. ibid.*

Serpillum vulgare minus T. sive Serpillum vulgare *IB.* 3. *part.* 2. 269. *flore purpur.* kleiner Feld-Kümmel, *Ic.* 7. *Tab. hist.* 748. & *in Rivin. Serpolet à feuilles etroites.*

Idem flore albo T. *Ic.* 6. *Tab. hist.* 748. kleiner Quendel, mit weisen Blumen, neben dem Canal, beym ersten Schliessen. *perenn.*

Serpillum vulgare minus capitulis lanuginosis T. Quendel mit wollichten Köpfen, auf dem Wacken, und zu Niederhaußbergheim, an grasichten Reinen, im Granwört. *perenn.*

Serpillum foliis citri odore T. sive Serpillum citratum *Tab. hist. Ic.* 2. 747. & *H.Eyst.* & *Rivin.* auf dem St. Ottilien Berg, in denen Hohlwegen, von Heilgenstein aus, an grasichten abhangenden Orten, Quendel mit Citronen Geruch. *perenn.*

Ser-

Serpillum vulgare minus, foliis acutioribus & angustioribus CBp. Quendel, mit schmahlen und spitzigen Blättlein, auf sandigen Boden, zwischen dem Hagenauer Forst bey Schweighausen, *perenn.*

Sinapi arvense præcox semine nigro T. *flore cruciformi fructu siliquoso* sive Rapistrum arvorum Lobel. Rapistrum flore luteo *IB.* 2. 844. Hederich wilder Senf, mit gelben Blumen, und schwartzen Saamen, hin und wieder auf denen Aeckern.

Sinapi Erucæ folio T. sive Sinapi Erysimo *Tragi cognatum sive simile IB.* 2. 857. *Ic. Tab. hist.* 838. *Moutarde sauvage*, wilder Senf, bey der neuen Retoude, gegen der Citadell, an denen Aeckern, zu Gundershofen. *ann.*

Sium, sive Apium palustre foliis oblongis T. *angustis per ambitum serratis, floribus albis rosaceis umbellatis, fructu subrotundo, Ic.* 1. *Tab. hist.* 202. est Sium minus Rivin & Sium umbelliferum *IB.* 3. 172. Wasser-Eppich, Berle in dem Graben, an dem Wickhäusel, an dem Wasser, gegen der grünen Wart. *perenn.*

Sonchus asper laciniatus dentis leonis folio T. *flosculis semiflosculosis luteis semine papposo* sive *Sonchus laciniatus spinosus IB.* 2. 1016. Sau-Distel, mit eingeschnittenen Blättern, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 494. an der Landstrase, vor dem weisen Thurn, und auf denen Kraut-Aeckern. *perenn.*

Sonchus asper non laciniatus T. sive Sonchus minor laciniosus asperior sive spinosior, foliis

foliis *in ambitu indissectis, caule fistuloso*, rauher Gänse oder Sau-Distel, mit unzerschnittenen Blättern, *Ic. 1. Tab. hist.* 498. beym vorherstehenden. *perenn.*

Sonchus asper arborescens T. *flosculis luteis semiflosculosis* sive Sonchus altissimus *Clus. hist. CXLVII. semine albo*, Baum Sonchen-Kraut, in dem Ostwinckel, an dem Wasser in feuchten Gruben, am Canal. *perenn.*

Sonchus repens multis Hieracium majus T. & *IB.* 2. 1017. & *Lobel. Ic.* 237. groß kriechend Sonchen-Kraut, grose Gänse-Distel, mit schmahlen Blättern, an denen Aeckern, und vor dem Spithal-Thor, und zu Oßwald. *perenn.*

Sparganium ramosum T. & *IB.* 2. 541. *flore apetalo globoso, fructu echinato, folio gramineo triangulari, Ic. 1. Tab. hist. pag.* 559. Igels-Knospen, Ried-Graß, in sumpfichten Gräben, vor dem Fischer-Thor, und über der hohen Wart. *perenn.*

Sparganium non ramosum T. seu alterum *IB.* 2. 541. *Tab. hist. Ic. pag.* 560. Igels-Knospe, ohne Aeste, gegen dem Wasser-Zoll über, an dem Wasser. *perenn.*

Sparganium minimum T. & *IB. Ic.* 2. 541. kleine Igels-Knospen, auf denen Matten, zu Ehrstein, in morastigen Gruben, in dem Eckbolsheimer Wald.

Spinacia vulgaris sterilis T. *flore apetalo semine angulato*, Binetsch oder grün Kraut, *Epinars Ic. Tab. hist. pag.* 809. in Gärten und Gartners-Feldern. *perenn.*

Spi-

Spinachia vulgaris capsula seminis aculeata T. Binetsch mit stachlichten Saamen, est Spinacia Lobel Ic. 1. pag. 809. *ibid. perenn.*

Sphondylium vulgare foliis hirsutis T. sive Branca ursina *Germanica* IB. 3. part. 2, 160. *flore albo rosaceo umbellato, semine plano nudo ovato. Berce*, Bären-Klau, *Ic. Tab. hist.* 280. & *in Rivin. perenn.*

Sphondylium vulgare hirsutum, floribus purpureis T. *Berce rouge*, Bären-Klau, mit röthlichten Blumen, in denen Hecken am Rhein. *perenn.*

Tamariscus Germanica T. *folio crassiore, flore albo rosacco, fructu compresso siliquoso. Tamaris* Tamarisken, *Ic. 1. Tab. hist.* 1354. & *IB.* 1. 351. hin und wieder auf denen Sand-Bäncken am Rhein, *perenn.*

Thalictrum majus siliqua angulosa aut striata T. sive Thalictrum nigrius, caule & semine striato *IB.* 3. 486. *floribus rosaceis umbelliferis albis semine oblongo*, Wiesen-Raute, *Ic. 1. Tab. hist.* 120. & *in HEyst. Rue des prez*, *perenn.* beym Jäger-Hof.

Thalictrum pratense angustifol. T. & IB. 3. 487. est VI. vel pratense II. Clus hist. 234. est Ruta pratens major angustifolia *Ic. V. Tab. hist.* 121. Wiesen-Raute, mit schmahlen Blättern.

Thymus vulgaris folio tenuiore T. sive Thymum vulgare rigidius folio cinereo IB. 3. part. 2. 263. Thymian *Ic. HEyst.* fast in allen Gärten.

Tithymalus foliis pini, forte Dioscoridis *Pithyusa* T. *flore monopetalo campaniformi, fructu trigono*. sive Tithymalus Pinea *Lob. Ic.* 357. & *Tab. hist.*

 990.

990. *Ic.* 14. Wolfs-Milch, mit Fichten-Blättern, in der Ruprechtsau, auf der Promenade.

Tithymalus rotundis foliis non crenatis T. five Esula rotunda *IB.* 3. 669. & *Rivin. est Peplus Tab. hist.* 993. Wolfs-Milch, mit runden Blättern, in Kuchen-Gärten, und Gartners-Feldern. *ann.*

Tithymalus Myrsinites angustifolius T. five 2. *Tab. hist. Ic.* 8. 989. Wolfs-Milch, mit schmahlen Myrten-Blättern, auf dürren Weiden, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Tithymalus Helioscopius T. & *IB.* 3. 669. *foliis majoribus, subrotundis* est Esula solisequa Rivin. *Ic. Tab. hist.* 990. nach der Sonne sich richtende Wolfs-Milch, *Reveille matin, suivant le soleil,* fast aller Orten, in der Ruprechtsau, auf den Aeckeren. *perenn.*

Tithymalus Myrsinites, fructu verrucæ simili T. *non ramosus, five Tithymalus verrucosus IB.* 3. 673. Wartzeln Wolfs-Milch / in der Ruprechtsau, auf der Promenade *perenn.*

Tithymalus palustris fruticosus T. five Tithymalus magnus multicaulis five Esula major IB. 3. 671. *qui maximus. Tabern. hist. Ic.* 1. 987. & *in Rivin.* grose Wolfs-Milch, in sumpfichten Orten, beym Mauer Hof. *perenn.*

Tithymalus montanus non acris T. five Esula minor altera floribus rubris *Lob. Ic.* 358. & *IB.* 3. 673. süsse Wolfs-Milch, in dem Gebürg hinter Hohen Andlau und Hochfelden. *perenn.*

Tithymalus non acris summe fœtidus, foliis latioribus, *flosculis exviridi luteis, nobis, non est*

prioris

prioris varietas ut Dominus Mappus existimat, sed quotannis in uno eodemque loco fœtens exsurgit. Stinckende Wolfs-Milch, mit grün gelben Blumen, beym Jesuiter Hof, an denen Garten-Zäune und in dem Gansauer Wald. *perenn.*

Tithymalus amygdaloides angustifolius T. & Tabern. hist. Ic. 6. 988. est Alypum Matthiol. Ic. Tithymalis affine IB. 3. 676. Wolfs-Milch, mit schmahlen Mandel-Blättern, in der Ruprechtsau, neben den Aeckern, und auf der Promenade. *perenn.*

Tormentilla sylvestris T. sive Tormentilla IB. 2. 398. *flore rosaceo luteo, folio dissecto, fructu globoso Ic. Tab. hist.* 360. Est Tormentilla heptaphyllon HEyst. Ic. etiam in Garidel. hist. Tab. 103. Ruhr oder Blutwurtz, Tormentill, *Tormentille*, auf der Gansau, in dem Brumbter Wald, wie auch in dem Wald zu Illkirch. *perenn.*

Tormentilla alpina major vulgaris T. grose Blutwurtz, bey Andlau auf denen Wiesen, bey Rappolsweyer in dem Gebürg. *perenn.*

Tribuloides vulgare aquis innascens T. *flore rosaceo fructu subrotundo aculeato*, sive Tribulus aquaticus *IB*. 3. 775. Wasser oder Stachel-Nüsse, Wasser-Castanien, Jesuiter-Mützen, *Chataigne d'eau*, in tiefen Weyhern zu Wimmenau.

Trichomanes, sive *Polytrichum officinarum* T. *&* *IB*. 3. 754. Wiederthon, Frauen-Haar, rother Steinbruch, in officinis substituitur adianthо nigro, zu Barr, zwischen denen Steinen,

an denen Weinbergen, auf dem Ottilien Gebürg, zwischen denen Steinritzen, *perenn.*

Trichomanes minus & tenerius T. sive Trichomanes minus album IB. 3. 755. est Trichomanes minor mas Ic. 4. *Tab. hist.* 1188. klein Wiedertodt, Männlein, auf dem Ottilien Gebürg in feuchten schattichten Steinritzen, *perenn.*

Trifolium montanum lupulinum T. *flore papilionaceo fructu globoso, capitulis spadiceis*, Berg Hopf-Klee, hinter hohen Andlau, auf denen Berg-Wiesen. *perenn.*

Trifolium montanum spica longissima rubente T. sive Trifolium majus, folio & spica longiore IB. 3. 375. est Lagopus major H. Eyst. Berg-Klee, mit rothen langen Blumen, und langen Blättern, in dem Eschauer und Gausauer Wald. *perenn.*

Trifolium pratense purpureum majus, foliis longioribus & angustioribus floribus saturatioribus Ray. synops 194. groser Wiesen-Klee, mit längern satt rothen Blumen, in dem Ostwinckel. *perenn.*

Trifolium arvense humile spicatum sive Lagopus T. est Lagopus trifolius quorundam IB. 2. 377. *flore papilionaceo albescente* Ic. 1. *Tab. hist.* 908. & *in Rivin.* kleiner Katzen Klee oder Hasen-Pfötlein, *Pied de Lievre*, aller Orten auf denen brachliegenden Feldern, *ann.*

Trifolium spica oblonga rubra T. sive Trifolium majus III. Clus. hist. CCXIV. & IB. 2. 375. groser rother Geisen-Klee, mit ablangen zu-

zugespitzten Blumen, in dem Ostwinckel, *perenn.*

Trifolium capitulo spumoso aspero minus CB.prodr.140. kleiner Wiesen-Klee, mit wollichten rauhen Köpfen, auf feuchten Wiesen, bey der Rheinbruck, vor dem Fischer-Thor, oberhalb der Schiffmatt, *perenn.*

Triticum hybernum spicis carens T. *floribus apetalis stamineis semine oblongo*, Winter oder gemeiner Weitzen, *Bléd'hyver Ic.* 1. *Tab. hist.* 597. à tempore sationis dicitur etiam Triticum æstivum, Sommer-Weitzen, auf denen Felderen.

Triticum typhinum simplici folliculo T. Welscher Weitzen, mit einfach geährten Körnern, *Ic, IB.* 2. 708. zu Drusenheim.

Turritis leucojifolio T. *flore cruciformi, fructu siliquoso*, sive Myagrum siliquosum vel secundum *Tab. hist. Ic.* 2. 1252. est Myagro affinis planta siliquis longis IB. 2. 894. groser wilder Kresse, an dem Ufer gegen dem Wasser-Zoll über, in Gärten, und neben den Aeckern, *ann.*

Turritis alpina foliis incisis T. Thurn Alpen-Kraut, mit eingeschnittenen Blättern, auf den Bergen gegen Hochfeld, in dem Barrer Wald, an feuchten schattichten Orten. *ann.*

Veratrum flore atro rubente rosaceo, semine oblongo T. sive Helleborum album flore nigro IB.3.634 *Ellebore blanc, à fleur rouge brun*, weise Nießwurtzel, auf dem Gebürg, hinter Blinschweyler an Creutz-Pfad. *perenn.*

Veronica aquatica major, folio subrotundo T. sive Anagallis aquatica major. *IB.* 3. 791.

& *Tab. hist. Ic.* 4. 1094. & *in Rivin*, est Beccabunga Officinarum, *flore monopetalo cæruleo rotato*, Bachbung groser Gauchheil, *Berle* in feuchten Orten, beym Wickhäusel, an der Bruck, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Veronica aquatica minor folio subrotundo T. sive Anagallis aquatica folio rotundiore minor I B. 3. 790. kleine Bachbung *Ic. Tab. hist.* 1. 1094. an Wassergräblein, in der Ruprechtsau, *perenn.*

Veronica aquatica major, folio oblongo T. sive Anagallis aquatica major, flore cœruleo, folio oblongo *IB*. 3. 791. est Berula, *Tab. hist. Ic.* 3. 1094. Bachbung, mit länglichten Blättern, in denen meisten stillstehenden Wasser-Gruben, in der Ruprechtsau, an dem Wasser zu Oßwald. *ann.*

Veronica aquatica minor folio oblongo T. flore *purpurascente* sive Anagallis aquatica minor 2. *Tab. hist. Ic.* 2. 1094. & *in Rivin.* kleine Bachbung, mit schmahlen Blättern, vor dem Metzger-Thor in denen wässerichten Orten zu Oßwald am Bach, *perenn.*

Vicia sepium folio rotundiore acuto, *flore papilionaceo, fructu siliquoso, semine nigro subrotundo*, T. Sommer Saat-Wicken, mit schwartzen Körnern, *Ic.* 1. *Clus hist.* CCXXXV. Zaun-Wicke, auf denen Feldern, in der Ruprechtsau, in dem XV. Wörth. *ann.*

Viola montana cœrulea grandiflora HRP. *flore polypetalo anomalo, fructu trigono* sive Melani-

blaue

um montanum Dalechamp. Lugdun. 1204. blaue Berg Violen, mit grosen Blumen, oberhalb Hochfeld, auf dem Weidgang. *Grande Violette de Montaigne*, *perenn.*

Viola montana alba grandiflora, weisse grose Berg-Violen, *ibid.*

Viola montana lutea grandiflora, sive Iacea tricoloris genus, flore luteo magno repens non annuum IB. 3. 548. est Violæ montanæ tertiæ genus aliud Clus hist. 310. gelbe Berg-Violen. *ibid.*

Viola montana tricolor, flore odoratissimo T. sive Iaceæ tricoloris, sive floris tricoloris genus, flore purpureo magno repens non annuum IB. 3. 548. est Viola montana III. sive Tricolor Clus. hist. 310. grose Berg-Violen, auf dem Roßberg zu Maßmünster.

Viola tricolor hortensis repens T. Dreyfaltigkeit Blumen, Freysam-Blum, *Pensées. Ic. 2. Tab. hist. 690. ann.*

Virga aurea vulgaris latifolia T. & *IB. 2. 1068. foliis minus serratis, floribus luteis radiatis, semine papposo*, quæ Virga aurea HEyst. gemein Heydnisch Wund-Kraut, *Verge dorée* in denen Hecken zu Oßwald und Illkirch. *perenn.*

Virga aurea latifolia serrata T. sive *Virga aurea vel Solidago Saracenica latifolia serrata IB. 2.* 1068. breit blättricht gekerbt Heydnisch Wund-Kraut, an der Ill, gegen Oßwald, auch in dem Ostwinckel, *Ic. Tab. hist. 1260. perenn.*

Vitis sylvestris Labrusca T. *flore rosaceo racemoso*

mosa albescente, fructu globulari, sive Labrusca Dalech. Lugd. 1406. *Vigne sauvage*, wilde Rebe, auf dem Weg gegen Oßwald, in den Hecken, in dem Ostwinckel, gegen Illkirch, *perenn*.

Vulneraria rustica T. sive Anthyllis leguminosa Rivin, *flore luteo papilionaceo, foliis subrotundis, siliquoso brevi semine subrotundo*, gelber Hasen-Klee, *Ic. 3. Tab. hist. 909. & in Rivin. Vulneraire*, auf allen trockenen Wiesen, auf der Glacis, vor dem weisen Thurn Thor, in dem Ostwinckel. *perenn*.

Ulmaria officinarum T. Clus. hist. CXLVIII. sive Barba capræ floribus compactis CBp. albis *rosaceis, foliis serratis, radice capillata amara nigra, fructu membranaceo, Barbe de Chevre ou Reine de prez Ic. Tab. hist.* 1162. Geißbart, an dem Wasser der Gallen-Matt, auf feuchten Wiesen an dem Canal. *perenn*.

MENSIS
JULIUS ET AUGUSTUS.

Abrotanum linifolio acriore odorato T. *flore flosculosa, semine papposo Ic. Tab hist.* 855. Stabwurtz, mit Flachs-Kraut Blättern, *Estragon* in Gärten, und auf denen Gartners-Felderen, häufig. *perenn*.

Absinthium ponticum T. *folio latiori, floribus luteis flosculosis, semine papposo*, sive Absinthium vulgare majus, *Ic. IB.* 3. 168. *Absinte ordinaire*, gemeiner Wermuth, *Ic. Tab. hist. pag.* 1. aller Orten, in Gärten und Weinbergen, *perenn*.

Absin-

Absinthium ponticum montanum T. sive Absinthium vulgare montanum *I B.* 3. 173. *Absinte de Montaigne*, Berg Wermuth, auf dem Wasserburg beym Schloß. *perenn.*

Acetosa arvensis minima non lanceolata T. sive Oxalis minima *Tab. hist. Ic.* 6. 827. gar kleiner Saurampfer, auf dürren sandigen Aeckern, zu Lingelsheim, *perenn.*

Agaricus pedis Equini facie, sive Fungus igniarius ex albo cinereus & glaber, Feuer oder Zunder-Schwamm, in allen Waldungen, unten an den Stämmen, alter Eich und Buchbäume, *perenn.*

Agaricus auriculæ forma T sive Fungus sambucinus est I genus fungor. perniciosor. Clus. hist. CCLXXVI. Hollunder Schwämme, Judas-Oehrlein, an denen alten Hollunder-Stämmen.

Agaricus flavus betulinus. gelber Bircken-Schwamm, in dem Gansauer Wald, an alten Bircken-Stämmen.

Agaricus lamellatus, pectunculiforma, Alno adnascens Scherard. Suppl. & Vaill. Tab. X. fig. 1. Muschelförmiger Schwamm, an alten Erlen Stämmen, an den Wassern.

Agaricus officinali similis Dillen. sive Agaricus albus caudicibus arborum adhærens. weisser Baum oder falscher Lerchen-Schwamm, in Waldungen, an unterschiedenen Bäumen.

Agaricus porosus rubens carnosus hepatis facie Dillen & Dodon. Leberförmiger Baum-

 Schwamm,

Schwamm, an alten Eichbäumen, in dem Hagenauer Forst.

Alcea hirsuta T. sive villosa IB. 2. 1067. haarichter Fellriß, auf der Contrescarp, zwischen dem Cronenburger und Steinstrasser-Thor, an denen Fußpfaden, nach Mittelhaußbergen, neben den Aeckern, *perenn.*

Allium montanum bicorne angustifolium flore purpurascente T. *liliaceo, fructu subrotundo,* sive Ampeloprasum proliferum Lobel. 156. est Allium sylvestre bicorne purpureum proliferum *IB.* 2. 561. Heiden Knoblauch, schmahl blättrichter Berg Knoblauch, auf der Elsau gegen Arbogast auf denen Aeckern, in denen Weinbergen, zwischen Barr und Heilgenstein. *perenn.*

Alsine palustris seu paludosa rotundifolia repens, foliis portulacæ pinguibus binis ex adverso nascentibus, flosculis virescentibus rosaceis Ic. Tournef. alsat. pag. 115. Tab. II. lit. b. an Alsine quoddam genus Pelagicum & litterale Clus. hist. CLXXX. 1111. Wasser-Burtzel, in sumpfichten Orten, vor dem weissen Thurn, bey der ersten Bleich, *perenn.*

Alsine spergula dicta major, T. sive Spergula IB. 3722. Alsine geniculata, foliis strictissimis circa caulem stellatim positis tennibus, flosculis albis integris rosaceis, radice singulari fibrosa nobis, an denen Furchen, feuchter und sandigen Aecker, häufig auf denen Sand-Bäncken, der Breusch, gegen Eckbolsheim. *ann.*

Alsine pusilla graminea flore tetrapetalo T.

herbi-

herbido é muscoso fugaci, radicula repente, sive Saxifraga graminea pusilla flore parvo tetrapetalo Ray hist. 1026. in grasichten Orten, in dem Ostwinckel, an dem Canal bey der Wolfsheimer Bruck, auf der Insul, wo die Breusch in die Ill fält. vid Tab. nostr. VIII. *perenn.*

Alsine palustris minor folio oblongo repens, flosculis parvis racemi modo junctis albis rosaceis *Ic. Tournef. alsat.* 115. *Tab.* 11. *lit. c.* sive *Polygoni Linifolia perterram sparsa, flore scorpioidis IB.* 3. 379. Sumpf-Gauchheil, mit langen Blättlein, und gedrungenen weissen Blümlein, an sumpfichten Orten, auf der Insul, wo die Breusch in die Ill fält, *ann.*

Alsine palustris tenuifolia muscosa T. sive *Alsine muscosa quibusdam IB.* 3. 365. & *Dalech. Lugd.* 1235. Alsinastrum serpillifolium flore albo tetrapetalo Vaill. *Ic. Tab.* 11. *fig.* 2. *foliis oblongis conjugatis, cauliculo nodoso*, auf der Insul, wo die Breusch in die Ill fält, in dem Hagenauer Forst, in sumpfichten Orten. *ann.*

Althæa Dioscoridis T. sive Bismalva *IB.* 2. 954. *folio molli incano, flore albo monopetalo campaniformi, semine reniformi, Ic. Tab. hist.* 1152. Eibisch, *Guimauve*, auf aufgeworfenen Wasser-Gräben, zu Fegersheim, und zu Marlenheim, bey Fegersheim. *perenn.*

Alyssum montanum perenne incanum T. seu Thlaspi montanum luteum *IB.* 2. 928. vel supinum luteum Lobel. *Ic.* 220. *flore truciformi*

luteo

luteo fructu gibbo, unter denen zerfallenen Felsen-stücke in dem Hochgebürg Niedeck. *perenn.*

Ammi perenne umbellatum T. *flore rosaceo semine gibbo striato* sive Eryngium arvense, *foliis serræ similibus CBp.* quod Crithmum quartum umbelliferum Matthioli *IB.* 3. *part.* 2. 195. Bacillen oder Sichel-Kraut, in dem Wall beym steinstraser Thor, auf denen Aeckern bey Oberehenheim am Weg, nach Eckbolsheim, *perenn.*

Ammi majus foliolis plurimum incisis & nonnihil crispis T. neben den Aeckern, in dem Ostwinckel, und bey dem Illkircher Wald. *perenn.*

Anacampseros vulgo Faba crassa T. *flore albo, rosaceo foliis succulentis* est Fabaria officinarum Orpin, *Ic. IB.* 3. 681. & *Tab. hist. Ic.* 1227. zu Gravenstaden und Illkirch, auf denen Aeckern, in dem Eckbolsheimer Wald an dem Canal. *perenn.*

Anacampseros purpurea T. sive Telephium floribus purpureis *rosaceis Lob. Ic.* 398. Orpin à fleur, purpurine, fette Henne, mit rothen Blumen, in dem Reichstätter Wald. *perenn.*

Angelica pratensis apii folio sive Sium quibusdam flore luteolo IB. 3. part. 2. 170. est Seseli pratense Rivin, *tenuifolium flore rosaceo umbellato, semine oblongo striato* Roß-Fenchel, auf denen Matten zu Oswald am Canal, est Hippomarathrum *I. Tab. hist.* 160. *perenn.*

Apium anisum dictum semine suaveolente majore T. *flosculis albis rosaceis, foliis imis subrotun-*

dis

dis in ambitu serratis, superioribus profunde dissectis fru-ctu globulari, Aniß, *Anis Ic. Tab. hist.* 171. *& in Rivin.* auf denen Gartners-Felderen. *ann.*

Apium seu Petroselinum crispum T. Krauß-Peterlein, *Ic. 2. Tab. hist. pag.* 264. *& in Rivin. ibid. perenn.*

Apium hortense seu Petroselinum vulgare *flosculis albis rosaceis umbellatis foliis latis dissectis Per-sil*, gemein oder Garten-Peterlein, *Ic. Tab. hist.* 264. *& in Rivin. perenn.*

Apium palustre & officinar. T. flosculis albis rosaceis umbellatis seu Apium vulgare ingratius *IB.* 3. *part.* 2. 100. est Paludapium, *Tab. hist. Ic.* 1. 273. *& Apium Rivin.* Eppich, Wasser-Peterlein, an Wasser-Gräben, in der Ruprechts-au. *perenn.*

Aphaca T. *flore papilionaceo fructu siliquoso. Lob. icon* 70. sive Lathyrus annuus foliis convolvuli minoris Mor. HOx. seu Elatine II. *Tab. hist. Ic.* 3. 1092. gelbe Steinwicke, in der Ruprechtsau, auf denen Aeckern, *ann.*

Aristolochia clematitis recta T. sive vulgaris *IB.* 3. 560. *longa, floribus luteis monopetalis tubulatis, fructu cylindraceo Tab. hist. Ic.* 2. 1142. *& in Rivin. Aristoloche*, Oster-Lucey, zu Dorlisheim, Bläßheim und Barr, an denen Reinen der Reben. *perenn.*

Aster atticus cœruleus vulgaris T. *flore purpureo radiato, semine papposo IB.* 2. 1044. est Atticus aster flore cœruleo HEyst. blau Stern-Kraut, *Ic. Tab. hist.* 1. 716. zwischen Lingelsheim und Ost-

wald,

wald, in dem Jllkircher Wald. *petit Mugue. perenn.*

Aster paluſtris luteus, folio lanuginoſo longiori T. *fructu papposo*, ſive Britannica conyzoides *JB.* 2. 1047. *ſeu vera Dalech. Lugd.* 1082. Waſſer Stern-Kraut, mit haarichten Blättern, am Rhein, beym Auenheimer Wald. *perenn.*

Atriplex anguſto oblongo folio T. *floribus pallide virentibus ſtamineis*, eſt Atriplex helxines folio *ſemine oblongo*, Lob. Ic. 257. vel Atriplex vulgaris anguſtifolia cum folliculis *JB.* 2. 973. wilde ſchmahl blättrichte Melte, hin und wieder bey Miſtſtätten, und aufgeworfenen Gräben / *Arroche ann.*

Atriplex folio haſtato ſeu deltoide T. ſive Atriplex procumbens rubra, folio triquetro HRPar. Melte, mit 3 eckichten Blättern, ibid. und am Ballhauß. *perenn.*

Atriplex hortenſis alba ſive pallide virens T. *flore ſtamineo ſubluteo, foliis latis pinguibus mucronatis*, ſive Atriplex ſativa alba *Lob. Ic.* 253. weiſe Garten-Melte, *Bonnes dames*, in denen Kraut-Aeckern, *ann.*

Atriplex anguſtiſſimo & longiſſimo folio HLB. Melte mit ſehr ſchmahlen und langen Blättern, hin und wieder auf denen Kraut-Aeckern. *perenn.*

Atriplex hortenſis rubra T. ſive Atriplex ſativa altera folio & flore purpureo livens Lob. Ic. 253. & Ic. 1. Tab. hiſt. pag. 810. rothe Garten Melte, *Arroche rouge*, hin und wieder in denen

nen Gärten, und auf denen Gartners-Aeckeren. *ann.*

Betonica arvensis annua, flore ex albo flavescnte T. *monopetalo labiato verticillato semine oblongo*, sive Sideritis glabra arvensis latifolia IB. 3. 427. est Sideritis flore albo, barba luteola Rivin. *Alyssum majus*, *Tab. hist. Ic.* 3. *pag.* 929. grose Feld-Alyssen Glied-Kraut, an der Schäfelsheimer Klamm, *ann.*

Bidens foliis tripartito divisis T. *flore flosculoso semine aculeato*, sive Cannabina aquatica folio tripartito diviso seu minus pulchro *Ic. IB.* 2. 1073. Wasser-Dosten, an denen Wasseren bey Oswald, und an der Ill, *Eupatoire batard. perenn.*

Bidens foliis tripartito divisis, caule purpurascente Vaill. Wasser-Dosten, mit röthlichten Stenglen, bey der Rheinbruck, in der Stadt bey dem Frantzösischen Spithal, an dem Weg. *perenn.*

Bidens folio non dissecto T. *flore luteo discoide odorato* sive Verbesina pulcherrino flore IB. 2. 1074. est Eupatorium cannabinum chrysanthemum *Tab. hist. Ic.* 2. 336. in Sumpfen.

Bistorta major radice minus intorta T. *foliis rugosioribus, semine triangulari* Natter-Wurtz, mit krausen Blättern, Garidel Hist. plant. Tab. 14. *Bistorte*, in dem Hanßauer Wald zu Illkirch, und zu Moltzheim auf denen Wiesen. *perenn.*

Bistorta major radice magis intorta T. seu Bistorta media, folio minus rugoso *IB.* 538. *folio*

folio integro, flore apetalo incarnato spicato, Natterwurtz, Schlangenwurtz, mit glatten Blätteren, *Bistorte* auf feuchten Wiesen, in der Ruprechtsau. *Ic. 1. Tab. bist. 82. perenn.*

Bistorta alpina maxima Ic. & IB. 3. 539. grose Alpen Natterwurtz, bey der Melckerey gegen Hochfeld, bey dem rothen Kreutz, *perenn.*

Bistorta alpina minor T. sive Bistorta minor Clus. hist. XIX. & IB. 3. 539. klein Alpen Natterwurtz ibid. *perenn.*

Blattaria lutea, folio oblongo laciniato T. sive Blattaria lutea IB. 3. app. 874. *flore monopetalo rotato staminulis purpureis, fructu rotundo*, Schaben-Kraut, *Herbe au Mites ou Blattaire Ic. 5. Tab. bist. 959.* auf dem Schießrein, bey allen Lüften, bey den Sandgruben, *perenn.*

Blitum rubrum majus T. *flore stamineo spicato rubente semine oblongo*, rother Meyer, *Blete rouge Ic. 1. Tab. bist.* 817. hin und wieder in Gärten, *ann.*

Blitum album majus T. weiser Meyer, *Blete blanc. Ic. 2. Tab. bist.* 817. in denen Gartners-Aeckern. *ann.*

Blitum rubrum minus IB. 2. 967. seu Blitum rubrum supinum Lob. Ic. 250. rother Meyer, rothe Mistmelte, *Blete sauvage*, an denen Strassen und Miststätten. *ann.*

Blitum sylvestre spicatum T. sive Blitum album minus IB. 2. 967. *foliis variegatis, floribus apetalis, semine lentiformi nigro* weiser Meyer, an denen Zäunen, vor dem Metzger-Thor.

Blitum

Blitum ſylveſtre ſpicatum, T. foliis ex albo & viridi variegatis, ſive Blitum album minus IB. 2. 967. geflecfter kleiner Meyer, an denen Mauren alter Stadtgräben. *perenn.*

Brunella cœrulea flore magno T. *folio non laciniató, ſemine ſubrotundo Cluſ. hiſt.* XLIII. & *Tab. hiſt. Ic.* 1. 944. & *in Rivin.* blaue groſe Brunelle, in dem Jllkircher Wald, nahe an denen Aeckeren, auf der Oſtwalder Nachtweyd. *Brunelle, perenn.*

Brunella folio laciniato T. flore magno purpureo quæ II. *Cluſ. hiſt. flore purpur.* XLIII. & *in Rivin.* Brunelle mit eingeſchnittenen Blättern, auf allen Matten, *perenn.*

Brunella major, folio non diſſecto, flore purpuraſcente HRPar. rothe Brunellen, in dem Ganßauer Wald, und auf der Kaltau. *perenn.*

Buphthalmum Tanaceti minoris folio T. *floſculis luteis radiatis, ſemine anguloſo*, eſt Buphthalmum II. *Tab. hiſt.* 90. & *Matth. Epit.* 651. Rinds-Aug, Streich-Blum, *Oïil de boeuf.* auf dürren brachliegenden Ackern, in dem Ried zu Marckleßheim. *perenn.*

Bupleurum folio ſubrotundo, ſive vulgatiſſimum T. quod anguſtifolium *Tab. hiſt. Ic.* 2. 1258. & *in Rivin.* Haſen-Oehrlein, an denen Zäunen zu Oſthofen, und an denen Reben zu Bläßheim *perenn.*

Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum T. *ſemine nigro pellucido* ſive Perfoliata arvenſis annua vulgaris. IB. 3. part. 2. 198. *floſculis*

lis subluteis umbellatis rosaceis, Durchwachs oder Bruchwurtz, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1140. & *in Rivin.* unter der Frucht, zu Niederhaußbergheim und Oßwald *ann.*

Bupleurum montanum latifolium T. sive Perfoliata montana Camer. Hort. Ic XXXVIII. breit blättricht Bruchwurtz, zu Sultzbach, bey Collmar, auf dem Gebürg, beym Bad zu Sultz, zwischen denen Steinen, *perenn.*

Calamintha vulgaris arvensis verticillata vel Officinarum Germaniæ T. *semine oblongo*, sive Calamintha flore magno vulgaris IB. 3. part. 2. 228. Ic. 1. Tab. hist. 733. & in HEyst. atque Rivin. *Calamente de Montaigne*, gemeine Berg-Müntze. *perenn.*

Calamintha pulegii odore sive Nepeta T. Calamintha flore minore, odore pulegii *IB.* 3. *part.* 2. 229. est *Calamintha arvensis*, I 1. *Tab. hist.* 736. Acker-Müntze, Poley-Müntz, auf brachliegenden Aeckern, zu Illkirch und Oßwald. *ann.*

Campanula vulgatior foliis urticæ seu major & asperior T. & *IB.* 2. 800 *flore monopetalo cæruleo campaniformi, radice alba nodosa*, Zapfen oder Halß-Kraut, mit blauen Blumen, grose Zaun-Glocken, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 797. *Campanule ou Gand de nostre Dame*; in allen Wäldern. *perenn.*

Eadem flore candido T. Halß-Kraut, mit weissen Blumen, in dem Forst bey Hagenau, in denen Hecken, *perenn.*

Campanula pratensis flore conglomerato T. sive Trachelium minus multis, *IB.* 2. 800. Wie-

Wiesen-Glöcklein, mit gedrungenen blauen Blumen, *Ic.* 3. *Tab. hist.* 790. auf denen Wiesen zu Oßwald. *perenn.*

Eadem flore albo T. Wiesen-Glöcklein, mit zusammen gedrungenen weisen Blumen, auf denen Matten, an dem Eckbolsheimer Canal. *perenn.*

Campanula pyramidata altissima T. *folio latiore, flore albo monopetalo* sive Campanula lactaria, *Tab. hist. Ic.* 1. 699. & *Clus. hist.* CLXXII. Pyramiden oder Milch-Glocken, auf dem Haulen Berg, per me luxuriat. *perenn.*

Campanula alpina latifolia cœrulea CBp. Berg-Glöcklein, mit blauen Blumen, auf den Felsen und Steinklüfften, Niedecker Gebürgs. *perenn.*

Campanula alpina linifolia, flore cœruleo T. & IB. 2. blaue Berg-Glöcklein / mit Lein-Kraut Blättern, auf dem wilden Hochgebürg, bey der schwartzen See, oberhalb Peris, unter Klippen, und an denen Felsen, *perenn.*

Campanula alpina rotundifolia minor T. seu altera IB. 2. 797. sive Campanula minor alpina rotundioribus imis foliis Clus. hist. CLXXIII. rund blättrichte Glöcklein, auf dem Hochfelder Hochgebürg, an denen Felsen. *perenn.*

Campanula pratensis floribus singularibus per caulem sparsis T. Wiesen-Glöcklein, mit vielen an dem Stengel hin und wieder stehenden Blumen, zu Lingelsheim und Oßwald. *perenn.*

Cannabis sativa T. sive Mas IB. 3. 487. potius fœcunda, flore apetalo stamineo. Fruchtbringender Hanf, auf denen Aeckern. *ann.*

Cannabis erratica T. five Fœmina IB. Spinn Hanf ohne Körner. *Iul. ann.*

Carduus lanceolatus latifolius *Ic.* & *IB.* 3. 58. *flore purpureo flosculoso apetalo majore semine papposo.* Speer-Distel, an allen Landstrassen, an dem Weg gegen Ittenheim. *ann.*

Carduus Marianus albis maculis notatus T. & *IB.* 3. 56. Marien-Distel, hin und wieder auf dem ausgeworfenen Unrath der Gärten, vor dem Metzger-Thor, neben den Aeckern zu Illkirch. *Ic. Tab. hist.* 1078. *ann.*

Carduus nutans T. *capitulo magno singulari pendente, flore purpureo suaveolente, tota stirpe spinosus*, Weg-Distel, mit rothen hangenden wohlriechenden Köpfen, *Ic. IB.* 3. 56. an allen Landstrassen. *perenn.*

Carduus nutans flore albo T. Weg-Distel, mit weisen hangenden wohlriechenden Köpfen, an der Landstrasse gegen Ittenheim, an den Reben, bey Lingelsheim. *perenn.*

Carduus acanthoides T. & *IB.* 3. 56. *caule alato incano, flosculis purpurascentibus*, five Polyacantha *Tab. Ic.* 1. *pag.* 1080. kleine Weg-Distel, bey Niederhaußbergen, an denen Wegen der Aecker/ *perenn.*

Caduus caule crispo T. & *IB.* 3. 59. seu *spinosissimus angustifolius vulgaris, capitulis minoribus purpureis*, Weg-Distel, mit kleinen rothen Blumen und krausen, überall besetzten Dornichten Stengel, aller Orten an denen Wegen, und aufgeworfenen Gräben.

Car-

Carduus ſtellatus T. ſive Calcitrapa *IB.* 389. *foliis papaveris erratici, flore purpureo ſemine non papposo* ſeu Spinatella *Tab. hiſt. Ic.* 2. *pag.* 1080. Stern-Diſtel, *Chardon étoilé ou Chauſſetrape*, vor dem weiſen Thurn-Thor, und auf dem Schießrein. *perenn.*

Carduus ſtellatus flore albo HRP. Stern-Diſtel, mit weiſen Blumen, *Ic.* 3. *Tab. hiſt.* 1081. bey allen Lüſten, *perenn.*

Carduus tomentoſus acanthifolio T. ſive Acanthium vulgare flore purpureo *Tab. hiſt. Ic.* 2. 1063. eſt Spina alba ſylveſtr. Fuchs. *IB.* 354. *ann.*

Carduus tomentoſus acanthifolio vulgaris flore albo. T. ſive Acanthium vulgare, flore albo *Tab. Ic. pag.* 1063. *perenn.*

Carduus capite rotundo tomentoſo T. ſive Carduus capite tomentoſo *IB.* 3. 57. Berg-Diſtel, mit runden wollichten Köpfen, nahe am Dorf, bey Niederhaußbergen, *perenn.*

Carlina acaulos magno flore T. albo, *ſemine papposo* ſeu *Carlina acaulos IB.* 3. 64. weiſe niedrige Eberswurtzel, eſt Chamaleon albus officinar. *Tab. hiſt. pag.* 1068. auf dem Aaßweyler Gebürg, Carline. *perenn.*

Carlina caulescens, magno flore purpurea T. *Ic.* 2. *Tab. hiſt. pag.* 1068. Carline noir. hohe ſchwartze Eberswurtz, auf denen höchſten Fürſten, hinter Kayſersberg. *perenn.*

Carlina ſylveſtris vulgaris T. ſive *Attractylis IB.* 3 81. caule ſpinoſiore, flore luteo radiato, eſt Heracantha *Tabern.* Drey-Diſtel, *Ic. hiſt. pag.* 1076.

1076. & *Clus. hist. CLVII.* bey allen Lüften, auf der Schlut, und anderen dürren Orten. *ann.*

Carthamus seu Cnicus sativus officinar. T. *flore luteo flosculoso semine albo anguloso, IB.* 3. 79. est Cnicus vulgaris *Clus. hist. CLII*, auf denen Feldern zu Ensis- und Blobsheim, *ann.*

Carvi T. *flore albo rosaceo semine gibbo & striato* sive Cuminum pratense seu officinarum quod Caros IB. 3. part. 2. 69. Feld oder Mattkümmich, nostr. Mackkümmig, auf denen Wiesen bey Oswald, bey dem Rhein-Zoll häufig. *ann.*

Carvifolia Vaill. Tab. fig. 2. & & *IB.* 3. 171. *floribus albis rosaceis umbellatis*, sive Cyminum sylvestre equinum Tragi, Roß-Kümmel, auf der Lingelsheimer Roßweid. *perenn.*

Cassida palustris vulgatior flore cœruleo T. *monopetalo labiato, foliis viridibus amaris, semine oblongo*, sive Lysimachia cœrulea, Tertianaria dicta *IB.* 3. 435. blauer Weidrich, bitter Fieber-Kraut, *Ic. Tab. hist. pag.* 766. & *in Rivin.*

Cassida palustris minima flore purpurascente T. Weidrich, mit rothen Blumen, beym Eckbolsheimer Ziegel-Ofen, hanc plantulam anno 1739. in prædicto loco reperi, quam in hortum medicum transtuli, ubi nunc luxuriose viget. *vid. Tab. nostr. IX. perenn.*

Caucalis arvensis echinata magno flore, T. sive Lappula canaria flore pulchro magno albo *IB.* 3. *part.* 2. 79. *rosaceo umbellato, foliis profunde incisis*, sive Echinophora magno flore Rivin. *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 290. Kletten-Körfel, mit

grosen

grosen weisen Blumen, auf denen Aeckern bey Jllkirch, Oßwald und Ittenheim. *ann.*

Caucalis arvensis echinata parvo flore & fructu T. quæ Lappula canarina *IB.* 3. *part.* 2. 80. est Echinophora Rivin. Kletten-Körfel, mit kleinen Blumen, vor dem Fischer Thor, gegen der Citadell, auf denen Aeckern gegen Oßwald. *ann.*

Centaureum minus T. *flore purpureo IB.* 3. 353. *monopetalo infundibuliformi diviso, fructu cylindraceo*, tausend Gulden-Kraut, mit rothen Blümlein, *Ic. Tab. hist.* 1. *pag.* 1166. in dem Gansauer und Eckbolsheimer Wald, *petite centaurée ann.*

Idem flore albo T. tausend Gulden-Kraut, mit weisen Blumen, zu Heilgenstein copiose.

Centaurium minus purpureum ramosissimum palustre Vaill. Tab. VI. fig. 1. klein Sumpf tausend Gulden-Kraut, mit rothen Blümlein und vielen Stenglein, auf feuchten Wiesen, bey Oßwald vor dem Fischer-Thor, auf der Schiffmatt. *ann.*

Chamædrys laciniatis foliis T. *flore monopetalo labiato, semine subrotundo*, sive Botrys vericillata *IB.* 3. 298. *Lob. Ic.* 385. aut Iva moschata, folio multifilo Rivin *Germandrée Femelle*, Jven Kraut, mit gespaltenen Blättern, auf denen Brach-Aeckern, nach der Erndte *ann.*

Chamædrys fruticosa sylvestris melissæ folio T. sive Salvia sylvestris vel Scordium folio salviæ, *IB.* 3. 293. *floribus subluteis monopetalis labiatis*

biatis, *Ic. Tab. hist.* 761. Wald-Salbey, *Ic. in Rivin.* in dem Hördter Wald, auf dem Gebürg zu Oberbronn. *perenn.*

Chamænerion vulgare latifolium T. *flore luteo rosaceo, fructu siliquoso*, sive Lysimachia speciosa, quibusdam Onagra. dicta siliquosa IB. 2. part 2. 906. est Chamænerion HEyst. gelber Weidrich, breitblättriger Schoten-Weidrich, an der Ill, gegen Oßwald, in der Ruprechtsau, an dem Rhein. *perenn.*

Chamænerion glabrum majus T. *latifolium* sive Lysimachia siliquosa major CBp. *flore purpureo rosaceo. Herbe St. Antoine*, schöner rother Weidrich, mit breiten Blättern, *Ic.* 6. *Tab. hist.* 1238. an denen Wasser-Gräben, in der Ruprechtsau, an der Ill gegen Oßwald. *perenn.*

Chamænerion glabrum minus T. sive Lysimachia minor, *Tab. hist.* 3. *pag.* 1237. kleiner rother Weidrich, zu Oßwald an feuchten Orten. *perenn.*

Chamænerion villosum magno flore purpureo T. sive Lysimachia siliquosa hirsuta, majore flore purpureo IB. 905. *Lysimache rouge*, haarichter Weidrich, mit grosen röthlichen Blumen, *Ic.* 4. *Tab. hist.* 1237. in dem XV. Wört am Rhein.

Chamænerion villosum minus parvo flore T. sive Lysimachia siliquosa hirsuta minor. CBp. parvo flore purpurascente, klein haarichter Weidrich, *Ic.* 5. *Tab. hist.* 1237. am Weg nach der grünen Wart und hinter Barr. *perenn.*

Cha-

Chamænerion villoſum, parvo flore T. ſive Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta flore minore, *IB*, 2. 906. eſt Lyſimachia, *II. Tab. hiſt. pag.* 1237. in dem XV. Wört am Rhein, an denen Wercken gegen der Citadell, unter denen Weiden, am Waſſer, bey allen Lüſten.

Chenopodium fœtidum T. *flore apetalo, ſemine plano orbiculato*, ſive Altriplex fœtida *IB*. 2. 974. quæ *Vulvaria Tab. hiſt.* 8121. ſtinckende Melte, Schaam-Kraut, an denen Mauren alter Stadtgräben. *ann.*

Chenopodium anguſtifolium laciniatum minus T. ſive Atriplex anguſtifolia laciniata minor, *IB*. 2. 972. ſchmahl blättrige Miſtmelte, an allen Wegen, und an denen Wiſtſtätten. *ann.*

Chenopodium folio laciniato, coma vireſcente T. *Ic. Tab. hiſt.* 2. 812. wilde Melte, *Arroche ſauvage*, an Gräblein, in Niederhaußbergen, und zu Schiltigheim in dem Ried. *ann.*

Chenopodium folio laciniato, coma purpuraſcente T. *Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 810. wilde Melde, mit rothen Gipfel, an feuchten Waſſer-Gräben, *ann.*

Chenopodium Pes anſerinus I. *Tab. hiſt.* 812. T. ſive Atriplex dicta Pes anſerinus *IB*. 2. 975. *Pale Oye*, breite wilde Melde, mit Gänſe-Fuß Blättern, Schweintodt, faſt aller Orten, in Gräben und Zäunen, wie auch an denen Mauren, *ann.*

Chenopodium Pes anſerinus II. *Tab. hiſt.* 812. & T. ſive Atriplex dicta Pes anſerinus

alter sive ramosus IB. breite Wald-Melte, mit spitzigen Gänse-Fuß Blättern. ibid. *ann.*

Chenopodium folio sinuato candicante T. sive Atriplex sylvestris *Tab. hist.* 810. & *IB.* 2972. wilde Melte, mit weiß glänzenden Blättern, bey denen Miststätten, und auf denen Gartners-Feldern. *ann.*

Chenopodium Betæ folio T. sive Blitum erectius vel III. Tragi *IB.* 2. 967. est *Blitum polyspermum*, Fisch-Melte, *Ic. Tab. hist. pag.* 1219. auf denen Aeckern, gegen der Contrescarpe, vor dem weissen Thurn, und Cronenburger-Thor. *ann.*

Chenopodium folio oblongo integro Dillen. seu Spuria Atriplex folio oblongo angusto VolcKamer. Flor. Norimb. pag. 53. Melte mit schmahlen langen gantzen Blättern, zu Schiltigheim, an denen Aeckern, und in denen Kraut-Gärten. *ann.*

Chenopodium Opuli folio Vaill. Tab. VII. fig. 1. wilde Melde, mit Schwelgen Blätteren, an denen Mauren der Stück Magazin, gegen der Citadell. *ann.*

Chenopodium stramonii folio, *Vaill. Tab. VII. spicatum & racemosum, coma purpurascente,* wilde Melde, mit Stechäpfel Blättern, und langen zugeschnütztem Strauß, zu Illkirch in dem engen Weg, gegen dem Wasser, und in denen Zäunen, unterhalb dem Wickhäusel. *ann.*

Chondrilla sonchifolio, flore luteo pallescente sive *Sonchus Sylvaticus* 4. *Tab. hist. Ic.* 11. 501.

501. est *Lactuca sylvestris murorum flore luteo* IB. 2. 1004. Wald Sonchen-Kraut, mit bleich gelben Blumen, in dem Illkircher Wald, und zu Niederbrunn, an dem Bach, aus denen Mauren, zu Barr in denen Reben. *ann.*

Chondrilla sonchifolio flore flore purpurascente T. *semiflosculoso*, *semine papposo*, sive Sonchus purpureus Col. Part. 1. 244. est. *Lactuca sylvatica purpurea* IB. 2. 1005. Wald-Lattich, mit Sonchen-Kraut, mit purpur rothen Blumen, in bergichten Wälderen hinter Barr, *Condrille ronge per me in hort. transposit. late provenit. perenn.*

Chrysanthemum folio minus secto glauco T. sive *Chrysanthemum segetum Lob. Ic.* 552. est *Chrysanthemum arvense, Tab. hist.* 2. 366. Acker Gold-Blum, auf denen Felderen bey Illkirch, wie auch zu Oswald unter der Frucht. *ann.*

Circæa lutetianorum T. sive *Ocimastrum verrucarium* IB. 2. 977. *foliis solani, flore bipetalo, radice repente alba, fructu pyriformi oblongo, Lobel. Ic. pag.* 266, & 412. *Circée* Wald-Kletten, in feuchten schattichten Büschen und Hecken, gegen Oswald. *perenn.*

Circæa minima T. sive Circæa solanifolia alpina CBp. kleine Wald-Klette, auf dem Gebürg gegen Hochfeld, und Neuweiler, in dem Wald. *perenn.*

Cirsium arvense sonchifolio radice repente, flore purpurascente T. *composito, flosculoso odorato semine papposo*, *Chardon aux anes*, Haber oder Acker-Distel, *Ic. Tab. hist.* 1079. in Haber-Felderen,

deren, an denen Gräben und Landstrasen, vor dem Spithal-Thor. *perenn.*

Idem flore albo T. suaveolente, Haber-Distel, mit weisen wohlriechenden Blumen, an der Landstrase gegen dem Wickhäusel, *perenn.*

Cirsium arvense sonchifolio, radice repente caule tuberoso T. *flosculis albis odoratis*, sive Carduus hæmorrhoidalis Parif. HRP. Haber-Distel mit knollichten Stengeln, in dem XV. Wört, in dem Gansauer-Wald, auf einer Insul, hinter des Försters Hof, *colligitur apud nos à Rhizotomis studiose lucri causa, ad compescendos hæmorrhoidum dolores. perenn.*

Cirsium pratense asphodeli radice latifol. foliis tenuiter incisis T. sive *Iacea aculeata* seu *tuberosa Tab. hist. Ic.* 4. 436. Stachel oder Flocken-Kraut, in der Ruprechtsau, neben denen Hecken in dem Ried, zwischen der Ill und dem Rhein, bey Schönau. *perenn.*

Cirsium pratense polycephalon vulgare T. sive Carduus palustris capitulo viscoso, foliis sinuosis per marginem rarioribus spinis cinctis, Wiesen Krampf, Ader-Kraut, mit vielen Blumen, auf feuchten Matten, bey dem Mauer-Hof, beym Rhein-Ziegel-Ofen. *perenn.*

Cirsium asphodeli radice latifolium T. sive Carduus bulbosus Monspel. Lob. Ic. 10. breit blättrig Flocken-Kraut, auf feuchten Wiesen, hinter dem Ochsen-Wört. *perenn.*

Cirsium acaulon flore purpureo T. sive Chamæleon exiguus Tragi IB. 3. 62. est Carlina minor

minor purpureo flore *Clus. hist.* CLVI. kleine Eberswurtzel, mit rothen Blumen, aller Orten, auf dürren grasichten Orten. *perenn.*

Clematitis sylvestris latifolia T. seu *dentata* *IB.* 2. 125. *flore albo rosaceo, semine plumoso angulo so subnigro, Liene ou herbe aux Gueux*, Lienen oder Wald-Reben, mit zerkerften Blättern, Gänse-Mordt, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1273. in denen Zäunen, in der Ruprechtsau, und auf dem Weg, gegen Illkirch. *perenn.*

Eadem foliis non incisis T. sive Clematitis latifolia integra *IB.* 2. 175. Wald-Reben, mit gantzen Blätteren, ibid. *perenn.*

Clinopodium arvense ocymi facie T. Acinos multis IB. flore purpureo monopetalo verticillato labiato, *semine oblongo Ic.* 4. *Tab. hist.* 739. & *in Rivin. Basilic sauvage*, Stein-Boley, auf denen Aeckeren zu Illkirch, und Ruprechtsau. *ann.*

Clinopodium origano simile elatius majore folio T. seu Origani facie *IB.* 3. *part.* 2. 250. groser Wirbel-Dost, *Ic. in Rivin.* & *Tab. hist.* *pag.* 736. an denen Hecken, bey der Carthauß. *perenn.*

Clymenum Parisiense cœruleo flore T. *papilionaceo cœrulescente albo fructu siliquoso, semine orbiculari*, sive Cicercula sylvestris *Tab. hist. Ic.* 4. 885. est Lathyrus sylvaticus Rivin. Kichern mit Wicken-Blättern, auf der Kraft, auf feuchten grasichten Orten, oberhalb Blobsheim.

Cnicus pratensis acanthifolio, flore flavescente T. *flosculoso semine papposo*, sive Carduus pratensis Tragi, *Lob. Icon* 11. *IB.* 3. 42. Wiesen-

sen-Distel, mit gelblicht weisen Blumen, an der Breusch, vor dem weisen Thurn, zu Oswald auf feuchten Wiesen. *perenn.*

Cnicus pratensis acanthi folio flore purpureo, T. humilior Wiesen-Distel, mit rother Blume, auf feuchten Matten, in der Ruprechtsau, und in dem Ostwinckel, *perenn.*

Cnicus sylvestris hirsutior sive Carduus benedictus T. *flore luteo flosculoso*, Cardebenedicten *Chardon benit*, *Ic. Tab. hist.* 1066. zu Schiltigheim, auf den Aeckern *ann.*

Conyza major vulgaris T. *floribus subluteis flosculosis hirsutis, semine papposo*; sive *Conyza major Matthiol. Baccharis quibusdam IB.* 2. 1051. *Ic. Tab. hist.* 243. *Herbe à punaises ou chasse puce*, grose Dürrwürtzel, auf denen Gräben alter Stadt-Mauren, an der Mauer beym Spital-Thor. *perenn.*

Conserva cynosbatos seu Spongiola Rosæ sylvestris. Dodon. Schlaf-Kuntzen, Hagenbutten-Schwämme, an denen wilden Rosen-Hecken.


Corallo Fungus flavus. Vaill. Tab. 8. fig. 4. sive Coralloides flava IB. 123. in apice dentata ramosa; gelber Corallenästiger Schwam.

Cucubalus Plin. T. seu *Alsine Baccifera IB.* 2. 175. *flore albo caryophyllæo, fructu molli ovato nigro* est Alsine repens majus *Clus. hist.* CLXXXIII. Hecken oder Busch Hüner-Darm, neben denen Aeckeren, gegen Lingelsheim, in denen Hecken, in dem Steinthal häufig. *perenn.*

Cuscuta major T. *flore monopetalo campaniformi ex rubro pallescente, fructu subrotundo angulato* sive

p. 245.

Tab. X.



sen-Distel, mit gelblicht weisen Blumen, an der Breusch, vor dem weisen Thurn, zu Oßwald auf feuchten Wiesen. *perenn.*

Cnicus pratensis acanthi folio flore purpureo, T. humilior Wiesen-Distel, mit rother Blume, auf feuchten Matten, in der Ruprechtsau, und in dem Ostwinckel, *perenn.*

Cnicus sylvestris hirsutior sive Carduus benedictus T. *flore luteo flosculoso*, Cardebenedicten *Chardon benit*, *Ic. Tab. hist.* 1066. zu Schiltigheim, auf den Aeckern *ann.*

Conyza major vulgaris T. *floribus subluteis flosculosis hirsutis, semine papposo*; sive *Conyza major Matthiol. Baccharis quibusdam IB.* 2. 1051. *Ic. Tab. hist.* 243. *Herbe à punaises ou chasse puce*, grose Dürrwürtzel, auf denen Gräben alter Stadt-Mauren, an der Mauer beym Spital-Thor. *perenn.*

Conferva cynosbatos seu Spongiola Rosæ sylvestris. Dodon. Schlaf-Kuntzen, Hagenbutten-Schwämme, an denen wilden Rosen-Hecken.

Corallo Fungus flavus. Vaill. Tab. 8. fig. 4. sive Coralloides flava IB. 123. in apice dentata ramosa; gelber Corallenästiger Schwam.

Cucubalus Plin. T. seu *Alsine Baccifera IB.* 2. 175. *flore albo caryophyllæo, fructu molli ovato nigro* est Alsine repens majus *Clus. hist.* CLXXXIII. Hecken oder Busch Hüner-Darm, neben denen Aeckeren, gegen Lingelsheim, in denen Hecken, in dem Steinthal häufig. *perenn.*

Cuscuta major T. *flore monopetalo campaniformi ex rubro pallescente, fructu subrotundo angulato*

sive

five *Cuscuta vel Cassuta IB. 3. 166. Cassitha Tabern. hist.* 1102. Seiden oder groß Filtz-Kraut, *Cuscute*, an grasichten Orten, an denen Stauden-Gewächsen, in der Ruprechtsau zu Oßwald. *ann.*

Cuscuta minor T. sive Epithymum *Tab. hist.* 743. *Epithim*; kleine Flachs-Seide, auf dem Glacis, vor dem Steinstrasser und Weisenthurn Thor, auf denen Aeckeren, an dem Flachs. *ann.*

Daucus annuus minor floribus rubentibus, rosaceis umbellatis, T. Anthriscus quorundam semine aspero hispido *IB. 3. part. 2.* 83. Acker-Kletten, mit rothen Blumen, auf brachliegenden Aeckern zu Illkirch und Oßwald, an den Zäunen, gegen dem Wickhäusel. *ann.*

Daucus annuus minor floribus albis T. sive Anthriscus quorundam semine aspero hispido umbellis albicantibus *IB. 3. part. 2.* 83. Acker Kletten, mit weisen Blumen, auf dem Glacis, der Citadell, auf denen Aeckern, gegen Haußbergen. *ann.*

Dens leonis foliis hirsutis & asperis caule aphyllo T. sive Hieracium caule aphyllo hirsutum, *IB. 2.* 1037. Löwen-Zahn, mit haarichten Blättern, auf brachliegenden Aeckern, an verschiedenen Orten hinter dem Rhein-Zoll. *perenn.*

Dens leonis foliis canescentibus villosis T. sive Hieracium montanum angustifolium foliis cichoraceis incanis lanuginosis quod Hieracium Hedypnoidis folio, *Clus. hist.* CLXII an Sonnenreichen bergichten Orten, zu Oberbronn. *perenn.*

Digitalis lutea magno flore T. *flore monopeta-*

lo

lo anomalo, fructu acuminato, seu Digitalis lutea flore majore folio latiore, *IB.* 3. 813. est Digitalis lutea *Tab. hist.* 244. grose gelbe Finger-Hütlein, auf dem obersten Gebürg, Halgenstein, bey Blinschweyler, *Digitale jaune perenn.*

Digitalis purpurea, T. & *Ioh. B.* 2. 812. *folio aspero*, grose Fingerhütlein, *Ic. Rivin. Digitale rouge*, auf dem Gebürg, St. Ottiliæ per me auf dem Haulenberg. *perenn.*

Digitalis flore magno candido. T. & *IB.* 2. 803. hinter Blinschweyler, 3. Viertel Stund häufig, *per me* auf dem Haulenberg. *perenn.*

Digitalis major lutea vel pallida, parvo flore T. seu Digitalis flore subluteo angustiore folio *IB.* 2. 814. gelbe kleine Fingerhüttlein, auf dem Hochgebürg zu Rappolsweyler, oberhalb Dusenbach, *perenn.*

Dipsacus sativus T. *flore flosculoso semine striato* T. & *IB.* 3. 75. sive Carduus fullonum Lob. Ic. 17. zahme Karten oder Weber-Distel, bey Wörth.

Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris major T. Dipsacus sylvestris seu Labrum Veneris, *IB.* 3. 74. *flosculis flosculosis rubris*, wilde Karten-Distel, mit rothlichten Blumen, *Chardon á foulon á fleure rouge Ic. Tab. hist.* 2. *pag.* 1070. an denen Landstrassen aller Orten, *perenn.*

Dipsacus folio laciniato T. & *IB.* 3. 75. *vel secundus Tab. hist. Ic.* 3. *pag.* 1071. *flosculis albis flosculosis*, Karten-Distel, mit weisen Blumen, und eingeschnittenen Blättern, am Weg, vor der ersten

sten Rhein-Bruck, hinter Schiltigheim am Wasser. *perenn.*

Dipsacus sylvestris capitulo minore, vel Virga pastoris minor CBp. est Scabiosa angustifolia flore subcoeruleo HEyst. kleine wilde Karten-Distel, *petite verge á berger*, *Ic.* 3. *Tab. hist.* 1071. an dem Weg, lincker Hand am Garten, bey der Aubruck häufig, wie auch zu Höhnheim, *perenn.*

Elichrysum seu Stoechas citrina latifolia T. *flore flosculoso semine papposo*, sive Stoechas citrina latiore folio *IB.* 3. 153. seu Amaranthus luteus *Tab. hist.* 3. 778. Rhein-Blumen, Immerschön, mit Schwefel gelben Blumen, und breiten Blättern, bey Schweighausen, gleich vor dem Dorf häufig, wie auch zu Bischweyler, auf der Hagenauer Hardt, bey Mergenthal. *perenn.*

Elichrysum seu Stoechas citrina angustifolia T. sive Stoechas citrina tenuifolia Narbonensis *IB.* 3. 154. Rhein oder Motten-Blumen, von schwefelgelber Farbe, und schmahlen Blättern ibid *perenn.*

Elichrysum germanicum calice ex aureo rutilante T. Motten-Blumen, mit goldgelben Blumen, zu Mertzweyler häufig. *perenn.*

Elichrysum spicatum T. sive Gnaphalium rectum *IB.* 3. 160. *folio angusto oblongo, floribus flosculosis in caule positis*, groß schmahl blättrig Ruhr-Kraut, auf sandigen Orten, an der Breusch, gegen Eckbolsheim, in Gantzauer Wald *perenn.*

Equisetum foetidum majus sub aqua repens

CBp. & *IB.* 3.731. *valde fragile, subcinerei coloris,* stinckender Pferde-Schwantz, in der Ruprechts-au, in schleimichten Wasser-Gruben *perenn.*

Equisetum fœtidum tenuioribus ramulis per extremitatem stellatis Dillen. Catal. plantar. Giss. zart stinckend Pferd-Schwantz, in der Ruprechtsau. *ibid.*

Erysimum vulgare T. sive Erysimum Tragi *IB.* 2.863. *flosculis luteis cruciformibus, siliqua tenui longa*, quod Erysimum *Irio* 5. *Tab. hist.* 840. *Velar ou Tortelle*, Weg-Senf, aller Orten, an denen Wegen, neben den Mauren, auf dem Graben alter Stadt-Mauer. *ann.*

Euphrasia officinarum T. sive Euphrasia *IB.* 3.432. Augen-Trost / *flore monopetalo anomalo bilabiato, Ic. in Rivin. & Tab. hist.* 1246. aller Orten auf denen Wiesen. *ann.*

Euphrasia minus ramosa, flore ex cœruleo purpurascente HEyst. auf denen Wiesen bey Oßwald / bey dem Rhein Ziegel-Ofen häufig, est Euphrasia Rivin. kleiner Augen-Trost, mit blaulichten Blumen. *ann.*

Euphrasia ramosa pratensis flore albo, *monopetalo personato amplo flore albo, fructu oblongo*, HEyst. Augen-Trost, mit grosen weisen Blumen, auf der Lingelsheimer Nachtweid häufig, auf der Wiese, zwischen allen Lüften, und dem Mauerhof. *ann.*

Faba flore candido lituris nigris conspicuo. T. *fructu siliquoso*, sive Faba major recentiorum *Lob. Ic.* 57. est Faba, *Tab. hist.* 879. Welsche oder

Sau-

San=Bohnen, auf denen Feldern aller Orten, *Grande Feve. ann.*

Fagopyrum vulgare erectum T. *folio hederaceo, floribus purpurascentibus apetalis, semine triangulari*, Heyde=Korn, in denen Feldern zu Drusenheim, *Ic. Tab. hist. 646. Blé ann.*

Fagopyrum vulgare ſcandens T. ſive Helxine ſemine triangulo IB. 2. 157. quod *Volubilis Tab.hist.* 1264. *Blénoir nigra* Buch=oder ſchwartze Winde, mit einen 3eckigten ſchwartzen Saamen, auf denen Aeckern, und neben dem Weg Oßwald zu. *ann.*

Fagopyrum ſcandens altiſſimum dumetorum, *flore apetalo ſemine triangulari, Rupp. Flor. Ien.* ſteigendes Heide=Korn, auf der Elſau, in denen Gärtners Zäunen, auch bey den Steinſtraſer Thor, auf der Contreſcarpe *ann.*

Fœniculum vulgare germanicum T. *foliis capillaceis, floribus roſaceis luteis, ſemine gibbo & ſtriato*, Fenchel *Fœnouil Ic.* 2. *Tab. hiſt.* 147. auf denen Gartners=Felderen, und an den Reinen, der Reben zu Ergersheim, und Wolcksheim. *perenn.*

Fœniculum ſylveſtre humilius Peucedani foliis T. ſive Caucalis Anglica, *Tab. hiſt. Ic.* 97. *floſculis albis roſaceis radice alba* Stein=Fenchel, bey Oßwald auf der Nachtweyd. *perenn.*

Fucus fluviatilis aculeatus undulatus T. eſt *Fluvialis Piſana IB.* 3. 779. foliis denticulatis, in der Jll gegen Oßwald, nahe am Ufer, *perenn.*

Fucus tubuloſus inteſtinorum forma T. ausgehölter Meer=Kohl, in ſtillſtehenden faulen Waſ-

ser-Gräben, auf dem Weg in der Ruprechtsau.

Fungus crassus in metam surrectus T. *superne cinerei, inferne ex flavo pallescentis coloris* est XX. gen. nox. fung. Clus. hist. CCLXXXIV. in dem Brumbter Wald.

Fungus truncis humi jacentibus innatus, pluribus ex pediculo prodeuntibus CBp. seu Amanita fasciculosa, ex luteo aut fusco rufa, radicibus arborum innascens Dillen. in dem Hagenauer Forst, an alten faulen abgehauenen Stöcken der Bäume.

Fungus albus acris CBp. & Vaill. est Fungus Piperatus albus lacteo succo turgens IB. 3. 825. *vescus pileolo candido*, weisse Pfifferling, hin und wieder in Wäldern, an alten Buchen.

Fungus angulosus & veluti in lacinias sectus CBp. est *Fungus luteus pallidus*, *Chanterelle dictus* se contorquens esculentus IB. 3. 832. est Fungus nemorum Lob. Ic. 273. Rötling oder Augst-Schwämme, *Ic. Vaill. Tab. XI. fig.* 14. & 15. in dem Brumbter Wald, an alten abgehauenen Stämmen der Bäume.

Galeopsis procerior caliculis aculeatis, flore purpurascente T. *monopetalo labiato, semine oblongo*, sive Cannabis sylvestris quorundam Lob. Ic. pag. 527. est Cannabis spuria Rivin. stachelichte Acker-Nessel, mit rothen Blumen, an der Landstrasse, in denen Gräben und Hecken, gegen Eckbolsheim, in feuchten Gräben am Weg, nach Schiltigheim, *Tab. hist. Ic.* 2. *pag.* 936. *ann.*

Galeopsis procerior caliculis aculeatis flore flave-

flavescente T. sive Cannabis sylvestris spuria tertia Lob. Ic. 528. stachelichte Acker-Nessel, mit bleich gelben Blumen, bey der Carthauß, an denen Zäunen, auf denen Aeckeren, gegen Schiltigheim. *ann.*

Galeopsis procerior, caliculis aculeatis floribus candidis T. Acker-Nessel, mit gantz weisen Blumen, oberhalb der grünen Wart, neben der Landstraß. *ann.*

Galeopsis procerior fœtida spicata T. sive Galeopsis vel Urtica iners magna fœtidissima, IB. app. 853. est Lamium maximum sylvaticum fœtidum, flore monopetalo labiato purpurascente punctato, stinckende Wald-Nessel, in denen Hecken und Höltzern aller Orten, est Urtica V. Tab. hist. 921. & in Rivin. sub nomine Stachys sylvatica. *perenn.*

Galeopsis patula segetum, flore purpurascente, T. sive Ladanum segetum, flore rubro quorundam, IB. 855. est Alyssum Galeni flore purpureo *Tab. hist. Ic. 2. pag.* 928. purpurrothe Alyssen, oder Kornwuth, auf denen Aeckeren, hin und wieder, Ic. Rivin. sub nomine Ladanum segetum folio latiore *ann.*

Eadem flore albo T. weise Korn Wuth, auf dem Gebürg, gegen Urbisthal, *anno præterito sub oculos cecidit*, zu Brischwickersheim, auf brachliegenden Aeckern.

Galeopsis palustris betonicæ folio, flore variegato T. sive Galeopsis angustifolia fœtida IB. 3. app. 854. est Clymenum minus Dalech.

Lugd. 1357. in HEyst/est *Lysimachia Galericulata.*

Gentiana major lutea T. seu vulgaris major Ellebori albi folio *IB. 3. 520. flore monopetalo campaniformi*, groß Entzian, Bitterwurtzel, wächst häufig auf dem Bölchen, in dem Obern-Elsaß, auf welchem sich ein unergründlicher Teich befindet, so mit Felsen umgeben, und Ao. 1740. bey der allgemeinen Wasserfluth, oberhalb an zweyen Orten gesprungen, und viele Dörfer verwüstet hat, und so er unterhalb Luft bekommen, geglaubet wurde, daß dadurch gantz Elsas hätte, zu grund gehen müssen. *perenn.*

Gentiana cruciata T. sive Gentiana minor, seu Vulgi cruciata IB. 3. 522. est Gentiana XII. Clus. hist. 313. *floribus purpureis monopetalis campaniformibus erectis & cruciatim dispositis, radice longa alba, fructu ovato semine plano marginato, Gentiane croisée* Modelgeer, Creutzwurtz, zu Oßwald Lingelsheim und Hanßauer Wald häufig, *Ic. Tab. hist. pag.* 1104. *perenn.*

Gentiana major purpurea T. seu magno flore purpureo IB. 3. 521. est Gentiana major purpureo flore Clus. hist. 312. auf dem Gebürg bey Oberbronn und in dem Urbisthal. *perenn.*

Gentiana angustifolia autumnalis major T. sive Pneumonanthe, *Tab. hist.* 1176. Wasser Lungen-Blum, Lungen-Entzian, bey dem Krümmeri, und auf denen Hanßauer Matten häufig. *perenn.*

Gentiana autumnalis ramosa T. sive Gentiana

tiana annua *Clus.* 1. *flore ex cœruleo purpureo IB.* 3. 526. auf der Gansau vor dem Wald zu Illkirch, in dem Wald häufig. *ann.*

Gramen spicatum spica cylindracea tenuissima longiore T. sive Gramen cum cauda muris purpurascente IB. 2. 473. est Gramen Alopecuroides minus alterum Lob. Ic. 9. Fuchs-Schwantz Graß, auf der Contrescarpe, vor dem Weisen-Thurn, neben denen Aeckern, fast aller Orten, vor dem Steinstrasser Thor. *perenn.*

Gramen spicatum spica cylindracea crassiori T. sive Gramen Typhinum 11. *Tab. hist. pag.* 531. Liesch-Graß, hinter Barr auf denen Matten *perenn.*

Gramen paniculatum autumnale, panicula ampliore ex viridi nigricante T. sive Gramen Harundinaceum montanum Tab. hist. pag. 541. vel enode *IB.* 2. 481. Berg Ried-Graß, auf Berg-Waldungen, hinter Wassenburg, hinter Heilgenstein, in dem Hagenauer Forst. *perenn.*

Gramen montanum panicula spadicea delicatiore, *IB.* 2. 476. auf dem Niedecker Gebürg *perenn.*

Gramen montanum panicula miliacea sparsa *CB. prodr.* 17. & *IB.* 2. 462. Berg-Graß, mit einem Hirse-Strauß, auf dem Gebürg gegen Niedeck.

Hieracium chondrillæ folio glabro radice succisæ majus T. *flore semiflosculoso semine papposo*

sive

five Hieracium minus, præmorsa radice Fuchs. *IB.* 2. 1031. & *Lob. Ic.* 237. *Ic. Tab. hist.* 4. 491. Habicht-Kraut, mit Chondrillen Blättern, und Abbiß Wurtzel, an denen Gräben, der Landstraß nach Höhnheim, bey der ersten Bleich am Wasser-Zoll, auch auf denen Wiesen, *perenn.*

Hieracium chondrillæ folio glabrum T. five Aphacoides *Tab. hist. Ic.* 5. 492. Habich-Kraut, mit Pfaffenröhrleins-Kraut, ähnlichen Blättern auf der Contrescarpe, zwischen dem weisen und Cronenburger-Thor, auf denen Wiesen hin und wieder. *perenn.*

Hieracium chondrillæfolio hirsutum T. five Hieracium folio & facie Chondrillæ Lobel. *Ic.* 239. & *Tab. hist.* 11. 494. an denen Wegen, und an denen Hecken, zu Eschau und Jllkirch. *perenn.*

Hieracium foliis coronopi T. *atro virentibus seu nigrum Tab. hist. Ic.* 3. 491. Schwartz Habich-Kraut, zu Oßwald, Jllkirch, und Eckbolsheimer Wald, auf den Glacis, um die Stadt. *perenn.*

Hieracium fruticosum latifolium foliis dentatis glabrum T. five Hieracium majus latifolium Pannonicum 2. *Clus. hist.* CXL. *IB.* 2. 1027. Habich-Kraut, mit breiten glatten Blättern, bey Keysersberg, in denen Hecken. *perenn.*

Hieracium fruticosum hirsutum angustifolium majus T. five *Hieracium rectum rigidum quibusdam Sabaudum IB.* 2. 1030. Berg Habich-Kraut,

Kraut, mit schmahlen harten Blättern, auf dem Berglein, bey Mittelhaußbergen, *perenn.*

Hieracium pilosellæ folio erectum majus T. sive *Pilosella minori flore hirsutior & elatior non repens* *IB.* 2. 1040. est Pilosella major altera *Ic. Tab. hist.* 3. 507. grose Mauß-Oehrlein, oder groß aufrecht stehendes Habich-Kraut, mit haarichten Mauß-Oehrlein Blättern, auf den Wiesen bey Gravenstaden, auf dem Glacis, vor dem Fischer-Thor, an denen Mauren. *perenn.*

Hieracium pilosellæ folio erectum minus T. sive Pilosella major. *Tab. hist. Ic.* 2. 507. Habich-Kraut, mit langen spitzigen Blätteren, und bleich gelben kleinen Blumen, in denen Waldungen, hinter Heilgenstein. *perenn.*

Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro T. sive Hyoseris angustifolia *Tab. hist.* Ic. 2. 490. klein Fercklein-Kraut, auf der Metzgerau, vor dem Fischer-Thor. *perenn.*

Hieracium minus dentis leonis folio sub aspero T. sive Hypocheris porcellia *Tab. hist.* 489. Ferckel-Kraut, *Salade de porco*, in der Ruprechtsau, auf der Promenade *perenn.*

Hieracium dentis leonis folio obtuso majus T. sive *Hieracium macrocaulon junceum primum Dodon. IB.* 2. 1031. est Hieracium longius radicatum *Tab. hist. Ic.* 7. *pag.* 492. *caule fistuloso*, Habich-Kraut, mit Pfaffen-Röhrlein Blättern, und grosen Wurtzeln, auf den Wiesen bey Oßwald, und dem Canal, an den Reben bey Barr. *perenn.*

Hieracium murorum folio minus piloso non

maculato T. HAP. *folio angustiore indissecto seu Pulmonaria gallica tenuifolia Tab. hist.* 505. Buch-Kohl, mit schmahlen Blättern, ohne Flecken, in dem Wald zu Ingweyler. *perenn.*

Hieracium murorum laciniatum minus pilosum T. sive Pulmonaria Gallica fœmina *Tab. hist. Ic. 2. pag.* 504. Buch-Kohl, mit gefleckten Blättern, und auf denen alten Mauren. *ibid.*

Hieracium luteum hirsutum T. & *IB.* 2. 1024. an der Landstrase, vor dem Spithal-Thor, in der Ruprechtsau *perenn.*

Hordeum distichum, quod spica binos ordines habeat T. *flore apetalo, semine oblongo acuto* seu Hordeum distichum æstivum trimeste minus *Ic. 2. Tab. pag.* 621. Sommer-Gerste, Futter-Gerst, auf allen Feldern. *ann.*

Hordeum distichum spica nitida Zea seu Briza nuncupatum T. sive Briza monococcos Dod. *Lob. Ic.* 31. *Ic. Tab. hist.* 2. *pag.* 608. Einkorn zu Drusenheim und Weisenburg. *ann.*

Hordeum distichum Zea dicoccos dictum *Tab. hist. Ic.* 1. *pag.* 608. Speltz, ibid. *ann.*

Hordeum polystichum vernum T. sive Hordeum polystichum æstivum *Tab. hist. Ic.* 3. 621. Sommer-Gerste, mit vielen Reihen, *ann. ibid.*

Hordeum polystichum hybernum T. sive majus, *Tab. hist.* 1. *pag.* 621. Wintergerst.

Hottonia Bœrh. Ind. plant. alter 207. sive Millefolium aquaticum Viola aquatica dictum. *IB.* 1782. *floribus sub purpurascentibus rosaceis, foliis pennatis, caule erecto nudo,* Wasser-Violen, mit auf-

aufrechtstehendem Stengel, und purpurrothen Blumen, beym XV. Wört, in der Ruprechtau, in einem Graben. *perenn.*

Iacea pratensis nigra latifolia. T. sive Iacea nigra vulgaris capitata & squamosa *IB.* 3. 27. *piloso folio non laciniato, flore flosculoso purpureo, semine papposo*, Flocken-Baum / *Iacée Ic. Tab. hist.* I. 436.

Iacea nigra laciniata T. sive Iacea austriaca *VI. Clus. hist.* Flocken Blum, mit gekerften Blättern, auf denen Wiesen, auf der Contrescarpe, vor dem weisen Thurn. *perenn.*

Iacea cum squamis cilii instar pilosis T. & *IB.* 3. 28. sive Cyanus foliis imis ad basin pinnatis, superioribus integris ovato lanceolatis Haller. 691. ubi Icon egregia, auf denen Wiesen zu Eckbolsheim, zu Oßwald und Illkirch. *perenn.*

Iacea nemorensis quæ Serratula vulgo T. sive Serratula *IB.* 323. *foliis serratis ad radicem integris reliquis profunde incisis flore purpureo flosculoso*, Scharten-Kraut, auf denen Wiesen, beym Mauerhof, und in dem Illkircher Wald. *perenn.*

Eadem flore albo T. Scharten-Kraut, mit weisen Blumen, *rarius occurrit. perenn.*

Iacea nigra angustifolia vel Lithospermi arvensis foliis caule aspero T. Schwartze Flocken-Blum, mit schmahlen Blättern, und rauhen Stengel, auf dem Glacis, vor dem weisen Thurn und Cronenburger Thor, auf denen Wiesen, gegen Eckbolsheim. *perenn.*

Iacea

Iacea vulgaris laciniata flore purpureo T. sive Scabiosa major squamatis capitulis CBp. *Ic. Tab. hist.* 3. *pag.* 435. est Centaurium collinum Gesneri, flore purpureo *IB.* 3. 32. gemeine grose Flocken-Blum, mit zackichten Blättern, auf denen Aeckern, bey Oßwald und Niederhaußbergheim, und andern heckichten Orten, *perenn.*

Iacea integrifolia humilis CBpr. 127. niedrig stehende Flocken-Blum, mit gantzen Blättern, bey den Eckbolsheimer Ziegel-Ofen, *perenn.*

Iacobæa palustris altissima foliis serratis T. *floribus radiatis semine papposo*, sive Virga aurea angustifolia serrata, sive Consolida palustris, *Tab. hist* 946. vel Lingua avis Dalechamp. IB. 2. 1063. Wasser gulden Wund-Kraut, an dem Ufer der Jll, gegen Oßwald. *perenn.*

Iacobæa latifolia IB. 2. 1057. St. Jacobs-Blnm, mit breiten Blättern, an denen Rändern Gebüsche und Wälder, zu Aaßweiler.

Iuncus acutus panicula sparsa T. sive Iuncus *foliaceus IB.* 2. 521. *Ionc* kleine Weyher-Binse, mit flattrichten Strauß. *Ic. Tab. hist.* 3. *pag.* 566. an feuchten sumpfichten Orten, auf denen Wiesen zu Oßwald. *perenn.*

Iuncus acumine reflexo minor & trifidus T. seu Iuncus trifidus *IB.* 2. 521. Moß-Bintze, in der Ruprechtsau, in sumpfichten Orten, in dem Eckbolsheimer Wald, in wässerichten Gruben. *perenn.*

Iuncus. palustris humilior erectus T. seu Holo-

Holoſtium Matthioli junceum *IB.* 2. 510. & *Lob. Ic.* 18. Krotten-Graß, auf wässerichten Wiesen, aller Orten, in der Ruprechtsau.

Iuncus foliis articulatis floribus umbellatis T. eſt Gramen aquaticum *Tab. hiſt. Ic.* 1. *pag.* 529. Wasser Bintzen-Graß, auf wässerichten Matten, zu Oßwald und Gravenſtaden. *perenn.*

Iuncus parvus cum pericarpiis rotundis IB. ſeu Gramen junceum III. *Tab. hiſt. Ic.* 3. 535. gar klein Bintzen-Graß, iu sumpfichten Orten, unten an dem Glacis, vor den Metzger und Spithal-Thor. *perenn.*

Lactuca ſylveſtris odore viroſo T. *flore luteo ſemifloſculoſo, caule lacteſcente ſemine papposo Ic. Tab. hiſt. pag.* 807. Laitue ſauvage. wilder Lattich, auf der Contreſcarpe, vor dem Steinstrasser-Thor häufig, auf denen Gräben, alter Stadt-Mauren, *perenn.*

Lactuca ſylveſtris coſta ſpinoſa T. ſive Endivia multis dicta, folio laciniato dorſo ſpinoſo *IB.* 2. 1003. & *in Matthiol. Epit.* 30[illegible] Leber-Distel, Gänse-Zung, vor dem Fischer-Thor häufig, und auf denen Wällen, *ann.*

Lactuca montana latifolia laciniata, flore cœruleo T. ſive Sonchus cœruleus latifolius *IB.* 2. 1005. eſt Sonchus lævis IV. *Tab. hiſt. Ic.* 6. 500. Wald-Lattich, blauer Hasen-Kohl, *perenn.*

Lactuca perennis humilior flore cœruleo, T. ſive *Chondrilla cærulea IB.* 2. 1019. & *Tab hiſt. Ic.* 1. *pag.* 486. blau Chondrillen-Kraut, auf dem

Paß-

Paßberg, zu Buchsweyler, und auf denen Frucht-Aeckern daselbst, *perenn.*

Lapathum minimum T. *flore apetalo semine triangulari* & *Tab. hist. Ic.* 4. 824. seu Lapathum acutum minimum *IB.* 2. 985. kleine Grind-Wurtzel, mit zugespitzten Blättern, in denen Gräben, gegen dem Wickhäusel, auf feuchten Aeckern bey Illkirch. *plus petit patience perenn.*

Lapathum aquaticum folio cubitali T. sive Lapathum maximum aquaticum sive Hydrolapathum, *IB.* 2. 986. est Lapathum palustre *Tab. hist. Ic.* 5. *pag.* 824. Wasser-Ampfer, Butterwecken-Kraut, aut Herba vera & genuina Britannica veterum Munting. Icon. 1. pag. 695. *plus grande Patience aquatique*, in dem Stadt-Gräben, vor dem Metzger-Thor. *perenn.*

Lapathum aquaticum minus T. sive Hydrolapathum minus *Tab. hist. Ic.* 6. 824. est Lapathum vulgare minus Munt. hist. pag. 690. klein Wasser Grind-Wurtzel, aller Orten, in feuchten Gräblein, und andern wässerichten Orten. *Petite Patience aquatique perenn.*

Lappa major Arctium Dioscoridis T. sive *Personata, Lappa major aut Bardana IB.* 3. 570. & *Lob. Ic.* 588. *Ic.* 1. *Tab. hist. p.* 1157. *flore composito flosculoso purpureo, folio latiore integro, capitulis tomentosis; semine papposo; est Bardana officinar. Bardane ou Grand Glouteron*, grose Kletten, mit wollichten Köpfen, und rothen Blumen. *perenn.*

Lappa capitulis glabris Halleri *pag.* 675. sive *Personata seu Lappa major Matthiol. Epit. pag.* 887.

& IB.

& *IB.* 3. 570. grose Kletten, mit glatten zackichten Köpfen, bey Höhnheim. *perenn.*

Lappa majore montana capitulis minoribus rotundioribus & magis tomentosis T. sive Personata altera cum capitulis villosis *IB.* 3. 571. Berg-Kletten, mit röthlichten Köpfen, auf den Wassenburger Gebürg *perenn.*

Laserpitium foliis latioribus lobatis Moris umbell. 29. & T. *flosculis albis rosaceis, semine striato*, grose weise Hirsch-Wurtzel, auf dem Gebürg hinter Hochfelden, ingleichen zu Hochfeld, bey der Meickerey, *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 312. *perenn.*

Lavendula angustifolia T. *flore monopetalo labiato cœruleo*, Lavendul, mit blauen Blumen, aller Orten in Gärten, *Ic. Tab. hist* 3. 755. *perenn.*

Eadem flore albo *IB.* 3181. Lavendel mit weisen Blumen.

Lavandula latifolia T. sive Pseudonardus quæ vulgo Spica *IB.* 3. *part.* 2. 281. Spick *Aspic ou Nard commune perenn.* ibid.

Lepidium latifolium T. sive Lepidium Pauli *IB.* 2. 940. *flosculis albis cruciformibus, foliis oblongis, gustus acerrimi, radice alba repente. semine oblongo*, Pfeffer / oder Fleisch-Kraut, *Ic. Tab. hist.* 847. in Gärten. *perenn.*

Lens major T. & *IB.* 2. 317. *flore papilionaceo fructu brevi siliquoso, semine orbiculari convexo*, grose Linsen, Pfenning-Linsen, auf denen Gartners und Bauren-Aeckern, Lentille *Ic. Tab. hist.* 858. & *in Rivin. ann.*

Lens vulgaris semine subrufo T. sive Lens

IB. 2.

IB. 2. 317. kleine gemeine braune Koch-Linsen. ibid. *ann.*

Lens vulgaris semine ex luteo pallido T. gemeine weise Koch-Linsen. *ibid.*

Lentibularia vulgaris HRP. & Rivin. sive Millefolium aquaticum flore galericulato luteo, *Lobel*, 791. & *IB.* 3. 783. *monopetalo anomalo*. Wasser-Fenchel, mit gelben Blumen, vor dem Fischer-Thor, in denen Wasser-Gruben, rechter Hand, ingleichen zwischen dem Canal, und dem Eckbolsheimer Wald. *perenn.*


Ligustrum T. & *IB.* 1. 528. *flore albo monopetalo infundibuliformi odorato fructu globoso nigro semine gibbo*, Hartriegel Bein-Holtz, *Frœne Ic. Tab. hist.* 1454. *perenn.*


Ligustrum foliis é luteo variegatis HAP. sive *Ligustrum varieghatum Munting. hist.* 258. *Frœne panachée*, Hart-Riegel, mit gelb gefleckten Blättern / in dem Ruprechtsauer und Illkircher Wald. *perenn.*


Lingua cervina officinarum T. Phyllitis seu Lingua cervina vulgi, *IB.* 3. 756. Phyllitis vulgaris *Clus. hist. floribus in aversa parte provenientibus muscosis luteis Langue de cerf.* Hirsch-Zung, *Ic. Tab. hist.* 1192. hinter Barr, in denen schattichten Bergen. *perenn.*

Lotus pentaphyllos minor glabra, foliis longioribus & angustioribus H. Edinb. & Vaill. est Lotus pentaphyllos frutescens, tenuissimis glabris foliis CBp. kleiner Schoten Klee, vor dem Fischer-Thor, nahe an dem Ziegelofen. rarioris est proventus.

Lychnis


p. 242.
Tab. XI.
Lentibularia Rivin.
J. Striedbeck. sculp.


p. 266.
Hydrocotyle. T.
Tab. XII.
J. Striedbeck Sculp.



Lychnis sylvestris quæ Behen album vulgo foliis angustioribus T. *flore caryopyllæo* auf den Wiesen beym Mauerhof, an den Glacis, der Citadell gegen dem Rhein-Zoll häufig. *perenn.*

Lychnis annua minima, flore carneo, lineis, purpureis distincto T. sive Betonicæ vel Tunicæ minimæ similis planta *IB.* 338. in dem Ostwinckel, auf denen Aeckern, gegen der hohen Warth. *ann.*

Lycopus palustris glaber T. *flore monopetalo labiato, semine subrotundo,* sive Marrubium aquaticum quorundam *IB.* 3. 318. *foliis hirsutis laciniatis, floribus monopetalis campaniformibus albis,* weiser Wasser Andorn, an denen Wasser Gräben, gegen der grünen Warth. *Ic. in Kivin. sub nomin. Pseudo marrubii perenn.*

Lycopus palustris foliis in profundas, lacinias incisis T. zu Oswald, in einem Graben bey der letzten Brucke *perenn.*

Lycopus palustris villosus T. sive *Marrubium palustre hirsutum* CBp. in der Ruprechtsau, bey der ersten Bleich, bey der Walckmühl, nahe an der Brück *perenn.*

Lysimachia lutea major quæ Dioscoridis T. sive Lysimachia lutea *IB.* 2. 901. *flore monopetalo rotato, fructu globoso,* gelber groser Weydrich, *Perce bosse. ou Lysimachie,* zu Oswald in denen Hecken. *perenn.*

Eadem foliis ternis T. quæ Lysimachia lutea HE. in der Ruprechtsau, an den Wasser, an Gräben *perenn.*

Eadem foliis 4ternis & quinis, *non sunt diversæ species, sed solummodo variationes, quod bene annotavit Bœrhave.*

Marrubiastrum vulgare T. sive Stœchas arvensis minima Rivin. *caule quadrangulo subhirsuto, foliis serratis, floribus subcœruleis verticillatis monopetalis labiatis, semine subrotundo*, auf denen Aeckern unter der Gerste, *ann.*

Marrubium album vulgare T. & *IB.* 3. 316. *floribus monopetalis verticillatis labiatis, folio incano rugoso, semine oblongo.* weiser Andorn, *Marrube blanc Tab. hist.* 925. & *in Rivin.* auf dem Schießrein, bey denen Gärten, an dem Weg gegen dem Rhein zu. *perenn.*

Marrubium Cardiaca dictum T. *flore purpureo labiato*, Hertzgespan, *Agripaume & in Rivin Ic.* 1. *Tab. hist.* 535. an denen Zäunen, in der Ruprechtsau, und andern Orten mehr. *perenn.*

Mays granis aureis T. sive Triticum Indicum, *IB.* 2. 453. *floribus apetalis, semine subrotundo. plures ejus sunt species uti videre est in Instit RH. Tournef. pag.* 531. Türckisch oder Welschkorn, *Blé de Tourquie*, auf denen Felderen *ann.*

Melilotus capsulis reni similibus, incapitulum congestis T. *flore papilion.* seu Trifolium pratense luteum Mas, flore minore, semine multo *IB.* 3. 280. est Trifolium arvense, *Tab. hist. Ic.* 3. 908. vel Melilotus minima Rivin. gelber Wiesen oder Feld-Klee, auf dürren Wiesen und Aeckern gegen Oßwald. *ann.*

Mentha aquatica T. *flore monopetalo labiato,*

sive

five Pulegium *IB. 3. part. 2. 256.* Poley *Puliot. Ic. 3. Tab. hist. 730. & in Rivin.* in sumpfichten und feuchten Orten, in der Ruprechtsau und vor der grünen Wart. *perenn.*

Eadem flore albo T. Poley, mit weisen Blumen, an der Landstrasse, gegen allen Lüften. *perenn.*

Mentha aquatica sive Pulegium vulgare humifusum non repens, cauliculis longissime se extendentibus ruberrimis, floribus in globum congestis, foliis minoribus. nobis, auf denen Sandbäncken, wo die Breusch in die Ill fält. *perenn.* vid. Tab. nostr. X.

Mentha arvensis verticillata hirsuta T. *IB. 3. part. 2. 217. floribus monopetalis labiatis, hirsutis fulvis Ic. Tab. hist. 1. 737. & in Rivin. Calament sauvage*, Acker-Müntze, auf Aeckeren, bey Haußbergen, auf der Lingelsheimer Nachtweyd, *perenn.*

Mentha rotundifolia palustris seu Aquatica major T. Mentha aquatica sive Sisymbrium *IB. 3. part. 2. 233.* est Mentha rubra officinarum, flore monopetalo labiato, pallide rubescente, rothe Bach oder Fisch-Müntze, in allen Stadt-Gräben, *Ic. Tab. 3. hist. 736. & in Rivin. perenn.*

Mentha sylvestris, longioribus, nigrioribus & minus incanis foliis T. sive Mentha spicata folio longiore acuto glabro nigriori, *IB. 3. part. 2. 220.* Schwartze Roß-Müntzen / in dem Weg gegen Gutleuthen, nach dem Schiltigheimer Feld, wo man gemeiniglich die Wecken verkauft. *perenn.*

Millefolium aquaticum umbellatum, capillaceo breviquefolio CBp. sive Millefolium & Fœniculum aquaticum *Tab. hist. Ic.* 1: *Tab. hist.* 186. in sumpfichten und stillstehenden Teichen.

Nicotiana major latifolia T. *flore monopetalo infundibuliformi purpurascente, folio molli acuminato integro, fructu oblongo* Tabac, *Herbe de la Reine Ic. Tab. hist.* 971. auf denen Felderen. *ann.*

Nigella arvensis cornuta T. sive Melanthium sylvestre vel arvense *IB.* 3. 209. *flore sub cæruleo rosaceo, foliis fœniculaceis, fructu oblongo*, St. Catharinen Blumen, wild Narden-Kraut, *Ic.* 4. *Tab. hist.* 192. auf Saam Feldern, nach vollendter Erndte, zu Oßwald. *ann.*

Onagra latifolia T. sive Lysimachia lutea corniculata *flore monopetalo rosaceo, fructu cylindraceo*, gelber gehörneter Weydrich, an dem Weg gegen dem Rhein-Zoll, oberhalb der Rheinbruck, in der Ruprechtsau, gegen Auenheim am Rhein. *perenn.*

Onobrychis foliis viciæ fructu echinato major T. *flore eleganter rubente papilionaceo, fructu siliquoso*, Hahnen-Kamm, mit röthlichten Blumen, *Sain foin ou Espavette*, est Polygala Gesneri, *IB.* 2. 335. *Ic. in Rivin.* in denen Klammen, bey Niederhaußbergen, und Brischwickersheim häufig, *perenn.*

Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato major, caulescens & ramosa Schol. Bot. auf denen Berglein, zu Mundelsheim. *perenn.*

Oreoselinum apii folio majus T. *flore rosaceo um-*

umbellato, *semine ovato striato*, sive Libanotis altera quorundam, aliis dicta Cervaria nigra *IB. 3. part. 2. 165.* Schwartze Hirtzwurzel, Berg-Peterlein, *Ic. 3. Tab. hist. pag. 313.* est *Cervaria Rivin. & Garidel hist. plant. Tab. 116.* auf dürren Wiesen, oberhalb Bennfeld häufig. *perenn.*

Oreoselinum apii folio minus T. sive Apium montanum Dalechampii *IB. 3. part. 2. 103. Ic. 1. Tab. hist. 276. Persil de Montaigne*, Berg-Peterlein, Berg-Eppich, auf Bergmatten, auf dem Halgensteiner Hochgebürg.

Oreoselinum pratense Cicutæ folio T. sive Umbellifera alsatica magna, umbella parva sublutea, *IB. 3. part. 2. 106.* gelber Vogels-Nest, auf feuchten Matten, bey Ehrstein und Weisenburg *perenn.*

Origanum sylvestre T. sive Origanum vulgare spontaneum *IB. 3. 236. flore purpureo monopetalo labiato, semine subrotundo* Wohlgemuth, Dosten, *Origan Ic. Rivin. Tab. hist. 4. pag. 726.* in denen Hecken zu Oßwald, und an denen Reinen, der Strassen *perenn.*

Origanum sylvestre album sive Origanum album, *Tab. hist. Ic. 1. 725.* Dosten mit weisen Blumen, an den Zäunen und Gräblein, nach der Carthauß, bey Mittelhaußbergen, in den Reben *perenn.*

Orobanche ramosa floribus cœruleis T. *monopetalis anomalis personatis, fructu oblongo unicapsulari*, Hanfwürger mit blaulichten Blumen, aller

Orten, in Tabac-Stücken zu Schiltigheim. *perenn.*

Orobanche ramosa floribus purpurascentibus T. seu Orobanche minor, purpureis floribus sive ramosa *IB.* 2. 781. Hanfwürger mit röthlichen Blumen. *ibid.*

Orobanche ramosa floribus sub albidis T. Hanfwürger, mit weisen Blumen, auf Tabac-Stücken zu Oßwald.

Parnassia vulgaris & palustris T. *flore rosaceo fructu ovato*, Gramen Parnassi Dodon. quibusdam Hepaticus flos, *IB.* 3. 537. weise Hertz-Blumen, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 527. in dem Illkircher und Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Pedicularis serotina lutea. T. *flore monopetalo anomalo*, sive Coris Monspessulana lutea IB. 3. 433. est Odontites flore luteo Rivin. gelber Augentrost, beym Eckbolsheimer Ziegelofen, an Lingelsheimer Wäldlein,

Persicaria mitis maculosa T. *floribus apetalis purpureis spicatis*, sive Persicaria mitis IB. 3. 777. est Persicaria 11. *Tab. hist. pag.* 1240. gelind fleckigt Flöh-Kraut, mit rothen Blumen, *Persicaire tacheté*, aller Orten, in sumpfichten Grunden, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Persicaria mitis non maculosa T. *floribus purpureis*, Flöh-Kraut, mit röthlichen Blumen und Blättern, ohne Flecken, ibid. *perenn.*

Persicaria mitis non maculosa *floribus candidis* gelind Flöh-Kraut, ohne Flecken, mit weisen Blumen, vor dem Juden-Thor, hinter der Citadell. *perenn.*

Per-

Perſicaria mitis cum maculis ferrum equinum referentibus T. ſive Perſicaria mitis maculoſa Lobel. Ic. 315. gelind Flöh-Kraut, mit Roßeiſen gleichenden, gefleckten Blättern, um den Mauerhof, auf Kraut-Aeckeren häufig. *perenn.*

Perſicaria minor T. ſive Perſicaria puſilla, repens *Lob. Ic.* 316. & *Tab. hiſt. Ic.* 3. 1240, klein Flöh-Krant, mit rothen Blumen, auf feuchten Aeckeren und andern ſumpfichten Orten, bey Oßwald unter denen Weiden-Bäumen. *perenn.*

Perſicaria anguſtifolia T. *caule rubente lævi ac geniculato, ſpicis oblongis, floribus ex geniculis pallide purpuraſcentibus apetalis*, eſt Perſicaria pumila *Tab.* 1240. *ſemine ovato*, Flöh-Kraut, mit ſchmahlen Blättern, und röthlichten Stengel, wie auch bleichrothen Blumen, in ſumpfichten Orten, beym Lazareth, in der Ruprechtsau an dem Rhein. *perenn.*

Perſicaria ſalicis folio, Potamogeton anguſtifolium dicta Ray Hiſt. Saam-Kraut, mit Weiden Blättern, in Teichen und Waſſer Gräben um die Stadt, vor dem weiſen Thurn. *perenn.*

Perſicaria urens ſeu Hydropiper T. IB. 3. 780. Eſt Perſicaria acris, *floribus rubentibus in ſpicam non compacte congeſtis, ſed magis á ſe invicem diſtantibus. folio longo, Courage Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 1240. Waſſer-Pfeffer, brennend Flöh-Kraut, mit langen Blättern, und rothen Blumen, auf dem Schießrein am Waſſer, bey der Brucke gegen Schiltigheim, *dicitur acris non ab urendo ſed ob foliorum & ſeminis ſaporem quadantenus acrem.*

Persicaria palustris fluitans, foliis brevioribus & latioribus, florum spica spinosa purpurea compactiore Rupp. Flor. Jen. Wasser-Pfeffer, mit rundlichten Blättern, und dicht gedrungenen Blumen, bey Oßwald mitten in der Ill, gegen des Herren Prætoris Schloß über häufig, am Ufer gegen Oßwald der Ill. *perenn.*

Polium Lavendulæ folio T. *flore monopetalo labiato albo, quod Ajuga folio integro est* Rivin. sive Polium recentiorum fœmina Lavendulæ folio *Lob. Ic.* 488. & *Tab. hist. Ic.* 5. 750. wilder Lavendel, Berg-Poley, über dem Mauerhof, rechter Hand gegen Oßwald, an einer steinichten Grube, auf der Metzgerau, an deren Hügeln, hin und wieder *perenn.*

Polium lavendulæ folio angustiori T. sive Polium campestre *Tab. hist. Ic.* 6. 750. wilder Lavendel, mit schmahlen Blättern, auf dürren Wiesen, gegen der Gansau, bey der hohen Wart, auf erhabenen sandigen Heyden. *perenn.*

Polygonifolia, floribus & seminibus extremis ramulis acervatim congestis Dillen. Catalog. Plant. *flosculis albis rosaceis*, est Polygoni- vel Linifolia per terram sparsa flore, scorpioides *IB.* 3. 379. *Ic. vid. Tournefort Alsat. sub nomine Alsine palustris minor Tab.* 11. *hist. c.* bey Wolfsheim am Canal.

Polygonum latifolium T. sive *Polygonum aut Centinodia IB.* 3. 374. *flore apetalo stamineo rubro semine triangulari*, breit blätterich Weg-Graß, mit rothen Blümlein, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1214. *Re-*

nonce

nonce ou Centinode, hin und wieder an denen Wegen, *perenn.*

Idem flore candido T. Blut-Graß, mit weissen Blumen, *ibid.*

Polygonum brevi angustoque folio T. sive Polygonum, *Tab. hist.* 1214. Wegtritt, mit kurtzen schmahlen Blättern, gegen Oßwald, neben den Aeckeren, wie auch in der Ruprechtsau, *perenn.*

Polygonum oblongo angustofolio T. sive Polygonum angustifolium *IB.* 3. 376. est Polygonum III. *Tab. hist.* 515. Wegtritt, mit langen schmahlen Blätteren, auf den Feldern zu Oßwald, vor dem Fischer-Thor gegen der Citadelle *perenn.*

Polypodium vulgare T. sive Polypodium, *IB.* 3. 746. *flosculis subluteis muscosis, dorso foliorum exeuntibus, foliis dissectis, radice repente*, Engel-Sueß, Farrn-Kraut, auf dem Wassenburgischen Gebürg, an denen Felsen, und auf denen alten Eichbäumen, *Ic. Tab. hist.* 1188.

Polypodium minus T. kleine Wald Süese-Farn, zu Oberbronn, auf dem Römischen Berg-Schloß Wassenburg, auf denen alten Mauren hinter Barr. *perenn.*

Polypodium angustifolium fol. vario T. sive Lonchitis altera folio polypodii, *IB.* 3. 344. wilde Hirsch-Zung, in dem Bärenthal, etliche Stund, von Buchsweyler, in dem Thal, gegen dem Ottilien-Brunnen, von Heilgenstein, *Ic.* 2. *Tab. hist. pag.* 1190. *perenn.*

Porrum sylvestre II. *Tab. hist.* Ic. 872. *flore liliaceo fructu subrotundo, semine subrotundo, Porreau sauvage*; wilder Brißlauch, auf sumpfichten Wiesen, beym Maurhof häufig. *perenn.*

Porrum sectivum juncifolium T. sive Porrum sectile Matth. 873. *flore liliaceo purpureo*, Schnittlauch, in Gärten und Gartners-Feldern, *perenn.*

Portulaca latifolia sativa seu domestica T. *flosculis subluteis rosaceis fructu ovato*, & *IB.* 3. 678. *Ic.* 2. *Tab. hist.* 830. zahmer Burtzel, *Pourpier domestique*, in Gärten und Gartners-Feldern. *ann.*

Portulaca angustifolia seu sylvestris vel spontanea T. *Pourpier sauvage Ic.* 1. *Tab. hist.* 396. wilder oder Acker-Burtzel, auf sandigen Aeckern bey Oßwald, und in der Ruprechtsau. *ann.*

Potamogeton pusillum, gramineo folio, caule rotundo Rap. Hist. *flore cruciformi viridescente* sive Potamogeton pusillum gramineo folio breviori Vaill. *Ic.* 4. *Tab. XXXII.* gar kleiner Wasserlock, mit runden Stengeln, in dem XV. Wört, in einem Gräblein häufig. *perenn.*

Potamogeton ingens gramineo folio longiori fructu quadrigemino *Vaill. Tab. XXXII. fig.* 5. Mittelmässig Wasserlock, mit langen Graß-Blättern, in der Ill bey Oßwald, gegen der Uberfahrt, est *Peucedanum aquaticum Tab. hist.* 187. *nostratibus* Flußlock, *perenn.*

Ranunculus palustris folio angustiore plantaginis T. *flore simplici rosaceo albo fructu globoso*, sive Plantago aquatica minor *Tab. hist. pag.* 1114.

1114. Schmahl-blättrichter Wasser-Wegerich, *Plantain d'eau à feuilles etroites*, in Gräben, neben denen Wiesen, in der Ruprechtsau, unten an dem Glacis, vor dem Metzer-Thor. *perenn.*

Ranunculus palustris plantaginis folio humilis & supinus T. sive Plantago aquatica humilis angustifolia & longifolia *Lob. Ic.* 300. kleiner niedriger Wasser-Wegerich, im Gräblein zwischen Oßwald, und Gravenstaden, unten an dem Glacis, in sumpfichten Orten, vor dem Metzger-Thor. *perenn.*

Ranunculus palustris plantaginis folio ampliore T. sive Plantago aquatica *IB.* 3. 787. est Plantago palustris sive aquatica *Tab. hist. Ic.* 1111. groser Wasser-Wegerich, mit breiten Blättern, *Plantain deau, à feuilles larges. perenn.*

Ros solis folio subrotundo T. *flore rosaceo fructu ovato*, sive Ros solis foliis circinnatæ rotunditatis, *IB.* 3. 761. est Ros solis major *Lob. Ic.* 811. *flore monopetalo rasaceo albe, radice pilosa seu Rorella Ic.* 1. *Tab. hist.* 1202. Sonnen-Thau, mit rundlichten Blättern, *Rosée du Soleil.* auf dem Mooß, auf dem Hochfeld. *perenn.*

Ros solis foliis oblongis T. & *IB.* 3. 761. *Ic. Tab. hist.* 1202. Sonnen-Thau, mit länglichten Bieren-Laub ähnlichen Blättern, in dem Hagenauer Forst, und Hördter Wald *perenn.*

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis T. *flore rosaceo, fructu ovato*, sive Lysimachia purpurea spicata, *IB.* 2. 902. brauner Weidrich, auf feuchten Wiesen, und an denen Wasser-Gestaden, *Salicaire*, *Ic. Tab. hist.* 1236. *perenn.* Sa-

Salicaria hyssopifolio latiore T. sive Hyssopifolia aquatica, *IB.* 3. 792. *floribus rosaceis cœrulescentibus*, auf feuchten Wiesen bey Ehrstein.

Salicaria hyssopifolio angustiore T. *minus ramosa* in dem Ried, zwischen der Ill, und dem Rhein bey Marckelsheim, wie auch in feuchten Orten, in dem Ruprechtsauer Wald. *perenn.*

Sedum majus vulgare T. & *IB.* 3. 687. seu Barba Jovis, *flore rosaceo stellato umbellato, fructu multicapsulari, la Grande Joubarbe*, grose Haußwurtz, *Ic. Tab hist. pag.* 1224. & *HEyst.* auf denen Stroh-Dächern der Bauren *perenn.*

Sium latifolium T. sive Sium maximum latifolium *IB.* 2. 175. est Pastinaca palustris *Tab. hist.* 2. 202. seu Sium Rivin. grose Wasser-Pastinacke, *Berle* in denen Stadtgräben, ausserhalb der Stadt. *perenn.*

Sium aquaticum virulentum, foliis multifidis longis & serratis, floribus subluteis rosaceis, caule excavato striato & geniculato, succum luteum fundente, fructu subrotundo radice crassa fibrosa acri, quod Cicuta est Wepferi vel Sium aquaticum majus angustifolium *Tab. hist. Ic.* 4. 203. vel Cicutaria Rivin. giftiger Wasser-Schirling, *perenn.*

Sium umbellatum repens Ger. emacul. vel Sium aquaticum ad alas floridum Moris umb. 63. *radice repente* klein kriechender Wasser-Eppich, bey dem Wasser, auf dem Schießrein, bey der Bruck, gegen der Tabac-Mühl, auf einer feuchten Wiese, vor dem weisen Thurn, gegen dem Fort. *perenn.*

Sisym-

Sisymbrium annum absinthii minoris folio T. sive Sophia Chirurgorum Lob. Icon. 198. est Seriphium Germanicum *IB.* 2. 886. Well Saamen, Besen-Kraut, hin und wieder an denen Wegen, und alten Mauren. *ann.*

Solanum tuberosum esculentum T. *flore albo monopetalo rotato simplici fructu globoso seu Papa, american. IB.* 3. 614. *quæ Arachidna Theophrast. Clus. hist.* LXXIX. Tartuflen oder Grund-Bieren, mit weisen Blumen, *Ic. Tab. hist. pag.* 869. auf denen Aeckern und Feldern. *perenn.*

Idem flore purpureo, Grund oder End-Bieren, mit rothen Blumen, ibid.

Utrumque quandoque fert flores plenos.

Solanum officinarum acinis nigricantibus T. sive Solanum hortense seu vulgare acinis nigris, *IB.* 3. 608. Nacht-Schatten, mit schwartzen Beeren, an feuchten Orten und Winckeln, an schattichten Mauren, in der Stadt. *Morelle à fruit noir, Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 1993. *ann.*

Solanum officinarum acinis luteis T. sive Solanum hortense seu vulgare acinis luteis *IB.* 608. *folio minori virenti*, Nacht-Schatten, mit gelben Beeren, *Morelle à fruit jaune*, an dem Brumbter und Hördter Wald häufig. *ann.*

Sonchus lævis laciniatus latifolius T. *flore semiflosculoso, semine papposo*, sive Sonchus, minus lacinosus, mitior sive minus spinosus *IB.* 2. 1014. glatter Hasen-Kohl, Gänse-Distel, mit breiten eingeschnittenen Blättern, *Tab. hist. Ic.* 4. 499. auf den Brach-Aeckern, und Kraut-Aeckern um die Stadt. *perenn.* Son-

Sonchus lævis minor paucioribus laciniis, T. kleiner Hasen-Kohl, mit glatten Blättern, *Ic. Tab. hist.* 3. 499. ibid. *perenn.*

Sonchus lævis angustifolius T. glatter Hasen-Kohl, mit schmahlen Blättern, *Ic. Tab. hist.* 495. & *Lob. Ic.* 236. in denen Gräblein vor dem Spithal-Thor, gleich an der Brück. *perenn.*

Stachys major germanica T. sive Fuchsii *IB.* 3. 319. *flore albo monopetalo labiato, foliis tomentosis, semine subrotundo*. riechender Andorn, *Ic. Tab. hist.* 1. 767. hin und wieder vor denen Thoren, vor dem Wald zu Illkirch. *perenn.*

Thalictrum majus non striatum T. Wiesen-Raute, mit glatten Stengeln, auf feuchten Wiesen, bey Ehrstein, *perenn.*

Thalictrum minus T. sive Rutæ pratensis genus minus semine striato *IB.* 3. 487. zu Oberbronn, auf Berg-Wiesen, gegen Wasserburg, beym Quell-Bächlein. *perenn.*

Thalictrum pratense angustissimo folio T. Wiesen-Raute, mit sehr schmahlen Blättern, *Ic. Tab. hist.* 121. in dem Illkircher Wald häufig, auf der Lingelsheimer Nachtweyde. *perenn.*

Thymelæa linariæ folio vulgaris T. *flore monopetalo infundibuliformi* sive Passerina Tragi, *IB.* 3. 456. Spatzen-Zung, *Ic. Tab. hist.* 2. 1212. auf denen Aeckeren zu Illkirch und Oßwald, *ann.*

Thysselinum Plin. & *IB.* 3. *part.* 2. 188. *officinis* Olsnitium sive Apium sylvestre Dodon. lacteo, *succo turgens, flosculis albis rosaceis, radice nigra, semine fructu striato*, wilder Eppich, in sumpfichten

pfichten Gruben, bey der Eisenschmidt, hinter Oberehenheim, zu Maßmünster. *perenn.*

Thysselinum palustre T. *lactescens acre, foliis ferulaceis flore, albo, semine lato IB.* 3. 188. Scharfer Wasser-Eppich, *perenn.*

Tithymalus amygdaloides angustifolius *Tab. hist.* 6. 988. Wolfs-Milch, mit schmahlen Mandel-Blättern, in der Ruprechtsau, auf der Promenade *perenn.*

Tithymalus arvensis latifolius germanicus T. sive Tithymalus Platyphyllos Fuchs IB. 3. 670. breit Blättrichte Wolfs-Milch, auf denen Aeckeren und in Gärten, *ann.*

Tithymalus sive Esula exigua T. sive Esula exigua. Trag. Lob. Ic. 378. sive Tithymalus minimus angustifolius annuus IB. 3. 664. kleine Acker Wolfs-Milch, aller Orten. *ann.*

Verbascum Lychnitis, flore albo parvo T. *monopetalo rotato fructu ovato*, sive Verbascum flore albo parvo *IB.* 3. *app.* 873. est Verbascum *Lychnitis Matth. Lob. Ic.* 562. kleine weise Königs-Kertzen, oder Woll-Blumen, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 957. *Bouillon blanc*, in der Ruprechtsau, in denen Hägen, auf trockenen Wiesen gegen Oßwald.

Verbascum latifolium luteum Mas T. sive Verbascum vulgare flore luteo magno, *rotato folio maximo IB.* 3. *app.* 871. Woll Kraut, Männlein, grose Königs-Kertzen, mit grosen gelben Blumen, *Ic. Tab. hist.* 266. & *HEyst.* in der Ruprechtsau, auf der Heyde zu Brumbt häufig. *perenn.*

Verba-

Verbascum Fœmina flore luteo magno T. sive Verbascum maximum album fœmina flore sub pallido, *Lob. Ic.* 161. Woll-Kraut, Weiblein mit grosen gelben Blumen, *Ic. 6. Tab. hist.* 917. in dem Illkircher Wald, am Wasser häufig *perenn.*

Verbascum pulverulentum, *flore luteo parvo IB. 3. app.* 872. kleine gelbe Woll-Blumen, est Verbascum luteum *Tab. hist. 6. pag.* 957. bey der Spithal-Mühl am Weg / auf dem Metzger-Wall, auswendig gegen denen Gräben zu, häufig. *perenn.*

Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente T. Verbascum nigrum flore parvo apicibus purpureis *IB. 3. app* 872. est Verbascum nigr. HEyst. schwartz Woll-Kraut, mit gelben Blumen, und rothen Zäserlein, *Bouillon noir.* an dem Weg auf Sultz, auf Molßheim, in der Gegend wo der Hellebor. fœitid. wächst oberhalb der Capell. *perenn.*

Verbena communis cœruleo flore T. *monopetalo labiato semine oblongo*, seu Verbena vulgaris IB. 3. 443. Eisen-Kraut, *Verveine Ic. 1. Tab. hist. pag.* 380. & *in Rivin.* in der Ruprechtsau, und sonsten hin und wieder an denen Wegen. *perenn.*

Veronica spicata angustifolia T. *flore monopetalo rotato* sive Veronica major, angustifolia caulibus viridibus IB. 3. 284. est Veronica erecta sylvestris Rivin. aufrecht stehender Ehrenpreiß, *Ic. Tab. hist.* 4. & 5. 773. in dem Hanßauer Wald, in feuchten grasichten Orten. *perenn.*

Vero-

Veronica ſpicata longifolia T. ſive Veronica ſpicata recta, profunde ſerrata IB. 3.284. eſt Veronica ſpicata Rivin. *Ic. Tab. hiſt.* 773. Aehren Weydrich, mit blauen Blumen, und langen Blättern, in dem Illkircher Wald, hinter dem Mauerhof, bey Oßwald, auf feuchten Matten. *perenn.*

Virga aurea virginiana Zanon. ſive Aſter annuus Canadenſis flore albo papposo HRP. Canadenſiſche Dürrwurtz, faſt aller Orten. *ann.*

Urtica urens maxima T. ſive Urtica vulgaris major *IB. 3. 445. flore albo apetalo, folio ſerrato, fructu bivalvi,* groſe brennende Neſſel, *Ic. Tab. hiſt.* 2. & 4. 921. *perenn.*

Urtica urens minor T. ſive Urtica minor annua IB. 3. 446. kleine brennende oder Eiter-Neſſel, *Petite Ortie Ic.* 3. *Tab. hiſt.* 921. an denen Wegen und Wänden, *ann.*

Urtica urens maxima caule rubente T. ſive Urtica rubra *Tab. hiſt.* 4. 921. groſe brennende Neſſel, mit rothen Stengeln, in ſchattichten Orten, bey Oßwald und auf denen Glacis, der Stadt. *perenn.*

Xanthium T. ſive Lappa minor IB. 3. 572. floribus floſculoſis albis, foliis ſinuatis, *fructu ſemine oblongo*, kleine Kletten, Bettlers-Läuſe, *Petit Gletteron, Ic. Matthiol. epitom.* 926. *perenn.*

MENSIS

AUGUSTUS ET SEPTEMBER.

Abrotanum campeſtre cauliculis rubentibus, T. ſive Abrotanum ſylveſtre IB. 3. 194. *floſculis,*

luteis flosculosis inodoris, foliis capillaceis, semine papposo, wilde Stab oder Schoßwurtz, *Auronne sauvage Ic. Tab. hist.* 3. 51. gegen Oßwald, neben denen Aeckern. *perenn.*

Abrotanum campestre cauliculis albicantibus T. wilde Stabwurtz, mit grünlichten Stengeln, vor dem weissen Thurn-Thor, auf der Gansau, *perenn.*

Abrotanum Mas angustifolium majus T. zahme Stock oder Schoßwurtz, Gänsewurtz, Kuttel Kraut, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 50. in Gärten, und Gartners-Feldern *perenn.*

Absinthium ponticum tenuifolium incanum T. Römischer Wermuth, in Gärten. *perenn.*

Aconitum cœruleum sive Napellus T. & IB. 3. 655. *flore polypetalo anomalo galeato, folio dissecto atrovirente, radice nigra fibrosa, semine angulari. Cappe de Moine, Tuè Loup.* Wolfswurtz, blaue Kappen-Blumen, *Ic. Tab. hist.* 980. in Gärten, *perenn.*

Aconitum lycoctonum luteum T. sive Aconitum folio Platani flore luteo pallescente IB. 3. 652. Narren-Kappen, gelbe Eisen-Hütlein, *Aconit à fleur jaune Ic.* 4. *Tab. hist.* 982. *ibid. perenn.*

Agaricus digitatus niger apicibus albidis T. est Fungus æthiopico piperi similis Mor. hist. Ox. Part. 3. an abgefaulten Eichen-Holtz, so lang in dem Schatten gelegen, unten an eichenen Dielen, in denen schattichten Gärten, und an deren Ritzen und Spalten.

Artemisia vulgaris major, caule & floribus purpurascentibus T. *flosculis flosculosis* sive *Artemisia vulgaris IB.* 3. 184. est *Artemesia rubra Tab. hist.*

hist. 1. 27. Beyfuß oder rother Buck, *Armoise*, an denen Zäunen, bey denen Schwein-Ställen, vor dem Fischer-Thor, auf dem Glacis. *perenn.*

Artemisia vulgaris major caule ex viridi albicante T. weiser Beyfuß, est Artemisia alba *Tab. hist. Ic.* 2. 27. bey der Carthauß, vor dem Spithal-Thor. *perenn.*

Arundo vulgaris T. seu palustris IB. 2. 485. sive Canna sepiaria, *Tab. hist. Ic.* 2. 572. *folio oblongo, flore apetalo, radice fibrosa & oblique geniculata Canne ou Roseau*, in denen Stadtgräben, vor den Thoren. *perenn.*

Aster montanus luteus, foliis oblongis T. *flore radiato, semine papposo*, gelb Bergstern Kraut, in dem Illkircher Wald, im Dachsteiner Wäldlein, auf Berg-Wiesen, bey hohen Andlau, *perenn.*

Aster palustris parvo flore globoso T. sive Conyzæ mediæ minor specie, vixradiato IB. kleine Dürrwurtz, Sumpf Dürrwurtz, *Conise de Marais* *Ic.* 2. *Tab hist.* 1243. an denen Gräben, neben der Landstraß, vor dem Spithal-Thor, bey der grünen Wart. *perenn.*

Aster pratensis autumnalis Conyzæ folio T. sive Conyza media Matthioli, flore magno luteo, humidis, locis proveniens IB. 2. 1050. est Conyza media HEyst. gelbe Wasser Stern-Blumen, an denen Gräben und feuchten tieffen Orten aller wegen.

Caryophyllus flore tenuissime dissecto albo T. sive Caryophyllus plumarius albus, *Tab. hist.*

Ic. 2. pag. 286. weiſe wilde Feder-Negelein, auf der Wieſe, in dem Grandwört, und bey dem Mauerhof. perenn.

Coralloides albida T. ſive Fungus ramoſus albidus IB. 3. 837. eſt Fung. eſcul XIX. gen. Clus. hiſt. Geyſen Bart, Händlein-Schwamm, in ſchattichten Waldungen.

Filago minor T. ſive Gnaphalium minimum IB. 3. 159. eſt repens & erectum folio brevi anguſtoque, an feuchten Orten, zu Oßwald, und Lingelsheim. perenn.

Fungus pileolo lato & rotundo T. ſive Fungus campeſtris albus ſuperne inferne rubens IB. 3. 824. eſt Fungorum eſculentor. IX. gen. Clus. hiſt. CCLXVIII. Champignons. Pfifferling, in Wälderen und auf denen Vieh-Weyden, in dem Ruprechtsauer Wald.

Fungus juniperinus lævis & albicans atque exilis nobis, Wachholder Schwamm, in dem Gansauer Wald, und anderen Wachholder Stöcken.

Fungus pileolo lato puniceo, lacteum & dulcem ſuccum Fundens. CBp. ſive Fungi punicei, lacte dulci manantes, pratenſibus ſimiles edules IB. 3. 829. Brückling in dem Gansauer und Niedecker Wald.

Fungus pileolo lato, longiſſimo pediculo variegato T. ſeu Fungi longiſſimo pediculo candicantes, ſed maculati & eſculenti IB. 3. 826. Weißling, in dem Hagenauer Forſt an trockenen Orten.

Fun-

Fungus planus orbicularis aureus CBp. sive Fungi lutei magni, dicti Iaseran, speciosi IB. 3. 831. est XVII. gen. esculent. Fungor. Clus. hist. CCLXXII. Kayserling, Herren Pültz, oberhalb Peris, gegen der schwartzen See.

Fungus umbilicum referens variegatus CBp. est XIII. genus escul. Fungor. *Clus. hist.* CCLXIX. rothe Teuberling, hinter Barr, in denen Waldungen.

Fungus in metam fastgiatus albus, fusco tinctus CBp. sive *Fungi in metam fastigiati esculenti, coloris albicantis, fusco tincti IB.* 3. 828. *est III. Genus escul. Fungor. Clus. hist. CCLXV.* in Waldungen, hinter Ottrott.

Fungus perniciosus, ex eodem pediculo multiplex T. sive Fungi multi ex uno pede perniciosi IB. 3. 835. est XII. gen. pernicios. Fungor. 5. species Clus. hist. CCLXXXV. Stock-Schwämme, in dem Ruprechtsauer Wald und Hagenauer Forst.

Fungus auricularis miniatus Hofm. flore Altorf, Holtz Schwamm, an abgehauenen faulenden Bäumen, in der Ruprechtsau.

Gentiana pratensis flore lanuginoso T. *monopetalo campaniformi, fructu ovato* sive Gentiana Fugax. 11. Clus, hist. 315. hoher blauer Himmel-Stengel, mit tausend gulden Blättern, auf der Lingelsheimer Nachtweyd / und beym Polygon *perenn.*

Gentiana coerulea oris pilosis T. sive Gentianella lanuginosa IB. 3. 525. blauer Himmel-

Stengel, mit blauen an dem Rand besetzten haarichten Blumen, auf der Gansau, vor dem Wald, auf dürren Wiesen, in dem Ostwinckel. *perenn.*

Glaux palustris flore albo striato clauso foliis portulacæ. T. Ic. 1. Vaill. Tab. XV. fig. 5. vor dem weisen Thurn, auf dem Sandbänckel, wo die Brensch in die Ill fält. *perenn.*

Gramen dactylon angustifolium spicis villosis T. sive Gramen digitatum hirsutum IB. 2. 445. sive Ischæmum 11. Tab. hist. pag. 543. Blut-Graß / auf einer dürren Wiese, am Rhein-Ziegel-Ofen, auf der Landstraß nach Blobsheim. *perenn.*

Gramen dactylon, radice repente sive Officinar T. sive Gramen repens, cum panicula Graminis Mannæ, Kriechend Acker-Graß, aller Orten in Gärten, auf denen Aeckern, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Gramen dactylon folio latiore T. sive Galli Crus IB. 2. 444. Gramen Ischæmum vel Sanguinarium *Tab. hist. pag.* 534. Blut oder Schwaden-Graß, ohnweit der Sau-Bruck / am Becken Wäldlein, neben den Gärten, bey Schiltigheim, neben denen Aeckern. *perenn.*

Gramen spicatum spica cylindracea tenuiori, longa T. sive *Gramen cum cauda muris minus IB.* 2. 471. est Gramen typhinum 1. *Tab. hist. pag.* 531. Liesch-Graß, auf trockenen Wiesen, auf der Gansau, und in der Ruprechtsau. *perenn.*

Gramen

Gramen ſpicatum ſpica cylindracea glabra foliis hirſutis T. ſive Gramen cum cauda muris foliis hirſutis *IB.* 2. 471. eſt Gramen Alopecuroides minus *Lob. Ic.* 9. in denen Reben bey Mittelbergheim. *perenn.*

Gramen ſpicatum ſpica cylindracea brevi nodoſa T. ſive Gramen nodoſum ſpica parva tertium CBp. prodr. 2. 3. bey der Inſulförmigen Matt, an dem Canal, gegen des Schlieſenmeiſters Hauß, auf der Heyde, bey der Eckbolsheimer Ziegel-Hütte, *perenn.*

Gramen ſpicatum, ſpica cylindracea tenuiſſima breviore T. rufeſcente ſive *Gramen alopecurinum* II. *Tab. hiſt.* 20. *pag.* 520. auf denen Aeckern, vor dem Steinſtraſſer Thor, auf dem Schießrein, unterhalb der Lohmühl, faſt an der Brücke, *perenn.*

Gramen paniculatum autumnale, panicula anguſtiore ex viridi nigricante T. Wald-Rohr, neben dem Canal, in feuchten Gruben. *perenn.*

Gramen vulgare minus, panicula rigida T. ſive *Gramen minus duriuſculum Tab. hiſt.* 18. *pag.* 520. klein hart Graß, auf dem Wall, zwiſchen dem Juden und Steinſtraſſer Thor, vor dem Spithal-Thor, wo die Seiler arbeiten. *perenn.*

Hieracium fruticoſum anguſtifolium majus T. *flore ſemifloſculoſo, ſemine papp*o*ſo* ſive Hieracium fruticoſum rectum & rigidum *IB.* 2. 1030. Berg Habicht-Kraut, zu Mittelhaußbergheim,

in dem Ostwinckel, auf der Heyde, beym Eckbolsheimer Ziegel-Ofen. *perenn.*

Hieracium fruticosum minus T. *caule rubro.* klein Berg Habich-Kraut, zwischen dem Steinstraser und weissen Thurn-Thor häufig. *perenn.*

Hieracium montanum glabrum latifolium majus T. sive Hieracium montanum, majus latifolium *IB.* 3. 1032. *Ic. Tab. hist.* 13. 494. groß Berg Habich-Kraut, mit breiten Blättern, auf dem Ottilien Berg. *perenn.*

Hieracium montanum, latifolium glabrum minus T. sive Hieracium latifol. glabrum ex Valle Griesbachianum *IB.* 2. 1033. est Hieracium montanum latifolium minus *Tab. hist. Ic.* 14. 495. klein Berg Habich-Kraut, mit breiten Blättern, auf dem Gebürg hinter Barr, an feuchten grasichten Orten, hinter Rappolsweyler. *perenn.*

Hydrocotyle vulgaris T. sive Cotyledon aquatica *IB.* 3. 718. & *septentrional. Lob. Ic.* 387. *foliis umbilicatis flore rosaceo albo radice repente, Nombril de Venus*, Sumpf Nabel-Kraut, auf der Wiese, rechter Hand beym Mauerhof, am Wassergraben, *copiose vid. Tab. nostr. XII. perenn.*

Iuncus palustris humilior T. sive Gramen junceum bufoninum *Tab. hist. Ic.* 6. 536. *repens caliculis paleaceis*, Krotten Graß, auf allen feuchten und sumpfichten Orten. *Crapandine perenn.*

Limosella annua, flore albo monopetalo infundi-

fundibuliformi ſtellato, fructu ovato unicapſulari, ſemine fœto exiguo oblongo, foliis oblongis planis, longis pediculis inſidentibus, radicula fibroſa albicante repente. nob. ſive Alſine paluſtris repens, foliis lanceolatis, floſculis albis perexiguis Pluck. weiſe Sumpf Stern-Blümlein, in der Ruprechtsau, in feuchten Pfützen häufig. vid. Tourneſ. Alſ. Tab. V. 156.

Lupulus Mas T. & *IB*. 2. 151. *floribus apetalis herbaceis fructu ſquamoſo*, Hopfen *Hublon mâle Ic. Tab. hiſt.* 1293. in Gärten und Feldern, *perenn.*

Lupulus fæmina T. & *IB*. 2. 151. ſive Sterilis wilder Hopfen, *Houblon femelle*, wilder Hopfen, aller Orten, in denen Hecken und Zäunen. *perenn.*

Lycoperdon vulgare T. ſive Fungus pulverulentus, Crepitus Lupi dictus *IB*. 3. 848. *Veſſe de Loupe*, Bovist, auf feuchten Wieſen zu Oßwald, und in den Ganſauer Wald.

Lycoperdon minus multiplex ſpurium T. unten an denen Wurtzeln, alter Bäumen/ auf der Lingelsheimer Nachtweyd.

Lycoperdon veſicarium ſtellatum T. blaſen förmiger Stern-Schwamm, am Weg nach dem Hochfelder Gebürg, hinter Barr.

Majorana vulgaris T. *folio majore, flore albo monopetalo labiato*, Majoran *Mariolaine Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 718. *ann.*

Majorana tenuifolia T. five Majorana tenuior & lignofior *IB, 3. part. 2. 241, noftrat. Majorana nobilis*, Edler Winter-Majoran. *perenn.*

Milium femine luteo T. *folio graminee flore, apetalo, femine fubrotundo, feu Milium IB. 2. 446.* Hirse rother oder gelber Hirse, *Millet jaune Ic. 1. Tab. hift. 656.* auf denen Aeckern, *ann.*

Milium femine albo T. weiser Hirse, ibid.

Milium femine nigro T. Schwartzer Hirse, *IB. 2. 446.* eft *Milium nigrum Tab. hift. pag. 656. Ic. 2. ann.*

Orchis palmata anguftifolia minor odoratiffima CBp.

Panicum vulgare fpica fimplici & afpera T. *flore apetalo, fructu fpicato*, five Gramen fylveftre dictum & Dens canis IB. 2. 443. eft Gramen geniculatum, *Tab. hift. Ic. 3. 516.* Knoten-Graß, neben denen Aeckern, in der Ruprechtsan. *perenn.*

Panicum vulgare fpica fimplici & molliori T. wilder Fench oder Hirse, mit einfacher weicher Aehre, auf denen Aeckeren zu Oßwald, und Lingelsheim, bey dem Spithal Garten. *perenn.*

Panicum vulgare fpica multiplici longis areftis circumvallata T. five *Gramen Panicum* 11. *Tab. hift.* 538. in Gräben, hin und wieder. *perenn.*

Panicum vulgare fpica multiplici afperiufcula T. five *Panicum fylveftre Tab. hift. Ic. 3. 660.* Pfennich-Graß, mit rauhen Aehren, auf denen Kraut-

Fel-

Feldern, an denen Zäunen, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Pimpinella sanguisorba major T. *floribus monopetalis rotatis atro rubentibus, foliis pinnatis & serratis, fructu quadrangulari*, sive Sanguisorba major flore spadiceo *IB. 3. part. 2.* 120. grosse Wiesen Pimpernell groß Sperber-Kraut, *Grande Pimpernelle, Ic. 1. Tab. hist.* 316. *perenn.*

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta T. sive Sanguisorba minor, *IB. 3. part. 2.* 113. kleine haarichte Pimpernell, *Ic. Tab. hist.* 316. auf denen meisten Wiesen. *perenn.*

Pimpinella sanguisorba lævis minor T. glatte kleine Garten-Pimpernell, auch auf feuchten Wiesen bey Oßwald. *perenn.*

Polium montanum repens T. *flore purpureo monopetalo labiato* sive *Polemonium montanum supinum minimum Lob. Ic.* 488. & *Tab. hist.* 4. *pag.* 750. klein Berg-Poley, *Polium de Montaigne*, zu Barr auf denen Matten, und zu Heilgenstein *perenn.*

Pyxidaria repens annua, flosculis monopetalis anomalis unilabiatis, ex albo purpurascentibus longis pediculis insidenbus, facile deciduis, foliis anagallidi similibus, capsula oblonga, seminibus minutissimis referta. *Ic. vid. Tournef. alsat. pag.* 156. Est Montia aquatica minor Michel. nov: plant. gen. pag. 18. Tab. 13. Fig. 2. & *Mappi. Sed errat dum Montia calice gaudet bifido. in nostra autem planta in* 5. *segmenta divisa est; nominarem itaque*

que

que potius instituto exactiori examine, *Alsinoides paludosa, foliis anagallidi similibus, flosculis monopetalis rubescentibus, capsula oblonga*, Sumpf Gauchheil auf der Insul, wo die Breusch in die Ill fält. *ann.*

Tanacetum vulgare luteum T. & *IB.* 3. 131. *floribus flosculosis semine papposo*, gelbe Rhein-Farn, Wurm-Kraut, *Ic. Tab. hist.* 6. *pag.* 28. hin und wieder an denen Landstrassen. *perenn.*

Thalictrum majus non striatum T. sive Ruta pratensis major II. *Tab. hist.* 120. *Ruë de prez*, Wiesen-Raute, mit schmahlen Blättern, in dem Illkircher Wald, und andern dürren grasichten Orten, bey Ehrstein. *perenn.*

MENSIS
SEPTEMBER ET OCTOBER.

Colchicum commune T. sive Colchicum *IB.* 2. 649. seu *Autumnale, flore purpurascente monopetalo liliaceo, radice nigra tuberosa fructo oblongo trigono* Herbst-Blumen, Küh-Dutten, nostr. faule Futen, nackende Huren, *Colchique ou Mort de chien*, *Ic. Tab. hist.* 8. & 9. 1011. auf allen feuchten Wiesen. *perenn.*

Colchicum album cum purpurascentibus lineis *IB.* 2. 651. gantz weise Herbst-Blumen mit rothen Striffen, auf der Lingelsheimer Nachtweyd, auf der Wiese bey Niederhaußbergen. *perenn.*

Colchicum montanum angustifolium T. sive Colchicum montanum flore purpureo *IB.* 2. 656.

656. Berg Herbst-Blumen, mit schmahlen Blättern, auf den Berg-Wiesen hinter Barr.

Coralloides corniculis candidissimis T. sive Muscus corallinus montanus *Tab. hist. pag.* 1198. wilde Corallen-Mooß, auf dem St. Ottilen Berg an denen Felsen.

Coralloides apicibus coccineis Mapp. hist. alſ. 81. Corallen-Mooß, mit hochrothen Gipfeln, hin und wieder in Wälderen, auf faulen Bäumen, so zu Boden liegen.

Fungus muscas interficiens T. *pileolo verrucoso rotundo lato, lamellis albis pediculo bulboso*, Mucken-Schwämme, sive Fungus XII. genus Clus hist. CCLXXIX. in dem Ruprechtsauer Wald, in dem XV. Wört.

Fungus corylæus orbicularis T. sive Fungi sub corylis orbiculatæ figuræ *IB.* 3. 842. est VI. genus Fung. noxior. *Clus. hist. CCLXXVIII.* runder Haselstaude-Schwamm, in dem Ostwinckel, in dem Ganßauer Wald.

Fungus Erynus Bot. Monsp. Manns-Treu-Schwam, auf der Heyde, gegen dem Eckbolsheimer Ziegel-Ofen, auf Wiesen, bey der hohen Wart.

Fungus latus orbicularis candidus CBp. sive Fungus ranarum albi perniciosi *IB.* 3. 846. XIII. Genus perniciosor. Fung. Clus. hist. CCLXXX. auf denen Aeckern bey Matzenheim.

Fungus orbicularis in palustribus CBp. sive Fungi rubri perelegantis coloris & rufi *IB.* 3. 846. est Fungor. nox. gen. XXIII. Clus. hist. CCLXXVI.

CCLXXVI. auf feuchten Wiesen bey Ehnstein.

Fungus orbicularis secundum vias & in Quercetis autumno nascens CBp. est XIX. gen. Fungor. pernicios. CCLXXXIII. in schattichten hohen Gebürgen.

Lichen pyxidatus major T. sive Muscus pyxidatus *IB.* 3. 767. grose Kelch-Schwäncke auf dem Ottilien Berg, auf abgefaulten in schattichten und feuchten Orten liegenden Bäumen.

Lichen pyxidatus minor T. sive Muscus pyxoides saxatilis *IB.* 3. 767. kleiner Kelch-Mooß, auf den Felsen St. Ottilien Gebürgs.

Orchis spiralis alba odorata T. sive Orchis spiralis minor *Lob. Ic.* 186. klein gewunden wohlriechend Stendel-Wurtzel, auf der Schlut, beym Eckbolsheimer Ziegel-Ofen. häufig.

MENSIS
OCTOBER ET NOVEMBER.

Agaricus digitatus niger T. sive Fungus digitatus nigricans ligno ad nascens, Michel. nov plant. gen. pag. 103. ubi Icon. an alten Eichenen Pfählen und Dielen, der Wände.

Agaricus esculentus T. sive Fungus maximus laciniatus quod XXI. gen. Fung. ascul. Clus. hist. CCLXXV. Eich-Schwamm, Eich-Henne, in allen Waldung unten an alten Eichbäumen.

Agari-

Agaricus Tuba Fallopianæ instar laciniatus T, an denen alten und faulen Tannen und Foren Bäumen, die zu Boden liegen, in dem Brumbter Wald.

Coralloides Cornucervi referens, corniculis brevioribus T. gehörntes Corallen-Mooß, in denen feuchten Waldungen, an faulen Bäumen.

Coralloides abietina nivea procerior T. seu Fungus ramosus argenteus ramosus *IB.* 838.

Coralloides corniculis rufescentibus T. sive Muscus terrastris coralloides erectus corniculis rufescentibus CBp. röthlichtes Corallen-Mooß, in denen Ritzen und Spaltungen, der Steinen, in dem Barrer Wald, an den Weg, nach dem Hochfeld, ingleichen hinter Ottrott, bey der Segmühl, in steinichten Orten.

MENSIS
NOVEMBER ET DECEMBER.

In his Mensibus, ob acerbum ut plurimum frigoris acessum, Telluris spiracula occludentem, nulla in Alsatia amplius fit plantarum productio, sed quietè omnes sub terra usque ad futurum & novum progerminationis tempus delitescunt, exceptis aliquibus Fungis atque Muscis, quos vero omnes exactissime descripserunt & ad vivum orbi literato, satis superque Iconibus elegantissimis, delineaverunt Viri in re botanica perquam Celeberrimi, Clusius, Dillenius, Vaillantius, & pro tempore in-

ingeniosissimus atque Studiosissimus Dn.Dr.& Profess. Hallerus, Patronus & Amicus meus omni honoris cultu prosequendus. Et sic Horti Alsatici Ianua claudatur, his igitur acquiesce candide ac benevole Lector, atque serena fronte, hunc meum in posteritatis commodum unice inclinantem Laborem aspice. Deo interim Ter Maximo summo Botanicæ & Soli omnium rerum Creatori, cui omnia debemus, pro viribus concessis, humillima mente sit Laus Honor & Gloria in seculorum Secula.

APPEN-

APPENDIX.

Plerorumque Vocabulorum botanicorum, in hoc opuſculo contentorum Derivationes illuſtrans.

I.

ABies, hujus vocabuli derivatio, Europæis ignota.

Abrotanum, dictum ab ἁβρὸς mollis & τείνω tendo, quia folia ejus mollia & extenſa ſunt.

Abſinthium, nuncupatur, à vocabulo græco ψίνθος delectatio & particula privativa ἀ, ac ſi diceres, planta, quæ nullum præbet delectamentum, ſeu quæ minime grata eſt.

Acacia, appellationem habet, ab ἀκάζω acuo, quia tota planta ſpinoſa eſt.

Acanthus, vocis hujus origo, á græco vocabulo ἄκανθος, quod ſpinam ſignificat, quaſi mollis ſpina.

Aceris denominatio, obſcura eſt, putant quidem nomen ſuum accepiſſe ab ejus duritie, quia ad multa opera percommodum, ejus lignum, quæ torno fiunt.

Acetoſa, ejus nomen fluxit, ab Aceto, ſapore enim gaudet acido.

Aconitum, dictum ab ἀκονὴς Vertice montium quod in nudis cautibus, quas aconas vocant nascatur.

Acorus, nomen suum accepit, a Vocabulo, Acor, addita terminatione us, unde Acorus ab ejus acri sapore.

Agrimonia dicta ab Argemone.

Alcea, apellatur ab ἀλκὴ auxilio vel remedio, dum Radices dysentericis & ruptis glutinando auxiliantur.

Alchimilla, nomen sumpsisse putatur ab Alchimistis, cum ad Alchimiam quam maxime utilis est, & ab illis laudatur.

Allium, denominationem hanc quidam ab alendo, alii ab halando factam fuisse existimant, graveolentem enim de se spirat odorem.

Alkekengi, ab arabico vocabulo prodire solet, Alchechengi, alii putant ab ἅλς Mare & κάκαβος vas, quia putamen hujus fructus vas maris refert.

Alnus dicitur mente quorundam, ab Amne, quia in flumine alatur.

Alsine vocatur, ab ἄλσος Nemus, quia in nemoribus & locis umbrosis crescere solet.

Althæa, hoc nomine insignitur ab ἀλθέω vel ἀλθαίνειν mederi, præstat enim in medendo excellentem virtutem.

Alyssum, vocari existimant ex ἀ privativa & λύσσα Rabies, quia Rabiem seu Furorem caninum tollere putatur.

Am-

Amnii, hoc vocabulum dependet ab ἄμμος.
Arena, quia semen ejus per similis est Arenæ.
Amygdalus à græcis ἀμυγδαλὴ, ubi á latinis y. mutatur in us, unde Amygdalus.
Anacampseros, nomen traxit suum, ab ἀνακάμπτω excito & ἐρὸς amor, ob virtutem amorem excitandi.
Anagallis, vocis origo necdum nota, forsan á græca denominatione ἀναγαλλὶς.
Anemone, derivatur, ab ἀνέμω Vento dum flante vento, flos ejus explicatur.
Anethum dicitur ab ἄνηθος, genus herbæ boni odoris, aut ut alii volunt παρὰ 7ὸ ἀναθέειν, currere, quia hæc planta citissime crescat.
Angelica refertur, nomen suum acquisivisse, ab angelicas suas quas præstat virtutes.
Anisum ab ἄνισον vel ἄνησον.
Anonis, á græco vocabulo ἀνωνὶς deducitur, á non juvando, quod inutilis sit Aratoribus.
Antirrhinum, nomine insignitur ex ἀν7ὶ & ῥὶς, ῥινὸς quod vituli nares assimilet.
Aparine, à vocabulo ἀπαρίνη, quod semine orbata videatur aut quod aspera sit.
Aphaca, refertur ἀ φάκη Lente, quia pertinet ad genus leguminis.
Apium, dictum ab Apibus, quæ floribus ejus delectari solent.
Aquilëgia, nomen duxit, ab Aquila, á florum nempe mucronibus aduncis, instar aquilarum unguium.
Aquifolium, ab ἀκὶς Acies & folium ob folia acuminata.

Ariſtolochia nuncupatur, ab ἄριϛον optimus & λοχεῖα Lochia, planta nempe Mulierum lochia promovens.

Artemiſia, dicta ab Artemide ſeu Diana, quia ad Vitia fœminarum utilis.

Arum, nomen ſuum, à græcis retinet ἄρον.

Arundo, putatur derivari ab Undis, quia lubentiſſime in aquis fluctuantibus creſcit.

Aſarum, Vocem hanc agnoſcit ex ἀ particula privativa & σαίρω orno, quoniam in coronis non addatur.

Aſclepias, herba ab Inventore denominata, Aſclepio medico.

Aſparagus á græco vocabulo ἀσπάραγος herbam ſignificans ſurculoſam.

Aſplenium, ab Aſplenon Herba Lieni conducibilis.

Aſter ab ἀςὴρ ſtella, quia flores ejus ſtellæ in modum explicantur.

Aſtragalus, titulum ſuum habet, á ſeminis forma, Talum ſeu Aſtragalum referente.

Aſtrantia, nuncupatur ab ἀςὴρ ſtella quia plantæ hujus ſummitas Aſterem refert.

Atriplex, unde nomen, hodie ad huc ignotum.

B.

Balſamina, vocis origo dependet á Balſamo, quia ad balſama conficienda adhibetur.

Barba capræ, vocatur â florum congerie ſeu ſimilitudine, quæ caprinam barbam referre videtur.

Belladona, eſt vox arabica, à formæ elegantia, pul-

pulchram domicellam significat. & à Veneno sic dicitur tota enim venenosa est.

Berberis, nominatur á Vocabulo Arabico sic dicto.

Betonica, á Vetonica vocabulo romano.

Betula á Betulla, eo quod Bitumine, seu bituminosa pinguedine abundet.

Bidens, á bis & dente, quia semen ejus bidentatum est.

Bistorta, nuncupatur á radice, quæ bis contorta est.

Blattaria, Blatta, quia hæc planta animalia seu Vermiculos, qui libros corrodunt, necat.

Blitum, audit á βλιτὸ, quod vile est & nullius pretii.

Boletus, à græco vocabulo βολίτης, quod Fungi genus denotat.

Borrago, à voce corrupta Corago, quod Cor, Mentemque exhilaret.

Brunella videtur dici, à vocabulo germanico, die Bräune, quod conveniat in febre ardente, quando Lingua & Fauces prunæ instar ardent.

Brassica, contendunt quidam nomen accepisse, à præsecando, quia ejus scapo minutatim præsecatur, alii vero autumant derivationem habere ἀπὸ τοῦ βρώττειν à vorando.

Bryonia, à verbo βρύω germino, quod abunde germinare seu pullulare solet.

Buglossum, á græcis vocabulis βοῦς Bos & γλῶσσα Lingua, quia folia linguam bovis repræsentant.

Bugula, derivant quidam hanc vocem, á gallico nomine Bugle.

Buphthalmum, nomen accepit, á βῦσ Bos & ὀφθαλμὸς Oculus, quasi Bovis oculus.

Bupleurum, vocabulum hoc compositum est, ex βῦσ Bos & πλευρὸν costa, ac si dicas Bovis costa, Boves enim ea planta comesta rumpi Veteres existimarunt.

Bursa pastoris, sic dicitur, quia capsulæ seminales, Bursam pastoris exacte repræsentant.

Butomus, vocis origo desumpta est, â βῦ â particula augente, & τέμνω seco, quia valide á Bobus expetitur vel quod folia ejus valde scindant.

C.

Cacalia, hujus plantæ Etymon nobis ignotum.

Calamintha, á καλὸς pulcher, & μίνθη Mentha dicta, quasi pulchra Mentha.

Caltha, á græco vocabulo, κάλθη Herba nascens in segetibus seu mente Bœrhav. quod Caltha diminutivum sit â Calendula, quia primo Mensis die, qui dicebantur Calendæ florescebat.

Campanula, á Campana, quia flores ejus campaniformes sunt.

Cannabis, á κάννα Fistula, quia caulis intus fistulosus est.

Caprifolium, â Capra & Folio, quia capri foliis delectentur.

Cardaminde, nominatur â κὰρ cor & δομάω domo,

mo, quasi planta cordis vires restaurans.
Carduus ab ave carduelis dictus, dum semina ab ipsis lubentissime vescuntur.
Casida, á militaris galeæ iconem exprimente, quam latini Cassidam appellitavere.
Castanea, vocatur á Castaneo Magnesiæ urbe, ubi olim magna in copia crescebat.
Caucalis, vox antiqua, hactenus obscura.
Centaurium, á græco vocabulo κενταύριον a Chirone Centauro Medico Thessaliæ sic dicto.
Cerasus, á Cerasunte, Ponti civitate.
Chamæcerasus, â vocibus χαμαὶ brevis & κέρασος Cerasus, humilis Cerasus.
Chamæmelum, á χαμαὶ humi & μῆλον, pomum humile vinosum odorem de se spirans.
Chamæpithys á χαμαὶ humilis & πίτυς Pinus, quasi humilis pinus.
Chærophyllum á verbo χαίω gaudeo & φύλλον folium, quasi planta foliis gaudens.
Chelidonium, nuncupatur, â græco vocabulo χελιδὼν Hirundo, quia ab hirundine monstratum fuit, ut herba visui saluberrima.
Chenopodium á χὴν Anser & πῦς Pes, quod folia effigiem habent pedem anserini.
Christophoriana, á Sanct. Christophoro, quasi planta Christophoriani.
Chrysanthemum, á χρύσος Aurum, & ἄνθεμον, flos quasi aureus.
Cichoreum, á κιχεῖν, invenio, quia undique provenit.

Cicuta dicitur, quod internodia habet cava & fistulosa.

Cicutaria, quasi planta, Cicutæ affinis.

Cirsium apellatur á κίρσος Varix, quia ad Varices tollendas usurpatur.

Cistus, á græca voce κίσος Hedera vel á Cista, quia vasculum seminale in cista quasi hæret.

Clinopodium, existimamus nomen sumpsisse à κλίνη Lectus & πῦς pes.

Cnicus, á κνίζω hinc κνῖκος, planta pungens, quia spinulis gaudet acutis.

Cochlearia ita dicta, quod folia ejus cochlearis instar sint excavata.

Colutea à græco vocabul κολυτέα.

Convolvulus, á convolvendo, quia plantas vicinas lubenter amplectit.

Coralloides planta referens corallia.

Cotyledon nominatur á κοτύλη cavitate, quia folia ejus excavata sunt.

Cornus, dicitur ob corneam duritiem.

Coronilla vocabulum hispanicum, Coronam minorem denotans.

Cratægus, forte á græca voce. κραταιὸς fortis seu robustus derivatur, nam κράτος Robur audit.

Cruciata, quia flores & folia in formam crucis sunt dispofita.

Cucubalus á κῦ ubique & βάλλω imitto, quia ubique radices immittit suas repentes.

Cucumis nomen est á Curvore unde Cucumeres quasi Curvimeres.

Cu-

Cucurbita, dicta ab incurvatu, quia planta, nisi sustinetur, semper incurvetur.

Cuscuta, Vocabulum est syriacum, Herbam absque radice significans.

Cyanus, nomen suum traxit, á floris cyaneo colore.

Cydonia, á Cydone Cretæ oppido.

Cynoglossum, á vocibus græcis, κυνὸς & γλῶσσα canis & Lingua, folia enim canis linguæ similia sunt.

Cyperoides vocatur, quasi planta ad cyperum accedens.

Cyperus, titulum suum habet, á græca voce, κύπαρος, Vasculum ob radicis effigiem.

Cytisus, ab Insula Cytiso, ubi hæc planta uberrime crescit, vel à græco vocabulo κύτισον, Fruticis genus, quod ovium pabulum est, ut in iis lac augeatur.

D.

Daucus, suam denominationem agnoscit á græco vocabulo δαῦκι quod pastinacam significat, vel â δαίω uro, & δαῦκος quia calidæ est naturæ.

Delphinium, â Delphino dictum, quia flos ejus nondum apertus, Delphinum repræsentat.

Dens Leonis, ob foliorum figuram, maxillam dentibus leonis instructam referentem sic appellatus.

Dentaria, á radicum forma dentibus quasi repletam.

Digitalis á floris similitudine cum Digitali, quo mulieres inter suendum digitos munire solent.

Dipsacus á græcis vocabulis δίψα sitis & ἀκὸς, medela ut remedium contra sitim.

E.

Echium fundit suam nomenclaturam, à voce græco ἔχις Vipera, propter seminis formam.

Elatine καὶ ἀντίφρασιν dicta videtur quod minime procera sit.

Emerus, nomen fictum est, á Theophrasto.

Elychrysum currit ἀπὸ τῦ χρυσῦ ab auro & τῦ ἡλίυ Sole, quia aureum solis instar habet florem.

Equisetum progreditur ab equo & seta, quia folia & rami Equisetum referunt.

Erica, nomen deductum á verbo ἐρείκω frango quia ad calculum frangendum sæpissime adhibetur.

Erucago ab Eruca, quasi herba ad Erucam accedens.

Ervum, vocatur ab, ἐρέπτω edo, quia ab hominibus & brutis vesci solet.

Eryngium, á græca voce Ἐρίγιον, id est Barbæ capra, quia hujus plantæ summitates, antequam caulis & folia prorumpunt barbam capræ referunt, alii vero putant, nomen suum sumpsisse ob ἐρύγην, eructatum quod capræ, ob hujus plantæ esum, ingesta vomitu exserere solent.

Erysimum dictum, ab ἐρύω, salvum conservo, ob eximiam in medendo facultatem.

Euo-

Euonymus, nominatur, ab εὐ bonum & ὄνομα nomen, quasi planta boni nominis.
Euphrasia, ab Euphragia vel á græco verbo εὐφροσύνη quod animi lætitiam adfert & oculorum caliginem tollit.

F.

Fagopyrum, nomen habet á φάγω edo, & πυρὸς frumentum, ac si diceres Frumentum edule.
Fagus, ἀπὸ τοῦ φάγειν, á comedere, antiquis enim ejus fructus erat nutrimentum.
Filago dicitur á Filo, quia filis abundat.
Filicula, á Filice, parvam filicem denotans.
Filipendula, á pendeo & filo, quod radices ejus, quasi ex filo pendere videntur.
Filix, vocabuli hujus derivatio adhuc ignota.
Fœnum græcum, á Fœno & adjectivo græcus, quia in Græcia pecora eo saginantur.
Fragaria, á fragrantia odoris quem spirat. fructus.
Frangula, á frangendo, quod facile frangatur.
Fraxinella, á Fraxino quasi parvus fraxinus.
Fraxinus quod magis in asperis locis, montanisque fragis nascatur, hinc per derivationem Fraxinus.
Fucus, á græca denominatione φῦκος Fumaria, quia lubentissime in agris fimo pinguibus crescat.
Fungus, á Funere, quod vescentibus periculosissima sit esca.

G.

G.

Galeopsis, hoc nomen plantæ impositum est, á γαλῆ Felis, quod ejus flores faciem felis repræsentant.

Gallium á γάλα Lac, quia vim possidet Lac coagulandi.

Genista ita dicta, á Genu, quod valde flexilis sit.

Genistella, á Genista, ac si dicas parva Genista.

Gentiana, á Gentio, Illyricorum Rege, primo Virtutum inventore.

Geranium, ἀπὸ τῆς γεράνου á Ciconia, quia capsulæ seminales, rostro ciconiæ conferunt.

Gladiolus, nomen habet á Gladio, quia folia ejus gladii figuram habent.

Glaux, á glauco colore.

Globularia á vocabulo latino, Globus, dum flos globosus est.

Gramen nuncupatur á gradiendo seu progrediendo, quod geniculatis internodiis mirifice serpit novasque spargit radices.

Grossularia, dicitur á cute fructus grossa vel densa.

H.

Hedera, dici putatur, quod arboribus reptando ad hæreat.

Helleborus, παρὰ τὸ ἑλεῖν τῇ βορᾷ, quod esu perimat.

Helleborine, nomen accepit, ab Helleboro, á foliis nempe Helleboro similibus.

Heli-

Helianthemum, nuncupatur quasi ἄνθος, τοῦ ἡλίου, Flos solis, quia semper versus solem se flectere solet.

Heliotropium, dictum ab ἥλιος sol, & τρέπω verto, quia hujus plantæ summitas, soli obvertit.

Herba Paris, Vocis hujus derivatio nobis non constat,

Herniaria vocatur, ob Facultatem hernias curandi.

Hesperis vocem suam habet, ab Hesperide noctu olente.

Hieracium, ἀπὸ τοῦ ἱέρακος, Accipiter, quia ab eo, ad acuendum visum devoratur.

Horminum, ejus nomenclatura ab Ὁρμαίνω, impetu ferox, quod venerem stimulet.

Hyoscyamus, a græcis vocibus, ὗς sus, & κύαμος faba.

Hydrocotyle, ab ὕδωρ Aqua, & κοτύλη Cavitas, folia enim hujus planta intus sunt excavata.

Hypericum appellatur, ab ὑπὲρ super & εἰκόνας spectra, seu imagines, quia super has dominium habet.

I.

Iacea ortum suum habet, á jacere, quia humi sæpe jacet.

Iacobæa, quia circa diem St. Iacobi in optimo vigeat vigore.

Ilex, dicitur á verbo illicio, idem quod Illicium,

Im-

Imperatoria, nomen accepit ab effectu, ob raras nempe insignes virtutes, quibus præ multis aliis simplicibus pollet.

Iris, á cœlestis arcus similitudine, puta colorum diversitate.

Isatis græcam originem agnoscit ἰσάτης quod Glastum significat.

Iuncago, quasi planta ad juncum accedens.

Iuncus, á jungere, quia hac planta herbæ inter se fasciculatim junguntur.

Iuniperus nomen habet suum, quod juniores, & novellos fructus pariat, antiquis maturescentibus.

L.

Lactuca, vox hæc, derivatur á Lacte, quia tota planta lacte turget.

Lamium, hoc nomen desumptum est, à pisce Lamia dicto, qui si iratus horrendum vultum refert.

Laserpitium, nominatum à Lasere.

Lathyrus, à græco vocabulo λάθυρον Cicercula, vel à λαθεῖν latere, forte quia fructus, siliqua inclusa latet.

Lens, à vocabulo lenis deductum, quod qui eo vescuntur, lenes ac moderati fiunt.

Lentibularia, quia ad lenticulam accedit.

Lenticula, dicitur à lente, quia folia ejus lenti assimilantur.

Lenticularia, à foliorum forma appellatur.

Leucanthemum, à λεύκος albus & ἄνθεμος Flos, quia florem habet candidum.

quia

Leucojum, à λευκὸν album, & ἴον Viola proprie Viola alba.

Lichen, nomen hoc deduxit à Lichene morbo cutaneo, quia ad Lichenes sanandos confert.

Ligusticum, Dioscoridis mente, quod plurimum in Liguria nascatur.

Ligustrum, à lego quasi legustrum.

Lilac vocabulum est Arabicum.

Lilium, à λεῖος lævis, quia folia ejus sunt polita.

Lilium convallium, à λεῖος lævis & Valle, quia lævia habet folia & in convallibus frequenter crescat.

Linaria, à lino, quia semen ejus molle est & valde leniens.

Lingua Cervina, à figura plantæ, cum lingua animalis.

Lithospermum, à λίθος Lapis & Sperma semen, ac si diceres semen lapideum.

Lonchitis, dicta à λόγχη Lanceæ, quia folia ejus acuta sunt.

Lotus, à græco vocabulo λῶτος dulcis.

Lunaria, à Luna, ob formam siliquarum ita nominata lunatam.

Lupulus, à Lupo, hominis ac pecoris infensissimo hoste, qui subter hunc frequentissime sese abdere solet, ut eo melius rapto vivere possit.

Luteola, à luteo colore, pannos tingens.

Lychnis à græco vocabulo λύχνος Lumen quia flores ejus, radios luminis faciant.

Lyco-

Lycoperdon, à λύκος Lupus & πέρδω pedo, quasi crepitus Lupi.

Lycopus, nominatur à λύκος Lupus & πῦς pes, planta ad Lupi pedem accedens.

Lysimachia, nomen accepit, à Lysimacho Regis Siciliæ filio, qui hanc plantam primus invenisse fertur.

M.

Majorana, à μαραίνω, marcesco, vel quasi major ad vitam, quia vitam prolongari censetur.

Malus, à græco vocabulo, μῆλον aut ut alii volunt à μέλω sano,

Malva, à μαλάζω emollio, quod tota planta vim habet emollendi.

Marrubium, ab hebraico vocabulo Marrob succo nempe amaro sic dicto.

Matricaria nomen accepit à Matrice, quia hystericis utilis est.

Medica à græco vocabulo nomen nactum μηδικὸν vel à Media ut ait Plinius.

Melampyrum huic plantæ impositum est à μέλας niger & πυρὸς Triticum, propter seminis formam & colorem.

Melilotus nomen habet à μέλι Mel, & Lotus, quasi Lotus mellitus.

Melissa, hoc nomine dicitur à μέλι Mel quod apes ex ea Mel exugere solent.

Melo creditur nomen traxisse à græca voce μῆλον quod pomum significat.

Melo pepo, à græcis vocabulis μῆλον malum & πέπων genus cucumeris. Men-

Mentha, videtur nomen ejus concinnatum esse inde, quod mentem percellat, alii vero putant derivationem suam habere à vocabulo græco μίνθος, quod ejus folia lanuginem habent gryseum.

Menyanthes vocis hujus origo debetur, græcis, μηνίανθος enim plantam significat paludosam.

Mercurialis, à Mercurio primo Inventore ita dicitur.

Mespilus, ab ἐπιμιλὶς, quia folia ejus, ubi sponte nascatur malo similia sunt.

Meum, à μύον, herba caule & foliis aniso non absimilis.

Millefolium salutatur, à multitudine foliorum

Morsus ranæ, quod Ranæ ejus morsu gaudeant.

Morus, à græco vocabulo, μαυρὸς niger, quoniam ipsius fructus, nigricantis sunt coloris, vel ut alii putant à Mora, sive tarditate florendi.

Moschatellina, à Moscho, quasi parva planta moschum olente.

Muscus, â μόσχος subtilis.

Myagrum, nomen ejus dependet à μυῖα Musca & ἀγρεύω capto, quasi planta Muscas capiens.

Myosotis, ex μυὸς Mus, & ὦτας auricula, ob foliorum analogiam.

Myosuros, à μυὸς Mus & οὐρὰ, cauda.

Myrrhis à Myrrha, quia Myrrhæ odorem de se spirat.

N.

Napus vocatur, à græco vocabulo νάπη vel à ναφο.

Nasturtium, nomen tribuitur, à narium tormento, quia sternutare facit vel ut Varroni placet à torquendis naribus.

Nidus avis, à forma radicum inter sese implicatarum, nidum avis repræsentante.

Nicotiana, à Iohanne Nicotio Regis Galliæ Consiliario qui primus ex Lusitania in Galliam misit.

Nigella potius Nigrella, ob seminis Nigredinem.

Nissolia ab autore Nissole Medico Monspeliensi ita dicta.

Nymphæa à νύμφη Sponsa, quod aquosa amet vel quod hæc planta aquæ sit sponsa.

O.

Ocimum, nomen est, ab ὠκέως cito, quod semen ejus cito è terra erumpit.

Oenanthe derivationem agnoscit, ab οἴνη vitis & ἄνθος flos, quasi flos vitis, potius quod cum Vite floreat.

Onagra ab οἶνος Vinum & ἀγρὸς ager, quia radix odorem habet vinosum, alii ab ὄνος asinus & ἀγρὸς ager, ob folia forsan ita dicta, cum auriculis asini quoad longitudinem comparata.

Onobrychis ab ὄνος asinus & βρύχω frondeo, quia hujus plantæ odor, asinos rudere facit.

Ophio-

Ophioglossum, ab ὄφις serpens & γλῶσσα lingua, quia serpentis linguam refert.

Ophris supercilium significat, quo nomine dicta est, dum capillis nigredinem inducit.

Opulus, quod Viti fiat opem.

Orchis ab ἱεράγω appeto, quia radix ejus deglutita, Venerem stimulat. potius à græca denominatione ὄρχις, Testiculus, hinc planta à radicum forma, sic dicitur.

Oreoselinum, ὄρος Mons & σέλινον apium, id est Apium montanum.

Origanum, ab ὄρος Mons & γάνος Lætitia seu planta quæ montes amat.

Ornithogalum ab ὄρνις avis & γάλα Lac, quia flores ejus, tam albi sunt instar animalium plumiferarum.

Ornithopodium à vocibus græcis ὄρνις avis & πȣ̃ς pes.

Orobanche ab Ervi strangulatu nomen adepta est, nempe quod ὄροβον ἄγχει orobum aliaque legumina strangulat.

Orobus, appellatur à græcis ἐρέπτω edo & βȣ̃ς bos, antiqui enim Orobis, boves saginare solebant.

Osmunda, quid sibi nomen velit, me nescire profiteor.

Oxycoccus à fructus colore & sapore ita dicitur.

Oxys à græco vocabulo ὀξὺς acidus, quia saporem habet acidum.

P.

Panicum nominatur à Pane, quia olim ab illo Panis confectus fuit, alii putant nomen accepiſſe à paniculis ſuis.

Parietaria, ob locum quem amat, ſic dicta, lubentiſſime enim circa parietes provenit.

Parnaſſia à monte Parnaſſo, in quo abunde creſci ſolet.

Paſtinaca, à paſcendo, vel à paſtu, quia radix ejus comeditur.

Papaver, à Pappa, pultis ſpecie, cui ſemen papaveris olim immiſcebatur vocatur.

Pedicularis, dicitur à ſua facultate quam poſſidet, pediculos enecandi, Dodonæus autem exiſtimat ſic denominari, quod pecori ac jumentis, quæ ea paſcuntur pediculorum copiam gignat.

Pentaphylloides, agnoſcit ſuam derivationem à πέντε quinque & φύλλον folium, unde pentaphylloides, quaſi planta Quinquefolio ſimilis.

Perſica, nomen habet à Perſide orientis regione, unde hoc arboris genus, in noſtrum orbem eſt advectum.

Perſicaria, à Perſica, quia ejus folia Perſicæ aſſimilantur.

Pervinca, à vincendo, quod vinceret pervinceretque injuriam temporis, ac ſemper vireat.

Petaſites, nomen à πετάω, quia ejus folia valde ſunt extenſa, ſive à Petaſo, ob foliorum formam & amplitudinem.

Pepo,

Pepo, à græca voce πέπων, quod genus cucumeris significat.

Peucedanum, à græco vocabulo πέυκη Pinus quia ejus folia cum pinifoliis similitudinem quandam habent.

Phalangium, dictum à virtute phalanges digitorum curandi male affectos.

Phellandrium nuncupatur, à φελλεύω fluctuo sub mari & ἀναδρεύομαι virile robur assumo, quia in aquis crescendo viriliter se erigit.

Pimpinella quasi Bipinella, à foliorum binis ordinibus, pennatim sive plumatim congestis.

Pinguicula, à foliorum crassite atque pinguedinosa quasi substantia.

Pisum, à Pisa urbe Italiæ, in quo loco olim copiosissime nascebatur.

Plantago, vocatur à planta, quia plantis pedum juxta vias conculcatur.

Plantaginella, quasi Plantago minima seu herba ad plantaginem accedens.

Polium à voce græca πολιὸς incanus quasi herba incana.

Polygala, à πολὺ multum & γάλα lac, quasi herba lac augens.

Polygonatum à πολὺ multum & γόνυ genu, quia gaudet pluribus geniculis, seu quod radices & caules habeat geniculatos.

Polygonifolia vocatur à foliis cum poligonifoliis similitudinem quandam habentibus.

Populago, quia juxta ripas & fossas sub populo erescit.

Populus à populo quod ex ejus calce multi nascantur.

Porrum, dictum quod porro eat & longe lateque grassetur.

Portulaca, quasi porcellorum λάχανον, olus.

Potamogeton à πόταμὸς fluvius & γείτον vicinus, quia fontibus & præsertim fluminibus vicina est.

Primula veris, à primo vere, quia ineunte vero & ante illud tempus floret.

Prunella, dicta ab effectu, quia in angina die Bräune, præstat magnam opem,

Prunus, à græco vocabula πρύνη.

Q.

Quercus, quæ sit nominis ratio obscura est putant quidam à κέρχω exaspero quia cortex ejus asper est.

Quinquefolium à quinto foliorum numero quia quinque folia habet πέντε enim quinque & φύλλον folium significat.

R.

Ranunculus à ranis nomen accepit, quia eorum stabulum est.

Rapa, à rapere, quia à prætereuntibus ex agro sæpissime rapiuntur.

Raphanistrum, dicitur à Raphano, quia radix ejus minorem raphanum refert.

Raphanus dicitur, à ῥᾳδίως facilis & φαίνω appareo, quasi planta facile apparens.

Raph-

Rapiſtrum, à foliorum ſimilitudine cum Rapo.
Rapunculus dictus, quaſi Rapum parvum, dum Radix ejus minor eſt Rapo.
Rhamnus à ῥάμνος ſpina, quia frutex eſt ſpinoſus, ſpinis enim non ſecus ac gladius pungit.
Ribes vox eſt Mauritanica.
Roſa, à græco vocabulo ῥόδον, quod largum odoris effluvium emittat.
Ros ſolis, à guttis roris, quia folia ejus ſub maximo ſolis ardore madent.
Rubeola quaſi exigua Rubia.
Rubia, à rubro colore nuncupatur, quod radix ejus inficiat rubro colore,ſeu quod cum radice lanæ tingantnr.
Rubus, à rubro colore, quia fructus rubeſcit.
Rubus Idæus, à monte Idæo ſic dictus.
Ruſcus, hujus fruticis nomen, unde derivatur Autores inter ſe non conveniunt, plerique exiſtimant. à vocabulo ruſticus.
Ruta à ῥύω ſervo quia ſanitati conducibilis eſt.

S.

Sabina à belgica voce Sabin. quod ſeptem ſignificat.
Salicaria, dicitur à Salice, quia ſub ſalice lubenter creſcit.
Salix à Saliendo nominata, quod celeriter creſcat ut ſalire videatur.
Salvia nominatur à ſalvando, quod plurimis morbis opitulatur.

Sambucus, ab instrumento musico Sambuce dicto.
Samolus, derivatio ignota.
Saxifraga quasi saxifrangus, quod è fissuris rupium erumpat.
Scandix à græco vocabulo σκάνδιξ acus pastoris, à semine acum referente.
Scirpus, veteribus audit Iuncus enodis, unde proverbium Nodum in scirpo quærere.
Sclarea, à σκληρὸς durus vel siccus, quia hæc planta caulem habet durum ac siccum.
Scrophularia, ab effectu ita dicta, scrophulis enim medetur.
Secale dictum à secando.
Sedum, à sedendo, quia in muris sedit.
Serpillum ab ἕρπω serpo, quia planta repens est
Sideritis à σίδηρος ferro, quod ad vulnera ferruminanda utilis, seu quod vulnera ferro inflicta couglutinat.
Sinapi, originem suam habet à vocabulo σίνηπι, quod herbam valde acrem significat, cum ejus semen comedenti lachrymas cieat.
Sisymbrium, à σίον & ὄμβρος quia hæc planta in locis aquosis provenit, alii putant nomen sumpsisse à verbo σείω moveo, quia aquis innatans fluctuat & à vento facile movetur.
Smilax, à σμάω rado, quia planta est aspera.
Solanum, dictum ab effectu, somniferum lethale vel à solare, quia dolores intensos sistat.

Soldanella, unde ejus nomen, hodie ignotum.

Sonchus, à græco vocabulo σόγχος παρὰ τὸ σῶον χέειν, quia hæc planta sabubrem succum fundit.

Sorbus, nominatur, à Sorbere, quia fructus si maturus, mollis sit, ut sorbere possit.

Sparganium, à græca voce σπάργανον fasciola, quia ejus folia, fasciolum referunt.

Spinachia, arabicam originem agnoscit Hispanach, alii vero derivant à semine spinoso.

Spondylium, ab insecto, quod spondylis nomen habet, quodque amabilem rubrum colorem tingere facit.

Stachys, à græco vocabulo στάχυς spica, quia ejus flores in spicam sunt congesti.

Staphylodendron, à σταφυλή uva & δένδρος arbor uvæ, quia ejus folia & fructus in racemos sunt dispositi.

Stellaria quia summitates foliorum, stellam repræsentant.

Stramonium, nominis hujus derivatio ad huc non constat.

Symphytum à σὺν cum & φύω adnascor, quia hæc planta vim habet consolidandi.

Stœchas, ab Insulis maris mediterranei, Stœchades dictæ ita nominatur.

T.

Tamariscus à Tamarice per appositionem scus vocabulum natum esse videtur.

Tanacetum, à vocabulo Athanaſia, quod Herbam ſignificat immortalem, ortum ſuum duxiſſe æſtimatur.

Taxus à τόξα Venena, quia hæc arbor venenoſa eſt.

Teucrium, à Teucro, Ajacis fratre inventore.

Thalictrum, à vocabulo græco θάλλω vireo quaſi planta vireſcens.

Thlaſpi, à θλάω premo, quod fructus ejus planus & compreſſus ſit.

Thymelæa, à θύμυ ἐλαία Thymi olea, quia folia ejus Thymo ſimllia.

Thyſſelinum, à θύω ſuffio & σέλινον apium, ac ſi diceres, apium ſuaveolens.

Tilia à τίλον pluma mente Bœrhav.

Tithymalus, à τιθὴ Mamma & μαλακὸς tener, quaſi tenera mamma, quia lac fundit.

Tormentilla ab effectu, quæ tormina ventris ſedat.

Tragopogon, à τράγος Hircus & πώγον barba nomen ſibi adſcivit, quia ſemen ejus ad huc incluſum barbam hirci refert.

Tragoſelinum, τράγος Hircus & σέλινον petroſelinum, quia folia petroſelino ſimilia ſunt & ab hircis devorantur.

Trifolium, à foliorum terno numero.

Turritis, à forma Turris, quia in faſtigium inſtar turris, cacumen ejus tranſit.

Tuſſilago à virtute ejus, ad tuſſim ſedandam

Typha à græca denominatione τύφη à ſceptro, regum

regum aureo, quod ante primos Magiſtratus geſtatur vel à Ἴυφος quod locum paluſtrem denotat.

V.

Valeriana, nomen hoc deducitur à Verbo latino Valeo, quod viribus eximiis valere æſtimatur, alii putant à Valerio autore ita dici.

Valerianella, nuncupatur, quaſi exigua valerina.

Veratrum, ab avertere, quod mentem avertat.

Veronica, quaſi Vere unica inter plantas, ob virium robur ſic dicta.

Verbaſcum, quaſi Barbaſcum.

Viburnum, à Viurno ſeu viere.

Vicia, à vincendo quod item ut Vitis capreolos habeat, quibus ſurſum verſus ſerpitret vel à vocabulo Vitium quod inter frumenta ſit vitium.

Viola, nomen accepit, à violando, quod manibus dum decerpitur violetur.

Virga aurea, quia caulis virgæ in modum, ramosque & flos ejus aureum habeant colorem.

Viſcum, dicitur, à viſcoſitate quia fructum fert glutinoſum & viſcoſum.

Vitis, à Vieo flecto, quia Vitis capreoli apprehendunt plantas vicinas.

Vitis Jdæa, à Vite & Ida, quia inſtar Vi-

tis

tis ſcandit & in monte Ida creſcendo invenitur.

Ulmaria, ab Ulmo, à foliorum ſimilitudine.

Urtica, ab urendo, quia ſi tangatur valde urit.

Ulmus apellatur, ab uliginoſis locis, in quibus lubenter provenit.

Uva urſi, quia ejus fructus uvæ ſimilis, & ab Urſis veſci ſolet.

Vulneraria, à vulnere, quia ad vulnera adhibetur.

X.

Xanthium à græco vocabulo ξανθὸς flavus, quia capillos flavo colore obducat vel tingat.

S. D. G.

INDEX.

A.

Acero-

Alcea

Arum

Cala-

Caryophyl-

Cha-

Cheno-

Cir-

Con

Cory-

Cy-

Cype-

Endi-

Filix

Fun-

Globu-

Gra-

Gra-

Gra-

Hell-

Hiera.

I.

Lapa-

Lychnis

Mentha

N. Na-

N.

O.

Ompha-

Orchis

Portu-

Salix

Scor-

Side-

Son-

Stœ-

Thla-

Tithy-

Trifo-

Vicia

Addenda.

ad pag. 111.

Alkekengi officinar. T. five Solanum halicacabum vulgare IB. 609. eſt Halicacabum repens flore monopetalo diviſo candido, bacca rubra Ic. vid. Garidell. in Hiſt. plant. Tab. V. & in Rivin. Coqueret. Juden Kirſchen noſtrat. Schlutten, Buppen-Kirſchen, in denen Weinbergen und in der Ruprechtsau, zwiſchen denen Hecken häufig. *perenn.*

ad pag. 16.

Alſine verna glabra T. floſculis albis roſaceis umbellatis ſive Caryophyllus arvenſis umbelliferus IB. 3. 361. eſt Holoſteum cariophyllæum arvenſe Tabern. hiſt. Ic. 2. pag. 543. Acker-Nägelein Graß, aller Orten, in denen Frucht-Aeckern. *ann.*

ad p. 50.

Carpinus Dodon. T. & Matthiol. Epit. pag. 71. ſive Fagus ſepium vulgo Oſtrys Theophraſti IB. 1. 146. flore amentaceo offeo in umbilicis foliaceis. Charme Hagen oder Weiß-Buchen, aller Orten in denen Waldungen. *perenn.*

ad p. 98.

Sorbus aucuparia IB. 1. 62. ſive Sorbus ſylveſtris alpina Lobel. icon. 107. eſt Aucuparia Rivin. Vogelbeer-Baum, ſorbier ſauvage auf dem Gebürg Hochfelden, hin und wieder in Gärten. *perenn.*

Corrigenda.

In Fundament. botanolog. nro 11. lin. 2. lege pro terra, terræ. In horto alsatic. Pag. 4. lin. 5. post & add. J. p. 8. lege nemorosus p. 11. l. 6. deleatur sive p. 12. post translata adde planta p. 19. l. 1. dele striato p. 29. leg. repens p. 31. l. 13. leg. suaveolent. p. 32. l. 28. leg. candicantibus. pag. 34. l. 10. add. und braunrothen p. 37. l. 5. conjunge Olusatri pag. 41. l. 9. leg. rocambole p. 42. l. 13. leg. siliculis pag. 42. l. ultim. lege animalium p. 45. l. 2. post color. add. Agley p. 45. l. 10. add. perenn. pag. 54. l. 6. leg. læviore p. 81. l. 4. leg. calcarib. p. 84. l. 2. leg. Rienbaum p. 100. l. 11. leg caret. p. 102. l. 1. lege tragopogon. p. 109. l. 17. leg. major p. 116. l. 24. leg. suaveol. p. 134. l. 12. leg. angulato p. 136. l. 20. leg. Queue p. 152. l. 27. leg. prodr. p. 157. l. 7. l. radice p. 177. lin. ultim. leg. smilax 187. l. 8. leg. scabios. p. 188. l. 5. lege Bouc p. 204. l. 26. leg tenuibus p. 210. l. penult. leg. lentiformi p. 215. l. 22. leg. chamæleon p. 229. l. 1. leg. Sau pag. 235. l. 22. leg. de porc pag. 240. l. 24. leg. major pag. 242. l. 24. leg. cerf. p. 246. l. 24. leg. Esparvette.